



P. BODDAERT MED. DOCT.

URBIS VLASSINGÆ EXCONSILIARIÆ, ACADEMIÆ NATURÆ
CURIOSORUM CÆSAREO LEOPOLDINÆ, SOCIETATIS
SCIENTARUM HARLEMENSIS, VLASSINGENSIS. PRO-
VINTIALIS ULTRAJECTINÆ, SOCIETATIS NATURÆ
SCRUTATORUM, QUÆ BEROLINI VIGET, SO-
CIETATIS APIARIÆ IN OBER LAUSNITZ
etc. SOCII.

ELENCHUS ANIMALIUM.

VOLUME N. I.

SISTENS QUADRUPEDIA HUC USQUE NOTA,
EORUMQUE VARIETATES.

Ad ductum Naturæ, quantum fieri potuit disposita.

*Utinam quidem jam tenerentur omnia, ac in opertoa &
confessa veritas esset, nihil ex decretis mutaremus,
nunc veritatem, cum iis ipsis, qui docent, queri-
mus.*

SENECA de oito Sap.



ROTTERODAMI,
Apud C. R. HAKE.
M D C C L X X X I V.

*Quod inquis erit pretium operæ? quo nullum mā-
jus est, nosse Naturam, neque enim quidquam
habet in se materiæ tractatio pulcrius, cum mul-
ta habeat futura usui, qnam quod hominem mag-
nificentia suā detinet, nec mercede, sed miracu-
lo colitur. SENECA quæst. natur. Lib. vi.
Cap. 4.*

V I R I S

DOCTRINÆ FAMA CELEBERRIMIS.

JOSEPHO BANKS, EQUITI.

Societatis Scientiarum Londinensis præsidi, variarum Academiarum atque Societatum doctarum socio.

PET. SIM. PALLAS, MED. DOCT.

Hist. Natur. Proffessori, atque Petropolitanæ Academiæ, variarumque aliarum Societam socio.

WILH. AUG. ZIMMERMAN,

Hist. Nat. Proffessori, in Academia Brunsvicensi, variarum Academiarum doctarumque Societatum socio.

N. L. BURMANNO, MED. DOCT.

in Illustri Amstelodamensi Athenæo Botanices Proffessori, variarum Academicarum atque Societatum doctarum socio.

S. D. P. P. BODDAERT.

Hocce quale cumque opus vobis offerre VIRI CELEBERRIMI, mihi omnia suadent, vestrâ enim per Europam litteratam,

tam, adeo bene merita famâ; quasi aurâ secundâ navigabit tenuis mea scapha; quasi careret, forsan, imo certe, scopolis, nimis severæ critices pessum daret, dum e contra opus vestris nominibus Principum in arte inscriptum, majore favore acceptum fore confido, quam aliter ne vix quidem sperare possem, Præterea VOBIS hocce piæ mentis, monumentum erigere jussit, ea qua me decorare atque honorare dignati estis amicitia; tum in donandis vestris doctis operibus, tum in honorifico litterarum commercio; quod vobiscum VIRI CLARISSIMI continuare gratae permittitis.

Vestris VIRI CALEBERRIMI claris nominibus, quam lubenter, quam gratae celebre LINNÆI communis nobis amici nomen adjunxitsem, nisi sæva mors virum doctissimum in flore ætatis, e vivis eripuisse.

Accipite itaque VIRI CELEBERRIMI, hosce meos quales cunque Labores, ea fronte serenâ, qua me ipsum, excepistis, dum vestra præsentia patriam honoravistis vel qua Litteras meas semper accipere dignati estis, & TU inter omnes, CLARISSIME BURMANNO, qui mihi teneris devinctus ab annis, quot enim TIBI, tuo $\omega \mu \alpha \kappa \alpha \rho \iota \tau \eta$ Patri celeberrimo non debeo! qui mihi, domum,

mum, villam, Bibliothecam, museum, semper aperta monstravisti, atque in cetera adeo dixit Amstelodamensis Gazo-phylacia introducere voluisti, atque tot docta otia præparavisti.

Si quid vitiorum, sive in ordinando, sive alio quocunque modo, invenietis, (ut certe futurum credo,) id virium meorum tenuitati, immensæque objectorum copiæ atque mentis humanæ imbecillitati, ut quæ summi NUMINIS sapientiæ effecta in mundo Physico, comprehendere neutiquam possit, adscribere velitis quæso.

Ceterum ut summus rerum ARBITER VOS VIRI CLARISSIMI in honorem seculi vestris operibus atque detectis adeo famosi, in honorem scientiarum naturalium, quas adeo vehementer auxistis; in honorem eorum, quos vestra amicitia honorare atque decorare dignamini, Vos diu diuque incolumes conservet precor, dum id mihi inter maxima gaudia vitae, me in eo vixisse seculo; quo VESTRIS aliorumque in arte Principum felicibus conatibus, scientia naturalis ad talem, quam hodié attingit, pervenit *ακμην*; & me vobis VIRI CLARISSIMI haud ignotum fuisse, vestraque amicitia decoratum, videat posteritas.

Pergite itaque feliciter in illustrandis vestrīs nominībus. Jam per totū globū terraqueū tuis BANKSI atque PALLASSI detectis, claris; sic magnā CATHARINĀ atque GEORGII III. seculū, doctū LUDOVICI-ANUM tanto superius quanto illud MEDI-CÆUM; nec facile a posteris vincendum.

Valete VIRI CELEBERRIMI mihi meisque Laboribus favere velitis, rogo atque peto.

Dabam *Trajecti ad Rhenum.*

Ipsis Calendis Decembri MDCCCLXXXIV.

P R A E F A T I O.

Cuique progressum scientiarum, ab hinc per duo sere secula, attenta mente intuenti, facile patebit easceleri passu, ad tantum perfectionis acreuisse, atque perductas esse statum, ad quem ante illustria LUDOVICI XIV. tempora, vix ac ne vix quidem sperare potuissent sagaciora Ingenia, Hodie in hocce, quo vivimis seculo, a vinculis Scholasticis, quibus tempora barbariei & superstitionis eas detinebant, liberatæ jam nunc proprio nitore fulgent.

Inter hasce scientias *Physica*, atque *Naturalis Scientia*, quoad rapidos progressus, atque detectorum copia eminent, quæ vide-licet abhinc 50 annorum spatio, magnorum virorum laboribus indefessis, ad tale culmen evectæ, ut primo intuitu perfecti-
onis *ακμην* attigisse videantur. Quantis ne Exemplis dicta probare atque stabilire possem nisi justo longius sermonem protrahere vererer. Nunc itaque hæ duæ scientiæ arcto vinculo junctæ, pari velocitate, atque passibus æquis pergunt, secundaque aura navigantes indies nova atque antea inaudita, ex tenebris proferunt; dum enim *Scientia Naturalis Physicæ* objecta porrigit hæc in eorum proprietates inquirit; quantum enim non auxiliū *Mechani-
ca*; *Hydrostatica*, *Optica*, *Aëris*, *Aquæ*, *Ignis* theoria *Physica*, non adfert in distinguendis corporibus Naturalibus, quorum fabricam at-

que organisationem ope *Chemiæ* atque *Anatomie* detegimus; Id enim *Scientiæ Naturalis* primarius finis, ut ex Corporum fabrica atque organisatione, eorum Naturam detegamus, & ad varios usus ea adipicemus; non enim ille magnus in scientia, qui solam, et si omnium rerum Naturalium, nomenclaturam possideret, nec ultra, sed ille strenuus Naturæ indagator, qui cognita atque rite perspecta Naturæ objecta, vel præfertim in usus humanos transferat, vel & in eo nititur, ut inde annuli magnæ creatarum rerum, Catenæ magis in interrupta serie se sequantur & inde simplex Naturæ Majestas magis pateat, ut Divinæ potentiae atque sapientiae lucidum criterium. Inde REAUMURII, BONNETTII, LINNÆI, GEOFFROI aliorumque summa gloria. Hi enim viri Illustres, ope aliarum scientiarum, facem in tantis Tenebris accendere feliciter tentaverunt.

Haud tamen, quamvis junctis viribus, omnem Lapidem movere conati sint summi in arte Principes, amabilem scientiam eo usque evehere pares fuerunt, ut illud acquireret fastigium, ultra quod pergere non possit; nihil enim absolute perfectum in mundo sublunari; hocce & ipsa docent ultima detecta, ex quibus videmus nobis multa latere atque adhuc densa caligine obiecta esse, quo plura deteguntur eo pluribus nos carere videmus; & adeo sanè latè patet Naturæ campus, adeo vastum Theatrum præbent Corpora Naturalia, ut limites percipere & ipsi oculatissimo Lynceo haud datum fuit.

Omnia per totum globum terraqueum sparsit sum-

summa Numinis potentia, adeo largâ manu, ut nullus detur locus vacuus, inde oculo fugitivo perspecta creatarum congerie, difformis farruginis instar videtur, sed ubi proprius perspicitur quantane Harmonia, simplicitas, Majestas, atque ordo rerum, tunc enim videmus omnia cohærere, & quamvis multa desiderentur, omnia continuata serie pergere. Quanta ne in quoque objecto, summæ sapientiæ vestigia, in admirabili constructione! anne vilissima Eruca *Coffi* ipsius LYONETTI torquet Ingenium, & spem omnia detegendi, in tam parvo Animale plane adimit?

Insatiabilis sciendi Cupido mentem humanañ ita occupat, ut limites, quibus adeo arcte circum scribitur, transilire conetur; Hocce desiderium immortalitatis mentis præcipuum diagnosticum, quantus ne pulcerrimorum, atque utilissimorum fons & origo! unde adeo multa in societatem humanam redundant bona; inde, ope Scientiæ illius eximiae, quid homini salus, quid noxium sit, detegimus, inde artes illæ, quarum progressu vitam beatam atque sanam transfigere dedit summus rerum ARBITER. Naturam huncce in finem perscrutare hominis est, sed ut in tantis, bona a malis, sana a noxiis, utilia ab ineptis castè distinguat, cuncta novissè necessarium; hæcce distinctio itaque basis scientiæ, & ubi reducta atque distincta sunt objecta, inquirendum, quem locum occupant in magna rerum catenâ, hicce locus patebit, ex externa figurâ, internâ constructione, existendi methodo, affinitate cum præcedente vel & sequente, dein ad quos usus in vita civili adhi-

beri possit, nam summa, sapientissimaque Prudentia, nihil frustrâ creavit, alma ille Mater, omnibus consulens creatis, alterum in alterius emolumentum effinxit, ita ut bonum generale ex multis particularibus non modo constaret, sed & ut, quod nobis videtur malum in bonum redundaret. Inde v. gr. odoriferarum Plantarum virtus *Cephalica*, *Nervina*, *Stomachica*, inde avium quarumdam in plantis quibusdam voracitas, ut semina quæ in Stomacho illæsa manent, alibi disseminent; imo, (ut multa præteream) ferarum in aliis rabies atque ferocitas, ne nimis increcerent species, siveque æquilibrio atque proportioni, quæ ubique cernimus, nocerent.

Ut vero hæcce novisse, atque memoriae inculcare tanto melius possumus, in partes quasi dividere totum illud *unicumque Naturæ*, inde *Classes*, *Ordines*, *Phalanges*, *Genera*, *Species*, varietates; quas invenit humana sagacitas, ad memoriam, animique vires sublevandas. Sæpius tamen invita Natura; dantur enim hic & inde genera insulata, quæ nullum ante vel pone se aliud affine habent, quales sunt *Elephas*, *Rhinoceros*, *Hippopotamus*, *Tapir*, *Leo*, inter quadrupedia, *Sagittarius*, *Didus* inter aves; & multa alia, quæ Naturam liberam, nec legibus arbitrariis hominum subjectam evincunt. Hæcce tamen genera, annulum in magna rerum catena efficiunt, quamvis genus antecedens atque consequens nondum pateat; sed quamvis annulo careamus sæpius, nihilominus, quum totam *animalium*, *Plantarum*, atque *Fossilium* compagem intuemur, id clare patet, quod Na-

Natura a simplicissimo , ad maxime composita pergit , & itaque a *regno Fossili* incipiens , desinit in *animalium complicatiorem* fabricam in hominem nempe , qui in corpore animali animam habet spiritualem , ratiocinantem immaterialem , itaque immortalem ; sicque annulum efficit inter Mundum *intellectualem* & *Phyficum*. Lævi digito , annulos primarios catenæ depingere lubet , nec Tibi L. B. id haud inutile , nec ingratum fore spero .

Regnum Fossile corpora bruta , nec organisata continens , solâ intussusceptione sese expandens , primo nobis offert *Terram Virgineam* ; hæc simplicissima & omnium solidorum brutorum basis ; inodora , insipida , apyra , nec aëre , nec aqua , nec menstruis dissolvenda ; huc Lapidum , minerarum , metallorum , imo & vegetabilium , animaliumque mixtionem ingredi , ad oculum docent Scholæ Chemicæ ; pura in se , partibus heterogeneis , Phlogisticis , salinis , metallicis , semimetallicis mixta impura redditur , simplex terra primo abit in naturam *Siliceam* , dein *Argillaceam* , tandem *Calcaream* , quamvis *terra pura* per se sit apyra , tamen additis salibus , metallis , aliisve heterogeneis , in Igne fluxilis redditur . — *Terra Silicea* dat *Arenam* diversæ puritatis ; *Terræ Siliceæ* , succedit *Terra Tripolitana* , ceteræque *Terræ Vitrescibiles* ; dein *Terra Argillacea* ; adeo notabilis , hæc sale alcalino fixo , vel *Spatho Calcareo* , vitream naturam adipiscitur cum marga mixta , ad CALCAREAM transit , in omnibus globi partibus periundam ; hæc cum *Phlogisto* mixta dat METAL-

-

TALLA & Semimetalla, in aëre libero ardentia, in in calcem metallicam abeuntia, *Calx* hæc funditur & vitrescit igne violentiore; *Metalla* ope *Arsenici* ad *SALIA* pergunt, inde *Vitriola*, *Nitra*, *Natra* aliaque *Salia*, ex figura, sapore, viribus distinguenda; *SALIA*, magis minusvel **Terris variis**, vel particulis metallicis, ope *Phlogisti* unita, *LAPIDES* dare, docent quidam *Lapides* *Petroſi* (*PETRÆ LINN.*) *cornei* (*SAXA LINN.*) & alii, pro varia partium combinatione, alii horum, fractura amorpha, nihil monstrant regularis figuræ, omnes enim *Lapides* ex terris oriundi quæ fluido plus minus simplici moleculas suas congregant; evaporato fluido supereft substantia dura, quæ si ex Terra vitrescibili conſtat, atque particulis metallicis, dat *Gemmæ* soli hominum *Luxuriæ* inservientes, quamvis ad meliores adhuc ignotos usus ortos nullus dubito, Terra vitrescens dat & *Graniten* tanta mole in globo nostro superbientem, atque basin veterum illorum Montium primitivorum, ut docte demonstravit cl. *PALLAS*. **TERRA CALCAREA** minus dura, format pulcerrima, illa marmora inter quæ marmor *Opalisans* maxime notabile. *Spatha* varia, quæ vel phosphorescendo, duplicando, vel iridis coloribus *Metallarum* ve jubare conspicua, stalactites & alia, quos in varios usus adhibet humana industria; ex **TERRIS ARGILACEIS**, nascuntur *Schisti*, *Talci*, *Mica*, *Lapides gypsei*, *Stelenitides* variis; Hilapides magis ordinati, organisationis (speciem debilem tamen) præ se ferunt, stratis enim fibi in cumbentibus, vel fibris parallelis, vel se decuſſanti-

tibus, quod præsertim in *Asbestis*, *Zeolithis*; variis membranas, atque fibra corporum organizatorum mentiuntur.

Tandem pulcerrima *Flora*, *Vulcano* nubit, atque haud sine admiratione, *Corallinas*, totas *Lapideas*, more plantarum ramosé crescere, & sic viam aperire ad *Plantas marinas*, cernimus & anne videmus *Byssum flos aquæ* ad *Amianthum* accedere, simplicibus hisce *Byssis* affines *Confervæ*, ramosæ, apice fructificantes; sive ad ingens *AGARICORUM* agmen transeunt, hi enim apice dilatato semina gerunt, *Agaricos* a latere premunt *LICHENES Scutellati*, atque *Peltati*, quos immediatè sequuntur *Mucores* varii; *Pezizæ* jam perfectiorem organisationem monstrare incipiunt. Ab altera marinorum parte *Fucis* proximæ *DORSIFERÆ* terrestres, floribus occultis, *Hermaphroditis*, *monandris*, vel *diandris monogy-niis*, *monophyllis*, lineatim in dorso plantæ dispositis, horum aliæ scapum floriferum a fronde distinctum, ut *osmunda*, *onoclea ophioglossum*; tandem *fructificatio* plenaria conspicua, ubi Flos ex spatha vel spadice prodit, quod in celis *Indiæ* utriusque *PALMIS*: hæ dum caput procerum ad nubila tollunt, fronde flabelliformi ex foliis ensiformibus constante, tegunt humilia *GRAMINA*, quæ quamvis habitu a *PALMIS* toto cœlo distent, attamen eadem placentatione, simplicitate caulis, foliis linearibus ad eas accedunt, æque ac illæ nulla distinctio corticis, utrisque antheræ parallellipipedæ, biloculares ambæ, his & illis corculum erectum, & nutriendis fructūs substantia. & eadem placentatio in *LILIACEIS*, flos & illis *monophyllus*,

sta-

staminifer, staminibus 3 vel 6, ut in GRAMINEIS folia simplicia linearia stricta, flos vero magnus, pulcerrimus, speciosius, Naturæ vegetabilis pulcerrimum ornamentum; *Liliaceis* affines ORCHIDEÆ, & his radix bulbosa, carnosa mucilaginosa, folia vaginantia, ut in multis *Ixiis*, *Gladiolisque*; flos hexapetalus, sed irregularis; staminum unus vel duo stylo insident, quod & in SCITAMINEIS videmus, ubi stamen aliquando germini ad natum, & flos *Spathaceus* superus, Hermaphroditus, his DISPARES proximas docent *Musa* aliaque, situ vero staminum & infero fructu discrepant; & magis cum STRIC-
TIS plantis convenient fructu infero & numero staminum cum segmentis calycinis proportione; hancce Phalangem sequitur, pulclarum atque adeo utilium UMBELLIFERARUM agmen, quod fructiflorum, alternifolium, herbaceum, pentapetalum, pentandrum: floribus aggregatis, his similes FLORES COMPOSITI, quibus corolla, supera, gymnosperma, monopetala, & semi-
num receptaculum unicum, nudum; EPICAR-
PIÆ æque ac præcedentes corollam gerunt monopetalam, superam, staminferam, sed iis sta-
mina libera, angiospermæ, fructu haud de-
hiscente, folia alterna, stellata, opposita,
Flores CAMPANULATI æque ac EPICARPII fructi
flori, flore calyculato, vel non; angiospermæ
monogynæ, corolla monopetala, staminifera
& involucro duplici CONTORTÆ, CAMPANULA-
TIS accedunt, e longinquo tamen, nec sine fal-
tu. Calice monophyllo corollâ monopetalâ,
staminifera ASPERIFOLIA, epicarpantha, an-
giosperma *Contortis* junguntur. *Asperifolias*
a latere premunt VERTICILLATÆ Plantæ, ut
qui-

quibus corolla monopetala, (irregularis tamen) staminifera, staminibus segmentis calycinis numero æqualibus, monogyna, bilabiata, itaque & habitu PERSONATIS similes; ut & quibus Calyx perfistens; irregularis atque decidua corolla. Stamina non plura quam segmenta calycis, amplissima TUBULATARUM Phalanx & corollam gerit monopetalam, staminibus tot, quot segmenta corollæ. In DUMOSIS stamina & aliquando Petala calyci inserta, fructus superus stamina duplo plura quam Petala. CALYCANTHEMÆ arboreæ, calyce monophyllo, corolla monopetalâ, staminibus pluribus quam segmenta calycina a *Dumosis* separantur. NOMADEÆ calyce & corollâ polypetalâ donatæ, staminibus liberis ex receptaculo prodeuntibus, tot aut duplo pluribus quam segmenta corollæ; haud sine saltu ad *Dumosas* accedere possunt habitu & figura *Nomadeis* postponendæ TRICOCCÆ, floribus tamen aliquando apetalis, monoïcis vel dioïcis. POLYCARPIIS & stamina ex receptaculo libera tot aut plura quam petala vel Segmenta calycina, POLYANDRIA vel apetala vel polypetala; staminibus multis fœcunda, maxime cum PERICARPIIS convenient; sed differunt germine unico, sessili. Et ICOSANDRIA corollam habent polypetalam, germen unicum, stamina vero in plures fasciculos distributa, aut ex flore prodeunt semper polypetalo; quo caractere convenient cum COLUMNEFERIS, ut quibus staminum filaments inferne coailita in columnam tubulosam, stylos continent, harum ergo character ex cohærentia staminum. Flores vero quidam irregulares, ut Calceoloriæ, Violæ, Melianthi, Lignionæ SCO-

POLII *Trigoniæ d'Aubletii*, hancce classem cum LEGUMINOSIS conjungunt, quarum character siliqua vel legumen, & plerisque corolla *Papilionacea*, quam & in ANOMALIS observamus, quibus staminum vagina bivalvis & fructus fili- quosus. ANTISCORBUTICIS fructus elongatus & corolla tetrapetala, hæ tantum non omnes ad *Tetradynamias* pertinent, & ut *Siliquosæ* se- men e margine septi pendens; Horum instar calycem inferum, corollamque polypetalam gerunt DISCIFERÆ, quibus germen in Disco im- positum, & stamina plura quam petala. Calyx a co- rolla distinctus, corolla polypetala, staminum numerus & structura CARYOPHYLLÆAS priori- bus adjungunt ut ex *Spondia*, *Carica*, *Bergeræ* patet, his enim & germen disco elevatum; sed petalorum Limbi patuli, dilatati, elongati at- que unguis aliam classem ostendunt, quæ DEFLORATIS proxima, sed hæ corolla carent, atque unico semine gaudent. — SEMINUDÆ Plantæ æque minus ac *Defloratæ*, petalorum ornamento decorantur; his & stamina basi coalita, germen insidens calyci, semen unicum. — Et AMENTACEÆ monoicæ, apetalæ, illis & germen unicum semen tectum, sed qui- libet flosculus a vicino separatus ope squamu- læ, calycis officio fungentis. — His accedunt CONIFERÆ, floribus apetalis, aggregatis, squamu- la separatis, utraque hæcce classis arborea, sed *Coniferis* squamula rigida stamina unita, folia linearia, & tantum non omnes resinofæ. — Longo, (vera fatendum) distant hiatu ab arbo- ribus *Coniferis*, humiles MUSCI, sed conve- niunt floribus inconspicuis, strobilo vel gem- mula in sinu feminea squamulæ locata, mari- bus

bus anthera; planta monoica. Arcte conjungitur *Muscorum* classis cum FUNGOIDEIS, his enim pedunculus cavus, capitulo terminatus, & globuli parvi in margine *Blasiae*; anne *Valseæ* ADANSONII. *Clavariæ LINNEÆI* tales offerunt pedunculos apice fructificantes, floribus inconspicuis? dum *Foliacei LICHENES* folia *Muscorum* exprimunt; aliæ vero fructificatiōnes intus inclusos gerunt, ut animalia germen, & motum spontaneum in quadam *Tremellæ* specie viderunt ADANSONIUS, BONNETTUS & alii.

Sic sensim transit regnum vegetabile in animale eoque arctius conjunguntur ambo, cum limites utriusque ita confunduntur, ut ubi sistat vegetabile atque Animale incipiat, adhuc dubii hæreant principes in arte. Non ita longe anno scilicet 1740. Cl. TREMBLEJUS *Polypum LEEUWENHOEKIO* olim jam notum, observabat, REAUMURIO communicabat, & cum BONNETTO Experimenta in eo fecit permulta, hocce immortali Triumviratu *Polypum annulum* vegetabilia inter & Animalia efficere concludebatur; & itaque primum & verum esse *Zoophyton*; huicce sententiæ applaudebant Zoologi; donec celeb. MULLERUS *Fasciolam Tremellarem & Monadem Gelatinosam*, *Tremellis* atque *Mucori*, *Lycogalæ* esse simillimam docuit; & herclé *Polypus*, figura & propagandi modo nimis animal, nec satis adhuc simplex, quam ut *Annulum* conjunctionis efficeret; dum e contra MONADES simplicissimæ, minutissimæ pollini *Lycogalæ* simillimæ, adeo enim parvæ ut 2700000 minores globulo arenæ statuerit

* *

LEEU-

LEEUWENHOEKIUS , nec eum multum a vero aberrasse , mihi docuit experientia ; microscopio solari animalcula infusoria perlustrans ut eorum minimam molem , aliquo modo determinarem , inter duo vitra concava , quæ parte convexa sibi jungebam , guttulam immisi , eidem aquæ guttulæ & squamulas Papilionis MENELAI adjeci ; ex distantia sexdecim pedum hæ squamulæ bipedales cernebantur , læte circum natabant *Brachioni* rotatorii , pedem æquantes , *Trichodæ* , *Vibriones* , atque *Monades* , hæ nec sextam lineæ pollicis mensurabant , ita quæ 4959,42957 ies minires tali squamula ; easque vortice *Brachionorum* abreptas , atque in eorum gula incidentes vidi . INFUSORIIS ad fines , *Zoo-phyta Gelatinoja* , his *Membranacea* , tegmine calcareo donata , qualia in *Cellulariis* videmus , inde procedit *Molluscarum* gens , tum microscopica a cl. SLABBERO , graphice descripta vel nudo oculo patens ; hæcce mutila , vel cirratha , vel brachiata , nuda per maria vagatur vel TESTIS in hæret *Uni-* vel *Bivalvibus* ; mihi enim multivalvia Testacea non dantur , *Pholades* enim , *Teredines* , *Lepades* , *Chitones* & quæ porro sub hocce vexillo militant , testas habent modo univel *Bivalves* ; valvis ut ita dicam laxe imbricatis membranula cohærentibus , quarum ope , quamque valvem dilatare , haud vero aperire queant , sic & *Chitones* univalves , valva Zonis imbricatis , membrana junctis , cuius ope pro voluntate animalis mobiles , æque ac Zonæ Dasyporum inter quadrupedia . *Testaceis* proxime accedunt APTERA Insecta , que crusta dariuscula tecta , ope Pedum incedunt , vel & simul filis a loco ad locum transferuntur , dum

ro-

rostro valvato, vaginato escam hauriunt, hisce itaque proxime GYMNOPTERA diptera vel tetraptera, (quorum aliquando mares *Apteri*,) rostro valvato, fetoso, hæc e latere premunt LEPIDOPTERA ope *Sphingis Chorinæ* & fenestrinæ *Sphingibus* ad legata, atque *Sesiis Phalcenis*, *Noctuis Pyralidibus*, *Tortricibus*, *Tineis alucitidis* affinia, dein sequitur admiranda Papilionum cohors a summo Numine ineffabili decore vestita. Horum vestigia legunt PROBOSCIDEÆ; alis pulcerime coloratis vel Iridis fulgore opalifantes, & his ut antecedentibus rostrum longum sed abdomini adpressum, Proboscideæ aquaticæ alis durioribus coriaceis (ut in *Nepa*, *Naucoridae*, *Notonecta*) ad Coleoptera aquatica absque saltu pergunt, dum *Hydrophili* antennæ clavatae eum ad *Lucanos*, *Scarabæos Cetonias* etc. ducent. Æque ac INSECTIS, PISCIBUS, cor uniloculare, uniauritum, respiratio lateralis, collum nullum (Raphidiæ enim collum, modo Thorax elongatus) corporis lævitas vel squamarum præsentia, dum PINNÆ Pectorales & Dorsales alarum locum occupant earumque officio funguntur in *Exocœtis* & *Trigla* volante, ut & *Pegaso*, AMPHIBIA enim a Piscibus, modo ordine non classe distant; ut ex *Muræna Colubrina* & sirene *Lacertina* patet, Amphibia itaque nantia veri Pisces.

Sed ab Amphibiis ad AVES nobis ad huc deest annulus, a Piscibus vero ad Quadrupedia transitus foret naturalis, cum *Trichecus*, cetis magis alio adpropinquat. Hocce fere modo, Classes cohærent, longe tamen abest, ut se sine saltu sequantur, nec id nostra ætate futurum

credo. Dantur classes, naturalissimæ, quales sunt *Terræ*, *Salia*, *Metalla*, inter FOSSILIA; inter VEGETABILIA *Palmæ*, *Gramineæ*, *Liliaceæ*, *Orchideæ*, *Umbelliferæ* etc. inter ANIMALIA *Feræ*, *Glires*, *Ruminantia* etc. Sed si genera consulimus, videbimus, ut supra monui, quædam, quæ nulli alii *affinia*. Sunt & tamen ut in decursu hujus operis videbimus, & genera NATURALIA quales sunt *Simiæ*, hominem inter & *Prosimias* positæ, *Antilopæ* inter *Cervos* & *Hircos*, *Mures* inter *Lepores* & *Sciuros* medii, sic vide-
mus inter aves *Mergos*, *Colymbos*, *Alcas* effice-
re genera naturalia, inter Pisces *Labros*, *Percas*, inter TESTACEA *Bullas*, *Conos*, etc. Sed cum omnes ordines atque genera naturalia connectere haud possimus, aliam viam tenta-
verunt Zoologi atque Systemata condiderunt ARTIFICIALIA, sed & hic præsertim aliud *Natura*, aliud *Sapientia* dixit; multi in hocce desudaverunt labore, ut RAJUS, KLEINIUS, BRISSENIUS, MOEHRINGIUS, LESKENIUS, FABRICIUS, BRUNNECHIUS sed nemo inter hos, hercule magni nominis viros, quorum Labores tanti faciendi sunt, major, quam illustris LINNAEUS, dum cæteri omnes hancce vel illam Zoologiæ partem, quilibet sua Methodo tractaverunt, vir ille, divinâ quasi afflatus aura Naturam omnem, omniaque globi terrauei corpora systematice redigere tentat assiduo, atque haud interrupto labore omnia secundam sibi propositam methodum componit, cuique proprio nomine adpellat; inde natum *Systema Naturæ*, opus immor-
tale, sed hominis, & quidem hominis, ab om-
nibus Museis Zootrophiis atque Zoologorum auxilio seclusus, & in frigido orbis angulo insu-
la-

latus, (utor viri ipsius verbis in penultimis, quibus mihi honoravit litteris), sua sine pari memoriâ, Bibliotheca, atque Zoologorum litteris adjutus; atque museis paucissimis, nonne mirum itaque & tantum virum sæpius erravisse, cum omne systema vacillet nec Natura patiatur legibus arbitrariis vinciri.

Ego itaque PALLASSII, BUFFONII, CAMPERI, BONNETTI aliorumque in arte Principum, monita de systematum vacillatione auscultans; ad ordinem Naturæ, quantum potui me converti, atque perlustratis tantum non omnibus, qui scientiam Naturalem, hocce quo vivimus seculo illustraverunt, auctoribus; perspectis plurimis patriæ Museis; *Elenchum* huncce compondere incepi, in proprios & paucorum amicorum usus; LINNÆIS patre & filio consilium communicavi, qui cœptis serena fronte arride-re dignati sunt; sed ubi primum huic operi manum admovi, mox quam grave humeris imposuerim onus sensi. Multa enim obstacula haud prævisa obstabant; nihil de Impossibilitate dicam, omnia animalia citandi, nulla specie quæ exstat omissa, id homini non datum, nec ego adeo vanus sum, ut omnia descripsiisse me jactem, quæ vidi, quæ auctorum, quos per volvi mihi suggeſſit copia, citavi; per vigen-ti & quinque annorum spatium, quo sepositis aliis studiis me totum scientiæ Naturali atque Physicæ dedi; *Musea* quadraginta septem in Patria vidi, (quorum jam multa morte posses-forum destructa,) & quotannis iter ad ea perlustranda instituo, nova rariora adnoto; amplissimæ Bibliothecæ amicorum, & semper mi-

hi patent ; nec satis in hisce amicissimi VOSMAE-
RII , qui tanta cum Laude Princis ARAUSIACI Mu-
seо prae est humanitatem laudare possum ; qui mi-
hi non per horam vel alteram ; sed per totas dies
id perlustrare permittit ut & BURMANNI , mihi
a teneris juncti humanitatem , ut de aliis ami-
corum in hisce , testimoniis taceam ; sed haec
omnia perlustrata , atque excerpta in ordinem
redigere hic Opus hic Labor ; In hisce mihi
aliis arrisit in multis SCOPOLII *introductio* ; eam
itaque saepe fecutus sum , sed ne semper in ver-
ba Magistri jurare viderer , quae mihi non recta
videbantur in Elencho mutavi ; sic *Hominem*
non citavi , a *Simiis* , veris animalibus quadru-
pedibus , quae ab homine tantis discrepant , incep-
pi ; & hominem spectatorem extra theatrum
posui ; *Tardigradum* a *Prosimiis* separavi , *Me-
len* ab *Ursis* , *Dipodes* a *Muribus* cetes ad *Pisces*
retuli *Chondro Pterygios* , in *Avium* & aliorum
animalium classe , nova genera addidi , alia
aliis intermischui , *Pisces* cum *Amphibiis* con-
junxi , eos solo ordine separans , *Amphibia* se-
cundum Methodum quam in actis *Physico Medi-
cis* tom. VII. & in scriptis *Berolinensibus* tom. III.
dedi , digessi . *Piscium* genera secundum figu-
ram corporis disposui ; ordines secundum LIN-
NÆI methodum & Phalanges secundum AR-
TEDII . Judicium , de hocce novitatis ausu fit
penes Lectorem , omnium horum rationes
dedi in introductione cujusque classis & in ob-
servationibus , quas cuique generi post posui .
Generum itaque dispositio , multum Laboris
exigit ; eaque descripsi , ut non ex aliqua parte
arbitrarié sumpta sed ex toto animali characte-
res desumserim , omissis *Dentibus* nisi nume-

ro, vel absentia constante, characteres præbent ut in *Edentulis*, *Ruminantibus*, *Gliribus*. Sic & in *Piscibus* numerum ossiculorum Pinnum modo, ubi alii non adsunt characteres, ⁱⁿ⁻ invitus adhibui.

Ex dictis patet, me celeb FABRICII methodum de instrumentis Insectorum cibariis, plane omisisse, quamvis sagacitatis auctoris lucidum testimonium, genera ejus multa tamen retinui, præsertim inter *Coleoptera*.

Quoad species, eas ita definire conatus sum ut non modo differentia inter præcedentem & sequentem pateret sed ut cujusque darem ideam distinctam, inde LINNÆANIS definitionibus multa saepe addidi; sed mihi species contemplanti cumque definitionibus comparanti, saepe de *Coloribus* obstaculum fere monstravit & sene quamvis probe sciam omnes colores præfertim compositos, verbis haud exacte & saepe nequam exprimi posse; & venerandum, SCHÆFFERUM, SCHIEFFERMULLERUM, PODAM, SCOPOLIUM multa de hisce conamina fecisse, sed incassum. *Triangulum MAYERI* Theoretice pulcerrimum sed in praxi vix adhiberi potest, id ameliorare tentavit PFANSIMDIUS nec infeliciter; haud tamen omnes colores exprimere potuit. Nihilominus, quidam & præsertim inter Primarios & Compositos, denominari possunt quod præfertim in *Avibus* Insectis & *Conchylis* necessarium. Colores primarios *Tres statuendi Flavum, Rubrum, Cœruleum*, sed haec verba mihi generica, multis species continentia, haec itaque divido: *FLAVUM* in *Citrinum*, *Flavum ra-*

nunculim; *Sulphureum*, sic *Rubrum* divido in *Carmineum*, *Scarlatinum* atque *Sanguineum*. *Cæruleum* in *Azureum*, qualem habemus ex cupri solutione spiritu ammoniaci, *Cyaneus* qualis in floribus *Cyani*. *Celestinus*, qualis cœli die ferno, *Citrinus* color cum *Carmineo* mixtus partibus æqualibus, dat pulcerrimum *Aurantium*, cum *Scarlatino* mixtum, si plus flavi, dat *Hyacinthinum*, carmineum cum *Scarlatino* dat *Rubinum* colorem; qui *Balassius* color dici posset, *Sanguineo* dat colorem *Spinellum*, vel *Rubini Spinelli*; *Carmineum* cum *Azureo*, dat *Purpuram* saturatam, cum *Cyaneo*, dat amethystinum sive quod dicimus (*Columbyne Lakverw*) cum celestino, gridelinum (gris de Lin) vel *Perficorum*, vel *Episcopinum* (*Couleur d'Eveque*) & tandem quod *Galli* dicunt *Lilas*, *Azureum* cum *Citrino* mixtum dat *Smaragdinum*, *Cyaneum* cum *citrino*, dat *Prasium*, *Celestinum* cum *Citrino* dat viride *Saxonicum*; *Cyaneum* cum *Flayo Ranunculi*, dat pulcrum viride *Pistaceum*; hæ sunt præcipuae differentiæ, quibus usus sum in coloribus primariis, qui cum albo mixti, innumeræ dant varietates. Porro dantur *Colores Secundarii*, sic *Scarlatinus* color cum nigro mixtus dat colores *Brunneos*, sic si plus *Scarlatini* quam nigri sumamus habebimus *Castaneum* si *Flayum* cum *Nigro* videbimus olivaceum ex nigro albo & flavo nascitur color *Cinereus*, ex *Flayo*, *Rubro*, *Nigro* fulvus ex *Lacca* & paucō nigro rufus.

- 2 partes albi cum 6 carmini dant colorem *roseum*.
 4 —— 4 cum scarl. ve! *Laccæ* — *lateritium*.
 6 —— *Scarlatini* 2 viridis dant — *corallinum*

4 Pan-

- 4 Partes Laccæ vel scarl. cum 4 nigri - hepaticum.
 6 ——— Carminei. 6 scarlatini — puniceum.
 6 ——— Scarlat. 2 nigri — sanguineum.
 4 ——— Carmini. 4 citrini — aurantium.
 6 ——— Flavi ranunc. 2 nigri — luteum.
 6 ——— Flavi sulph. 2 alb — Isabellæ.
 6 ——— Flavi ran. 2 scarl. cum 1 nigro - Oram.
 6 ——— Flavi citrini. 2 Cyanei — stramineum.
 2 ——— Flavi citrini. 6 nigri. — marinum si-
 ve thalassium.

Tandem inter de composita five infimi ordinis habemus.

- 2 Carmin. 4 cyan. 2 nigr. pro haematitico.
 4 Carmin. 2 cyan. 2 virid. — vinaceo.
 4 Cœrul. 2 flav. 2 virid. — glauco.
 4 Virid. 2 rub. 2 nigr. — caryophyllino.
 4 Flav. citr. 2 rubr. 2 nigr. — cinnameo.
 6 Flav. citr. 2 rubr. 1 nigr. — fulvo.
 4 nigr. 1 azur. 1 flav. citr. 1 rub. 1 virid — umbrino

Hæcce præmittere consultum duxi, ut quid per terminos colorum velim, intelligat LECTOR & hæcce majoris esse momenti, quam primo intuitu patet, rei gnari facile concedent; sed de coloribus animalium alibi ex professo agere mihi animus est; sed cum hi citati; plerumque obvii in animalibus sint, ea obiter & lævi dígi-
to adumbravi.

Et sane optandum foret, ut de denominazione colorum inter se convenirent, Auctores, sunt enim plerique terminis vagis dicti, non modo idiomate Latino, sed & Gallico, Anglico, Germano, Belgico; quid v. gr. *Fulvus* sibi

velit quod *Testaceus*, *Vinaceus*, *Luteus*, haud convenient *Zoologi*; *Animalium* tamen genera, quædam & proprios colores habere, accurata, docebit contemplatio, sic inter *Quadrupedia*, nulli *Colores Primarii*, nec ipsa *Antilope Leucophaea*, cyanea, ut dixit olim *KOLBE* quem fecuti plurimi *Zoologi*, *KOLBIO* tamen perparum fidendum; qui fuerat ignarus non litteratus, voluptatibus addictus, ut docent *Clar LA CAILLE*, *FORSTERUS*, *SPARMANNUS*, aliquie), omnia, ad brunneum vel ocraceum, vel ardesium vel olivaceum vergunt; excepta *Talpa capensi*, quæ sola inter *Quadrupedibus Iridis* coloribus nitens; qualis *Aphrodite Aculeata* inter *Mollusca*; præter duas vel tres falcones nullus color primarius *Aquilis*, *Picorum* color e contra viridis & coccineus, albo guttatus vel maculatus; *ALCÆ* omnes nigræ linea alarum alba; & color abdominis albus, *Urinatoribus* tantum non omnibus commune. *Cotingis* sive ampelidibus (una excepta) omnes *Celestini* vel coccinei, *Psittaci* flavi, coccinei, *Virides* vel ex iis mixti, soli *Psittaco* ex *Taïti* color cyaneus gula alba. Sic & in *Piscibus* color dorsi plerumque nigro plumbeus, aliquando ad viridi in vergens, abdomen argenteo, vel *Cyaneus* carmineusve in exoticis vivis. *Insecta*, *Coleoptera*, atque *Lepidoptera* omni gaudent colore, plerumque tamen *Indiæ Orientalis* obscuriores; ut præsertim ex *Equitibus* patet. *Cancri* vero plurimi rubri, maculati, sed de his ut de *Piscibus* & *amphibiis* vix *Judicandum* morte enim, præsertim spiritu vini colores evanescunt ut & in *Molluscis* quibus vivis colores pulcerrimi nec arte pictoriâ exprimendi. *Testaceis* plurimis, co-

lores compositi, ex primariis, solus carmineus, roseusve *Patellis* quibusdam, *Mytilus Violaceus* vel *Indigoceus*, vel purpureus, datur tamen varietas *Mytili Ungulati* colore prafio superbientis.

Cuique speciei descriptæ iconem citavi ex auctore magni nominis petitam, semper ubi aderat coloratam, sic de Quadrupedibus BUFFONII, SCHREBERI, PALLASSII, EDWARDSII, CATESBÆI, MILLERI, VOSMAERII opera adduxi. Quantis ne optimis avium icones dederunt EDWARDSIUS, D'AUBENTONIUS, PENNANTUS, VOSMAERUS, pauca *Amphibia* colorata novi, nisi CATESBÆI quædam & EDWARDSII, SEBÆ Thesaurum coloratis iconibus ornatum, una cum ditissimo museo animalium mecum communicavit prosua humanitate vir ampliss. Lib. Baro RAYE DE BREUKELERWAERD. Sed AMPHIBIA atque PISCES potius ex descriptionibus, quam ad Naturam piæta vidi, omnia non tantum (paucissimis exceptis, verbi gr. *Boa Canina*, *Coluber Ahætulla*, *Coluber Cæruleus*) & quædam alia, spiritu vini contenita, colores amittere, mihi experientia docuit, vidi enim in pulcerissimo museo D. JULIAANS Amphisbænam fuliginosæ varietatem annulis nigris coccineisque superbientem, quam diu in spiritu facchari erat (Taffia vel Rum) in spiritu vini transposita, sensim evanuit color ille intensé roseus, atque in fordide album mutabatur, sic vidi pulcerimos annulos citrinos *Tetradontis ocellati* in album mutatos; Eadem cl. PALLAS de *Rana Variabilis* observavit, & ego de *Rana Geographica*; itaque nimium nec credo colori in *Amphibiis*, aequæ

æque inconstantem numerum scutorum atque squamarum in serpentibus observavi, inde secundum meam methodum eas secundum delineationem degissi, sive lineatæ, lemniscatæ, ocellatæ, punctatæ, Rhombæ etc. sint nec numerum apposui nisi quæ a LINNÆO, GRONOVIO, PALLASSIO aliove Zoologo, vel a me ipso numeratae sint.

Synonyma rejici, ut quæ majoris noxæ, quam utilitatis, nomen BUFFONII, PALLASSII, EDWARDSII, LINNÆI retinui, Linnæaque nomina trivialia, sancte servavi, cum hæc ab omnibus Zoologicis recipiantur; ubi novæ species Linnaeo incognitæ, uti permultæ, cruce (†) notatae adsunt vel alius auctoriſ triviali nomine usus sum, vel ut in Botanicis folet, in magni Zoologi honorem dixi; quasqus ipse vidi species asterisco notavi.

Enumeratis speciebus cujusque generis, observationes tumultuarias brevissimas, adjeci, quibus vel rationes reddo, de dispositione generis vel specierum, vel magnorum Zoologorum observata, vel antiquorum nomina etc.

Plurimas novas me addidisse Linnæano systemati, & facili videbit B. L. In systemate Linnæi enim 210 quadrupedia, dum ego 396 itaque duplo fere auxi; avium numerum quadruplo fere majorem sequens ex hibebit volumen, *Amphibiorum* duplum abstractis nihilominus *Nantibus*, quæ ad *Piscium* ordinem retuli, una cum *Cetis*. Numerum, *Piscium* duplum fere; Infecta æque ac conchylia nondum nu-

numerare ausus sum , cum mihi quotidie inse-
renda nova obveniunt ; Animalcula *Infusoria*
sive *Chaotica* nondum descripsi ; haud tamen
omnia me enumerasse prope scio , id hominis
non est ; de historia naturali adeo bene meri-
tus *ZIMMERMANNUS* numerum specierum ad
7000000 statuit , anjure quis affirmabit ? 30000
statuit venerandus *Martinettus* ; sed si ad præstan-
tissimorum Zoologorum opera oculum vertimus ,
præsertim inter *Aves* multas varietates pro spe-
ciebus a quibusdam esse dictas , patet : v gr. *Man-*
cum Superbum , primo anno totum viridem cri-
sta coccinea ornatum , dein adultum nigrum
dorso cyaneo pictum , quis eandem esse avem
crederet ? Quantum ne a se differt *Vidua* tem-
pore mutationis pennarum ? Quanta ne talia
exempla præbent *Lacertæ* , *Colubres* , *Locustæ* ,
Blattæ quoad earum Larvas , & *Imagines* ; idem
& de multis *Testaceis* , quæ præterea & poliendo
majorem differentiam præbent , quis *Strombum*
Luciferum nondum adultum , eundem esse cum
adulto affirmaret , quanta ne differt *Venus* or-
bicularis poliendo flava , ab eadem non polita
alba ? quantum ne aqua fortis cypream arabi-
cam a se ipsa mutat ? *Conus Litteratus* niger macu-
lis trigonis albis , soli opposita in littore diu jacens
in luteum pulcerrimum mutatur & vero luteo
adeo similis , ut & primo intuitu ipsis artis gna-
ris decipere valeat ; idem & de melolontha ful-
lone obtinere mihi affirmavit cl. *VOSMARIUS* ,
ex permultis hæcce sufficiant , anne igitur sæpe
pro speciebus perperam haberi possunt & re-
vera habentur ? sicque numerus specierum in-
fra vel supra verum minuitur , vel augetur ,
inde omnem animalium , Plantarum , atque
mi.

neralium enumerationem magis ex calculo Mathematico , atque quadam analogia , quam ex observatione & Experientia petitam credo (vide de hacce re *Gotting anzeich. April 1784. p. 543.* ad recensionem cl. ZIMMERM. operis) imo & forsan , multa ab auctoriibus nota , in tantâ copiâ , tamen desiderari vereor , nullum tamen animal adduxi , quod non ipse in citato auctore evolvi , aliorum citationibus , haud fidens , vel quod non ipse vel vivum vel mortuum , vidi , & ad prototypon olim vel & nuper adnotavi.

Operis primum volumen jam tibi Offero *Lector beneyole* quod si tua , quam peto favore , secunda naviget aura , alterum , quod jam sub prælo sudet , brevi sequetur , & post id cetera , quinque vel sex voluminibus enim constatarum opinor si D. O. M. mihi vitam vires largiri velit , vale itaque , mihi meisque laboribus faveas precor .

Dabam Ultrajecti ad Rhenum
14 Novembris 1784.

S Y L L A B U S

AUCTORUM, QUIBUS IN HOCCE VOLU-
MINE USUS SUM.

Aet. Holm. Der Königl. Schwed. Acad. der Wissenschaften
Abhandlungen, aus den Schwedischen Über-
setz durch Abr. Gottl. Kästner, Ecips. 1739
1782. 8vo.

Adans Seneg. Histoire naturelle du Senegal, par M. A-
danson, Paris 1757. 4to.

Albin Birds. A natural history of birds illustrated with a
hundred and four copperplates, by Eleaz
Albin, Lond. 1734. 1738. 4to val. I—III.
pietæ mediocres).

Aleff. quadrup. Animali quadrupedi tolti dal naturali disseg-
nati, incisi e miniati, co i lor veri colo-
ri, del Innoc Alessandr. & Pedro Scata-
gia in Venezia 1771—1775. IV Vol.
fol. (fig. Buffonianæ plerumque bonæ,
exceptis duabus ultimis, Cameloparda-
lum & Bisontem exprimentibus ex Ald-
rovando disumtis).

Allam Buff. hist. nat. BUFFON natuurlyke historie der Die-
ren vid Buff.

Aristot. hist. anim. Aristotelis historia de Animalibus, in
operibus Aristotelis.

Beckman hist. nat. vet. Beckmanni historia naturalis veterum
Lib primus. Petrop. & Gott. 1766.
12°.

Beckm. Bibliot. Beckmann. Physicalische und öconomische
Bi-

XXXII S Y L L A B U S.

Bibliothec. Gotting. 1770 — 1784. 13
Vol. 12vo.

Berlin. Beschäft. Berlinische Beschäftigungen der Naturforschende freunde, Berlin. 1772. IV. vol. 8vo. icones bonæ.

Berlin. Schrift. Berlinische Schriften der Naturforschende freunde, v Vol.

Bom. dictionn. Bomare, dictionnaire raisonné d'histoire naturelle, Lyon 1772. 9 Vol. 12vo.

Bradl. nat. Bradley a Philosophic. account of the works of Nat. by Rich. Bradley, London 1721. 4to. Icones mediocres.

Briff. quadr. Brisson regnum animale in classes IX. distributum, Paris 1756. 4to.

Browne. Jam. The Civil and Natural History of Jamaica by Patrick Browne, Lond. 1756. fol. Icones mediocres animalium.)

Buff. hist. nat. De algemeene en byzondere natuurlyke historie met de beschryving van des Konings Cabinet door de Heeren BUFFON en D'AUBENTON Amsterd. 1772. seqq. xv. Vol. 4to. cum additamentis Allamandi. Icones bonæ exceptis quibusdam additamentorum mediocres. Histoire naturelle generale & particuliere avec la description du Cabinet du Roi, par M. M. BUFFON & D'AUBENTON, Paris 1749. seqq. 31 Vol. 12mo. Icones bonæ plaque.)

Buff. suppl Supplement a l'Histoire naturelle generale & particuliere, servant de suite a l'Histoire des animaux quadrupedes, Paris Tom. v vi. 1777. tom. xi. XII. 1782. 12mo. (Icones bonæ plaque.)

Ces.

S Y L L A B U S. XXXIII

Cæs. Gall. C. Jul. Cæfaris de bello gallico Lib. viii.

Catesb. Carol. The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands, by Mark Catesby, Lond. 1731. fol. maj. (Icones optimæ.)

Clus. exot. Carol. Clus. Exoticorum lib. x. Antverp. 1605. fol. (Icones satis bonæ.)

Comment. Petrop. Commentarii academiæ scientiarum imperialis Petropolitanæ, Petrop. 1726 1752. (Icones plurimæ bonæ.)

*Cooks voyag. Relation, d'un voyage fait autour du monde dans les années 1768. 1769. 1770. 1771. par le Lieutenant Jacques Cook, Commandant le Vaisseau du Roi *Endeavour*, Paris 1774. 4 vol, 4to.*

Cooks Abrigd. an Abrigement of Captain Cook's last voyage performed in the years 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. extracted from the 4to. Edition in three volumes, by Capt. King, Lond. 1784. 12mo.

De la Caille voyag. Journal historique du voyage au Cap de bonne Esperance, par M. de la Caille, Paris 1763. 12mo.

Edw. Birds. A natural history of Birds, by George Edwards, Lond. 1743—2751. iv vol. 4to. (cum iconibus egregiis coloratis.)

— *Glean. Gleanings of natural history, by George Edwards, Lond. 1758—1764. iii vol. 4to. (cum iconibus egregiis coloratis.)*

Forsk. fn. Orient. Petr. Forskal faunæ Orientalis conspectus, in ejusdem descriptionibus animalium quas itinere observavit, Havn 1775. 4to.

S. G. Gmelin reis. Sam George Gmelins Reize durch Russland

XXXIV S Y L L A B U S.

land zur untersuchung der drey Natuurreiche , Petersb. 1770. iii vol. 4to. (*figurae valde mediocres.*)

Gronov. Zooph. I. Laurentii Theodori Gronovii Zoophylacii fasciculus I. Lugdun. Batav. fol. 1768.

Hafflq. Palæst. Fred. Hasselquist reize naar Palæstina uit het Hoogduitsch overgezet, en met Afbeeldingen en Aanmerkingen verrykt, Amsterd. ii vol. 1772. 8vo. (*Icones mediocres.*)

Histoire de l'acad. Hist. de l'academie des sciences, Paris 1699—1757. 104. vol. 12mo.

Houtt. nat. hist. Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der Dieren, Planten en Mineralen volgens het zamenstel van den Heer Linnæus , Amst. 1761—1784. 36 vol. (*tres priores continent quadrupedia , figuræ pleræque optimæ.*)

Jonsth. quadr. Joh. Jonsth. theatrum universale omnium animalium quadrupedum , fol. Heilbr. 1755. figuræ pleræque pessimæ.

Kæmph. amœnit. exot. Engelb. Kæmpheri amœnitatum exoticarum Politico- Physico- medicarum fasciculi v. Lemgow 1712. 4to. (*Icones animalium male.*)

Kalm Americ. Reis door Noord-America gedaan door den Heer Pieter Kalm , ii vol. 4to. Utrecht 1772.

Klein quadr. Jac. Theod. Klein quadrupedum dispositio brevisque historia Naturalis , Lips. 1751. 4to.

Kolbe beschryv. Petr. Kolbe beschryving van de Kaap de goede Hoop etc. fol. Amsterd. 1732. (*Icones & descriptiones male.*)

Linn

- Linn. amoenit acad.* Carol. Linnaei amoenitates academicæ. Holm vii vol. 1749—1769. 8vo. figura animalium pessimæ.)
- Linn. fn. suec.* Carol. Linnaei fauna suecica editio altera auctior, Stockholm 1761. 8vo.
- Linn. mus Ad.* Caroli Linnaei museum Adolphi Frederici, Stokholm 1754. fol. (figuræ bonæ.)
- Linn. syst. nat. 6.* Caroli Linnaei sistema Naturæ 6. Leid. 1756. 8vo.
- Linn. syst. nat. 10.* Caroli Linnaei sistema Naturæ edit. 10. 8vo. Holm. 1758.
- Linn. syst. nat.* Caroli Linnaei sistema Natura edit. 12. 8vo. Holmiæ 1768. iii. vol. volum. I. animalia continet.
- Linn. mant. II.* Caroli Linnaei mantissa plantarum altera, Holmiæ 1771. 8vo. prima post tomum secundum systematis naturæ edit. 12°.
- Merian surin.* Mar. Syb. Merian. Insecta Surinamensia, Amstelodam, fol. max. 1719.
- Naturfors. der Naturforscher*, Halle 1774—1784. xx vol. 8vo.
- Nov. Comment.* Novi Commentarii Academæ Scientiarum Petrop. Petropolitanae xx vol. 1750. 4to.
- Osb. Ostind.* P. Osbek reize nach Ostindien und China aus den Schwedischen übersetz, Rosk. 1765. 8vo.
- Pallas. miscell.* Petri Sim. Pallas miscellanea Zoologica, quibus novæ imprimis, atque obscura animalium species describuntur, Hagæ Comitis 1766. 4to.
- Pall. spicil.* Petri Sim. Pallas spicilegia Zoologica xiv. fa-
scic-
*** 2

XXXVI S Y L L A B U S.

sciculi, Berl. 1767. seqq. 4to. (*cum opimus iconibus.*)

Pall. Dierk. Dierkundig Mengelwerk in het welke nieuwe of noch duistere zoorten van Dieren door nauwkeurige afbeeldingen, beschryvingen en verhandelingen opgehelderd worden in het Latyn beschreeven door den Heer P. S. Pallas vertaald en met aanmerkingen voorzien door P. BODDAERT 6. fascioculi. (*Icones mediocres*) traductio est præcedentium cum quibusdam observationibus.

Pall. reis. P. S. Pallas reize door verscheidene Provinzen des Russischen Reichs. III vol. 1771. seqq. 4to. (*cum bonis Iconibus.*)

Pall. nov. sp. P. S. Pallas novæ species quadrupedum ex glirium ordine, Erlang. 1778. 4to. (*cum nitidis sumis Iconibus.*)

Pall. beitr. P. S. Pallas neue Nordische beyträge zur Physikalischen und Geographischen Erd- und Volker beschreibung, Naturgeschichte und OEconomie, IV band. Petersh. und Leips. 1781. seqq. 8vo. (*cum bonis iconibus coloratis.*)

Penn. britt. T. Pennant Brittisch Zool. Lond. 1769. fol. Zool. (*Iconibus coloratis non optimis.*)

Penn. synops. Th. Pennant synopsis of quadrupeds, Chester 1771. 8vo. (*cum iconibus plurimis.*)

Penn. quadr. Th. Pennant history of quadrupeds, London 1782. 4to. 2 vol. (*cum figuris mediocribus.*)

Petiv. gazoph. J. Petiver Gazophylacium nature & autis fol. 1702. fol.

Plin. hist. nat. C. Plinii secundi naturalis historiæ Lib 37. fol. 1537.

S Y L L A B U S. XXXVII

Riding. anim. Abbildung der Jagdbaaren Thiere mit der selber angefugten Fährten und Spohren von Joh. El. Ridinger , Augsb. 1740. fol. (*egregiae.*)

Schreb. Zaugth. die Zaugthiere in abbildungen nach der Natur met Beschreibungen. Erlang. 1775. fig. 4to. iii vol. vidi egregium opus , præter Buffonii incones multas novas continens.

Sebæ Thes. Alb. Sebæ Locupletissimi reum naturalium thesauri accurata descriptio , Amstelod. 1734—1765. iv fol. max. Tom. i. quadrupedia & quasdam aves exhibet, opus splendidum.

Shaw reize. Th. Shaw Reizen door het Oosten , Barbaaryen en de Levant, vertaald door P. Boddaert Med. Doct. met Aanmerkingen van de Hooggel. Heeren S. Rau , L. G. Saxe , en M. Tydeman en van den Vertaaler , ii vol. Utrecht 1773. 4to.

Sparm. itin. Andr. Sparmann. Reize nach den vorgeberge derguten Hoffnung , dem Sudlichen Polarlanden und um die welt, hauptfachelich aber in den Landern der Hottentotten und Kaffern in de jahren 1772—1776. aus den Schwedischen Übersetzt von Christiaan Heinrich Grockurd , herausgegeben und mit einer Vorrede begleitet von Georg Forster , Professor zum Carolino zu Cassel , Berlin 1784. 8vo. (*cum optimis figuris.*)

Tulp. Obs. Nicol. Tulpia centuria Observationum , 1672. 8vo.

Valent. amb. Valentyn Oud en Nieuw Oostindien , v vol. (vol. iii. animalia continet) Dordrecht 1726. fol.

Zimm. geogr. gesch. Zimmerman Geographische geschichte der Mensche und alom verbreiteten

XXXVIII S Y L L A B U S.

vierfussige Thiere. Brunsw. 1772.
1781. III. vol. 8vo.

Quamvis omnes hi auctores de Quadrupedus in hocce
Elencho non citentur, nihilominus, quemque pervolvi, ut
speciem animalis conferrem.

ERRATA ET ADDENDA.

Pag.	I	reg. 14	<i>pro</i> Noc	— nec.
—	1	34	offert	— offerat.
—	2	9	ineffabilis	— ineffabilis.
—	3	16	vevificat	— vivificat.
—	—	34	op	— ope.
—	4	22	haecee	— hæ.
—	5	19	nectaria	— nectariis.
—	6	4	ramosissimus	— ramosissimum.
—	—	17	dilatione	— dilatatione.
—	—	19	vintriculus	— ventriculus.
—	10	ult.	Quadrupedius	— Quadrupedibus.
—	14	13	calcarâ	— calcareâ.
—	—	penult	instrumenm	— instrumenta.
—	17	26	præsentir	— præsertim.
—	19	24	Plantarum	— more Plantarum.
—	—	27	edit 12	— edit in 12°.
—	20	29	hisie	— nisi.
—	23	1	globum	— in globum.
—	57	7	tap.	— tab.
—	—	22	adde. n. 76. tab. 18.	
—	—	28	adde. post PENN. p. 175. n. 77.	
—	58	ad Dianam	<i>adde</i> corpore nigro, dorso castaneo, frontis linea alba.	
Pag.	59	12	tab. 36.	— tab. 37.
—	—	17	tab. 16.	— tab. 26.
—	—	30	Monstac	— Moustac.
—	—	31	Monstache	— Moustache.
—	60	16	tab. 21.	— tab. 22.
—	61	19	Alonotte	— Alouatte.
—	—	27	monour.	— monogr.
—	62	8	tab. 4.	— tab. 8.
—	—	29	tatris	— atris.
—	63	4	tab. 17.	— tab. 12.
—	76	ad. <i>Didelphin mursupiale</i> m	adde cauda prehensili.	
—	77	ad <i>opossum</i>	adde: datur & rarissima alba varietas quam vivam vidi apud virum celeb. W. VAN DER MEULEN ; anno 1769. an vero illi oculi rubri, non memini.	
—	81	7	ut Holm.	— aet. Holm.
—	88	32	dubito Pekan	— dubito; Pekan.
—	90	11	tab. IX. p. 14.	— tab. 14.
—	92	Observ. 2.	Leonis generositatem, veteribus, ho- diernisque adeo celebratam, tamen negat SPAR- MAN-	

ERRATA ET ADDENDA.

MANNUS in itin *Capensi*, ut & ejus indolem heroicam, in fugientibus fævire a defendantibus fugere; astu & in tenebris in hominem atque animalia insidere dicit.

- 95 — 17 — *Sackal* — *Chakal.*
- 104 — 27 — *səparand* — *separandu.*
- 116 — 17 — *Auriae* — *Arausiaci.*
- 145 saltatricem Antilopen, a saccata distingunt AL-LAMANDUS & BUFFONIUS, sed, perspectis iconibus, iis cum ipsis animalibus collatis, eandem esse facilius crediderim, quam quod *Pygargus*, *Cervi Capra*, atque *Saltatrix* eamdem speciem efficiunt, ut voluit SPARMANNUS in *itinere Capens* p. 416. edit germanicæ, quoad meam iconem, rudiore stylo sculptam fateor, sed figuram, ex ipsissima, Schoumanni pictoris animalium in mea patria facile Principis delineatione, ad prototypon facta, sculpi curavi; inde celeb. BEKMANNUS eam bonam judicavit in *Physical. Biblioth.* III.
- 163 post versiculos MARTIALIS *Animal a Hiobo Cap. XXIX. v. 9.* & in Psalm xxii. v. 22. sub nomine hebraico *Rem* vel *Réem* memorato, non finisse *Taurum ferum* ut putavit doctiss. SCHULTENS *Comm. in Jobum* vol. II. p. 1115. 16. 17. nec *Caprum* duplicicornem ut voluit BOCHART *Hierozocc.* p. 48. sed *Rhinocerotem* bicornem, demonstravit cl. CAMPERUS *Natuurk. Verhandl.* I. p. 143—135. quam opinionem amplexus est celeb MICHAELIS; qui pro hebraico *Lem*, *Rem* legi debere jam nunc inavult.
- 172 adde ad *Observationes;*] 5. *Pellem* ultimam, qua Tabernaculum jussu Moysis tegebatur, haud pellem *Janthinam* ut habent *Biblia Vulgata*, sed tergus *Phœcae Ursinæ* juisse demonstravit cl. MANGERS in *dissertat. de iis que ad usum Tabernaculi petita fuerunt.*

INTRODUCTIO.

Inter omnes , quas hominum sagacitas , atque sciendi insatiables cupidus , colit scientias , Historiam naturalem hocce , quo vivimus seculo , haud insimum , occupare locum nemo negabit , qui scientiarum ambitum imo & oculo fugitivo perlustraverit . — Nec mirum id cuique videbitur , qui omnia , quae ex hacce scientia & Naturae perscrutatione , in societatem redundantia bona , atque commoda vitae perspicere valet , quantane ex tribus Naturae Regnis , habemus ? Alimenta Vestimenta , Domus , Medicamenta inde prosluere , quasi ex inexhaustibili fonte quis non videt ? inde Mercatura , OEconomia , Artes Mechanicæ florent atque vigent ; inde Hominum societas arcto constringitur vinculo ; Noc hic desinunt Scientiae Naturalis emolumenta ; sed terminos latius longe extendunt , cum nobis Omnipotens , summi Sapientis , atque infinitus boni Numinis existentiam , digito monstrat ; DEUM enim creatorem , omnia ex nihilo produxisse & summam Providentiæ sustentare , clamat tota Natura ; & inde hominem bene natum , summum rerum arbitrum totis viribus colere jubet ; hic enim præcipuus scientiæ finis . Sed & etiam sagaciora Ingenia , historiæ Naturalis objecta , altius inquirunt , & inde nova detegunt , ad salutem generis humani facientia , sive ad Artes , ameliorandas & perfectiores reddendas ; ad res œconomicas facilitandas , inde Anatomæ , Chemicæ , Pharmacie , gloria atque decor , quantis neotericorum detectis , nostrum non gloriatur ævum ? & quae adhuc latent multa , jam nunc assiduo queruntur labore ; non ab uno alterove sciendi cupido ingenio , sed amabilis scientia tantarum per totam Europam Societatum objectum est , eaque FORSKALIUM , NIEBURNIUM , PALLASIUM , COOKIUM , BANKSIUM , aliosque , laudabili inquirendi ardore peritos viros , ad utrosque Polos & Terræ habitabilis ultimos terminos misit , & quanta nova , docta hæcce Itinera produxerunt , grata mente docta adgnoscit Europa . Sed & quantus campus contemplatio hæcce Naturæ , eam perlustrantibus offert , quis non videt ; ubique terrarum fere offerunt rerum Naturalium copiæ , variantes loco , climate , multisque aliis circumstantiis , ita ut ab Arctico Polo , ad æstuaria , perpetuoque sole ardentina climata sub æquatore sita , usque ad antarcticum , Theatrum Naturæ quasi mutetur ; atque obtuenti varia porrigit objecta , figuræ , vivendi methodo ,

A

do ,

do, atque propagatione; nutritione & toto cœlo a se differentia. Homo in centro creationis quasi a Numine positus solus inter omnia, mente perfectiore atque sublimiore Ingenio donatus, hæcce perlustrare capax, sedubi mens humana inter hæc omnia vagatur, obstupescit atque attonita redditur, supra se infinite videt magna, infra se infinite parva; quanta distantia a *Saturno* ad monadem infusorium!

Quam ineffabililis illa sit distantia, nihilo minus cohærent mediantibus permultis objectis intermediis, sibi undique affinibus, & ab omni parte tangentibus, ita ut tota creata natura, non catena, ut vulgo creditum, sed rete mentiatur, postea enim videbimus, quamque classem, quodque naturæ genus nou uni sed pluribus adhærere; ita tamen, ut numquam per saltum sed insensibiliter progrederiatur. Ordo enim præcipua lex est quam Naturæ imposuit summus rerum Arbitrus, & inde illa pulcherrima simplicitas, que ex tot innumeris differentibus & diversis unum fecit atque unicam compaginem totius creati orbis.

Inde & simul, distributiones nostras, sic dictas methodicas, haud quaquam Naturæ congruere, nec ad ejus amissim compostitas, palam est, distributiones enim nostræ nominales sunt, anguste circum scripto humano Ingenio, adaptatae; eo tamen perfectiores, quo magis ad Naturæ ductum accedunt.

Inter hæcce objecta, que tamquam nodi hujus mirabilis retes Naturæ sunt, tria principalia primo intuitu cuique patent, atque omnia alia continere videntur. *Animalia* nempe, *Vegetabilia* atque *Fossilia*. Ex his duo priora, adeo arcto vinculo inter se cohærent ut non modo termini utrius que difficillime separantur, sed et, ut unum alterum quasi mentiatur, ovum enim inter tunicas includentes Albnmen, continet vitellum cuius lateri emergenti insertum punctum saliens, vegetans in Embryonem, caulescentem suniculo umbilicali radicatum in placenta. — Mater prolifera promit ante generationem compendium medullare novi animalis sui simillimi, tanquam plumula plantarum, ex genitura pollinifera; cor addidit ramos intra corpus expandens; id principii organici quasi fundamentum, & Bulla aërea sensim dilatanda premit Liquores in Canales, sibi anastomosantes inde animal evadit Machina Hydraulicæ, vegetabilis instar rami-

fi-



ficata, & ut in Plantis bulbosis, cerebrum emittit medullarem substantiam, elongatam per caulem simplicissimum, apice emittem filia nervea, simplicissima, homogenea.

Hæcce medullaris substantia ubique non tantum vestitur ossea crusta, è tubere Cranii, elongata in columnam vertebralem articulatam, caulis nodosæ instar nodis mobilibus, sed & ea Columna vertebralis opposite ramosa, folia dat muscularia nondum quasi explicata, contractilia, fibroso carnosa; Ossa itaque Lignum Plantæ fingunt, & ut in vegetabili circumdantur substantia corticali, interius vasis lacteis radicata, e bulbo cordis elongata in caulem vasculosum, duplicum, parrem, ramosum ramis in infinitum divisus. Ex ultima dechotomia Machinae fructificatio genitalium; æque ac in plantis, aura seminalis pollen in receptaculum mittens ut germin languidum & quiescens in Matre vevificat, atque motum & vegetationem conciliet.

Animal itaque Planta nondum explicata, organaque Plantarum externa, intra corpus animale inclusa; & ut hoc clarius pateat PALLASSII vestigia premens primo *systema vasculosum* perlustrabo breviter; Id quamvis æque ac in vegetabilibus, simplex in machina animali ramosissimum, se per totum corpus expandit, semper tremulum & una cum systmate venoso in receptaculo multiformi radicatum, & extremitate Aortæ in innumera organa dividitur, æque ac arbor in ramos per aëra volitantes, atque in superficie corporis terminatur ut arbor in folia; hisce vasis liquor nutritius animalis continetur, a radicibus receptus, chylus est, ille secretione mutatur in sanguinem rubicundum, album vel aqueum & dein in varia fluida magis minusve densa, ne tamen in circuitu attrita nimis fluida evaderent, aëre egent externo, ille per os intrans Pulmones perrepit, vel ramis fere nudis vasorum in Bronchialibus per totum circum rotatur corpus, op canarium, ut in Plantis, ut omne fluidum nutritium aëre fruatur.

Æque ac Plantis germe Corpus animale Ovum fovet, germe novi animalis continens, idque aurâ seminali in alio corpore animali præparatum adflatur, intumescit, materno sinu fovetur, ex radicula umbilicali fibrillas emittit, nutriendo crescit, dein prodit animaleculum vel perfectum, matrique simillimum, vel mater parit foetus vitello alimentari & al-

INTRODUCTIO.

bamine circumfusum, certo caloris gradu fovendum, ut propriis viribus crescat & vel perfectum animal, matri simile in lucem prodeat, vel Metamorphosi triplici tandem ad statum suæ animalitatis perfectum sensim evadat. Præter hæcce enarrata, in animalibus minoribus quædam adhuc detegit *Physiologia Zoologica*, quibus affinitas animalium cum vegetabilis magis adhuc firmatur ac stabilitur, in quibusdam enim (*Insectis*) Bronchiarum undique per Corpus dispersarum Natura ad finitatem Animalium atque Plantarum declarat, atque analogiam Systematis denotat. Dein simplicissima Echinorum, Lumbricorum, Limacum, structura atque monoculorum oviparorum simul & viviparorum. *Limaces* non tantum omnes, *gynandria*; & multorum conchyliorum ovaria forsitan pericarpis plantarum analoga. Accedit & *Gemmatio* quæ in Animalibus æque ac in Plantis locum habere docent Ranarum larvæ in perfectam imaginem mutandas; convolutis plicatisque alis ex chrysalide erumpit Papilio, mox alas sensim explicans, haud aliter ac flos, summo decore ex spatha vel calyce explicans petala, æque ac Papilionis alæ Iridis coloribus superbientia & ut hæcce duæ adeo affines classes mutuo nexu in unum quasi coalescerent, Creator zoophytas in medio inter ambas stare jussit, miraculis plena Phalanx, summaque in arte Principum ingenia torqueus. a RUMPHIO REAUMURIO MARSIGLIO subolfacta, a BASTERO, ELLISIO, TREMBLEJO detecta & à PALLASSIO extra dubium posita. Animalia complicata systemata nerveo donata, sensim transeunt ad Plantas simplicius organisatas; quæ tandem ope pulverulentarum crustacearum ad regnum fossile accedunt. *Pulina* enim ADANSONII solum modo Pollen vegetans, impalpabilis, organis fructiferis carens, terras inter & plantas media, sic inter se coherent tria naturæ Regna, dum homo animal perfectissimum omniaque alia post ultima fata in terram animalem fatiscunt pulverulentam, ut inde circulus rerum claudatur, atque tota creatio, una quasi massa efficiat.

Sed non modo hæ classes principales inter se connectuntur, verum et summus Creator voluit, ut in quaue classe talis pateret ordo rerum, & ut alterum ex altero, deflueret; sic enim videmus non sine admiratione, inter Animalia; *Quadrupedia*, *Avibus* accedere ope *Struthionis* ab una parte & ab altera per *Phocas* ad *Cetas* siveque ad *Piscium* agmen progredi; dum inexhausta Numinis sapientia ope *Manis* ostendit & *Quadrupedia Lacertis*, siveque *Amphibiis* potuisse

con-

coniungi, si figuræ vivipari Animalis, structuram internam ovipararum addidisset. Aves urinatores ope *Diomedæ*, *Sphenisci* etc. Piscibus accedunt tanto magis, cum alæ quarundam non modo volatui ineptæ, sed & squamosæ sint. Pulcherrima *Avium* phalaux & structura internâ ad *Amphibia* accedit, inter quæ & *Draconem* volantem Avium instar altiora petere, Terramque relinquere videmus; dein & *Trochilus* minimus vix pedatus, Lingua tubulosa inter volandum viatum ex florum melliferorum nectaria hauriens, accedit ad *Sphingum* familiam, quæ aviculam magnitudine superant, & ut illa vividis gloriantur coloribus, sique Aves *Insectis* conjunguntur laxiori tamen nexu. Hæcce numerosa classis in qua adeo luxuriosè ludunt Physiophili; ope *Scolopendræ*, atque *Juli* ad molluscas *Aphroditas* transeunt, illis externa figura & interna structura adfines, sique Natura per *Ap'iroditas*, *Nereides*, *Serpulas*, ad *Tubularias* & inde zoophyta transit; sed ubi *Thetydes*, *Laplysiæ*, *Ascidiae* cetera que Testas uni vel bivalves inhabitantia collocanda ægrius determinatur, cum eorum forsitan vix centesimam novimus partem. Ut itaque ramos, quibus animalia inter se consanguinitate junguntur, perlustremus, necesse est ut internam fabricam animalium noscamus, qua, a complicato Quadrupedis Systmate ad simplicissimum polypum sensim descendit Natura. Levi itaque digito, ea quæ ad vitam animalem pertinent in quaque classe depingam.

CONTEMPLATIO

ANIMALIUM.

Primum hic obvenit *systema vasculosum* in majoribus atque perfectioribus Animalibus ramosissimus; sensim simplicius evadens, donec plane evanescere videatur; in medio pectore *Cor* locatum, duobus ventriculis, duabusque auriculis instructum, ut venosum sanguinem tecipiat, atque emittat Arteriosum; *Ventriculus* sinister *Cordis*, sanguinem per totum Corpus ope Arteriæ *Aortæ* distribuit; progreditur itaque sanguis a corde per Corpus, adque cor redit per *Venam cayam*, ostio venoso in ventriculum dextrum irruens; inde per ostium Arteriosum in *Arteriam Pulmonalem*, quæ in *venas Pulmonales* pellit ut ad *receptaculum venosum* sinistrum parveniat; ex quo per *ostium venosum* in ventriculum sinistrum, & ex eo per arteriosum intra aortam. *Cor* itaque accipit sanguinem venâ, pellit *Aorta*, hæcce duplex cordis actio, fit, contractione & dilatione ventriculorum quod artis gnaris *systole* ac *diastole* audit, Aures, sinus, arteriæ sibi respondent, ut quo tempore cordis vintriculus est in diastole, Sinus, Aures, Arteriæ systolen patientur; idque tam subito, ut uno momento omnia absolvi videantur.

Cor ipsum varium in variis plerisque. *Porcellus* indicus *cor* habet rotundum fere, ut & *Erinaceus*; *Talpæ* conum oblongum mentitur, in *Mele Coati* quique ventriculus in apicem abit, unde cor bicuspidatum videtur & quare corniferis cervis, *Hircis*, *Bovibus*, duo ossicula in corde? *Avibus* cor triangulare plerisque.

Piscibus cor magis adhuc variat, semicirculare planiusculum in *Cyprino*, *Carpione*, Pyramis triquetra in *Mugile*; *Scombro* tetraëdron, omnibus uniloculare uni auritum & cum in *Quadrupedibus*, Avibusque *Aorta* lata basi magnoque lumine cordi inhæreat, angustior prope cor *Piscibus*, dilatatur, dein iterum angustior fit, atque coni elongati instar pergit ad *branchiale systema*, margini eujusque illius laminæ

Ve-

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 7

Vena, quæ sanguinem in truncum, arcui osseo super positum transfundit, tandem venæ omnes, ex octo arcibus osseis provenientes in unam cœunt, quæ trans spinam dorsalem currendo, Aorta descendens vice fungitur; venarum extremitates alteræ sanguinem in aliud truncum, transmitunt, qui truncus, sinem invenit ad receptaculum *Duverneji*.

Amphibiis plerisque cor infra *Pulmones*, biloculare, biauritum, ut testatur DD. NOBLEVILLE & SALERNE in serpentibus, celeb MERY in Testudine terrestri, HASSELQUIST in *Crocodilo*; perperam itaque celeb. LINNÆUS cor unicoculare, uniauritum pro diagnosi ordinis habet; in hisce sanguis prius ventriculos intrat, auriculæ superfluum recipiunt, sinus dexter recipit sanguinem ex *Vena cava*, sinister ex *vena Pulmonali* & per eam sanguis per totum Corpus dispergitur, & pro parte in cavitate dextrâ recipitur.

Aphrodite aculeata Corde caret, sed Systema vasculosum ex Intestinis transfertur in vas magnum, ramos omnibus corporis partibus, porrigena.

In *Laplysia* LINN. cor membrana convoluta, utrinque desinens in vas, recta procedens absque ramis lateralibus. *Dordi Argo* cor nullum. Secundum BOHADSCNIUM & PEISSONELLUM. — *Limacis* cor pyriforme *Aortam* ex apice tradit. — *Insectorum* cor tubulum vel canalem longitudinalem absque ramis esse statuit oculatissimus ZWAMMERDAM, vero eum canalem cor esse dubitat LIONNETTUS insectotomus eximius; oscillationes tamen, cordi aliquid analogum testantur; semilunare *Animalculi rotiferti*, aliorumque *Brachionorum*, saepius vidi, haud tamen & solare microscope mihi *Arterias Venasve* ostendere par fuit, — cor *Polypis goniis*, *monadibus* etc. denegatum videtur. Quæ omnia si attento animo perpendimus videamus, Systema vasculosum sensim sensimque simplificari, donec totum evanescere videatur, ubi Regnum animale, Vegetabili connectitur.

Sed ut circulus sanguineus rite procedat, nec variis impeditatur obstaculis, necesse est ut sanguis refrigeretur, aura externa; videamus itaque breviter SYSTEMA RESPIRATORIUM.

Homini & quadrupedibus *Thorax*, quæ crates ossa partim, cartaliginea, partim membranacea mutabilis,

3 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

stabilis tamen. Cuique lateri partis superioris columnæ vertebralis adnexa ossa curva cartilaginibus elasticis ossi sterni adligata quæ Costæ dicuntur; & numero certo plerumque cuique speciei propriæ, quamvis Natura aliquando unam alteramve addat, aut demat, raro tamen.

Homini costæ utrinque duodecim, tredecim bis numeravi in homine adulto & infante; Equis 18. sed Bradypus unau utrinque 23. itaque plures quam ulli alii Quadrupedi.

Cavitas Thoracis costis circumsepta, oblonga, antice ovata superius (in Homine), anterius ceteris animalibus angusta antice parabolicè convexa, sublevatis costis veris augetur ope muscularum intercostalium, scalenorum, ferratorum posseicorum, lateralium, levatorum costarum & cleidomastoidorum; intus Pleurâ obtecta cavitas Pulmones continet binos, bronchiis in tracheam implantatis unitos, hæc a Pulmonibus sursum tendens, in Larynge finitur, qui in os faucesque patulus, ope cartilaginis cricoïdei Tracheæ ad junxit. Larynx iste, musculis ossis hyoïdei, cartilaginis Thyreoïdei & Pharyngis, mobilis. In quibusdam animalibus ut in Simia, Cervo Tarando saccos aëreos, a radice Epiglottidis ortos, sub latissimos colli, occultos, vidit CAMPERUS & in Larynge Simiae Seniculi Tympanum osseum concavum; saccum istum jam animadverterat olim GALENUS Lib. 7. c. 13. — Trachea sive aspera arteria antice annulata, cartilaginea, elastica, posse fibrosa; in Leone annulis totis constans; bronchiis sese in infinitum dividentibus, cum utroque Pulmone jungitur & finitur vesiculis membranaceis, Larynge, trachea; bronchiis aer externus in Pulmones ducitur inspirando, Pulmones meabiles reddit, ut sanguis corde pulsus, facilius transeat, atque refrigeretur. (dum ipse aëris hocce ministerio fixus redditur, atque perniciösus; imo lethalis;) inter ventriculum dextrum atque sinistrum cordis enim Vasa Pulmonaria; sanguis ex auricula cordis dextra per foramen apertum in Arteriam Pulmonalem ducitur, hæc duos ramos Pulmonibus præbet, & ex cavitate cordis sinistra, quatuor surgunt trunci, sese per Pulmones ramosim distribuentes, ex Pulmonibus exiens sanguis, ope quatuor Venarum Pulmoralium abit ad sinum venosum sinistrum, & dein in auriculam sinistram, ex eaque per ventriculum sinistrum abit in Aortam.

In

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 9

In homine, Simia *Satyro*, *Sileno* LINN. (*Maimon* Buff.)
Cynocephalo, (*Macaque* Buff) pleura undique tangit Pulmo-
nes & cavitas thoracis infra diaphragmate ciauditur.

Pleraque animalia cetera, Pulmones multilobos, habent
immo & lobus insimus circa venam caram curvatur aliquando.

In *Lupo*, *Cane*, *Lynce*, *Tigride*, *Leone*, *Mustela*, *Vi-
verra zibetha*, octo lobulos viderunt Anatomici Parisienses,
sex modo tamen vedit D. AUBENTONIUS, ut & in *Antilope*
Dorcade, *Sciuro*, decem in *Erinaceo*, duo tantum lobi in
Elephante, *Camelo bactriano*, *Equo*, *Phoca*.

Avibus Pulmo carnosus, marginibus ferratis, singularis
fabricæ *Amphibiis* Rajis, *Piscibusque Branchiolegis* Bran-
chiæ simplicissimæ. Piscis vero *Branchiales* Pulmones nu-
ilos habent, sed eorum vices replent Branchiæ. Inter *Amphi-
bia* Piscesque medium tenet locum *Siren lacertina*, Pulm-
nibus, branchiis que instructa, mirandum animal, branchiis extus
exstantibus; in *Moiluscis*, Pulmones ut in *Laplygia* LINN. aut
ad annum. ut in *Doride*. Insectis nullus Pulmo, sed Tracheæ
laterales.

In *Quadrupedibus* respiratio ergo fit ope Tracheæ, infe-
rius bifurcate, ramum ad quemque pulmonem porrigena, in
infinity ramulis divisum, quorum quisque abit in vesiculam
membranaceam.

Toto cœlo differt in avibus Systema respiratorium varium
pro vario victu, atque vivendi modo. Pulmones omnibus car-
nosi, Thoraci adiuti; pars superior cuiusque lobi foramen habet
aut duo, ampla, quibus aer in abdomen intrat, singulare id
in *Psophia agamia* (*oiseau trompette*.)

Amphibiis Pulmones simplicissimi; *Bartholinus* tracheam in
serpentibus annulis constare dimidiatis dixit; integros ipse vidi
in colubre *Typhlo*, *Ahetulla*, (serpent aurore) *Jacapara*; vidi
& celeb. *HALLERUS*; in serpenti bicipite duas Tracheas vidi
Redi; totam cartalagineam in *Crocodilo* vidi *HASSEL-
QUIST*.

Sireni Lacertinæ Pulmones carnosæ, eretti tribus for-
nimbus patentes. *Petromysonti* Pulmones aliis nantibus

10 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

amphibiis perfectiores, & præter ea utrinque septem corpora, ad interiora lumine parvo patentia, quodque lumen ope tubuli communicat cum foramine exteriore, & quisque Pulmone in fæculo rubro inclusus. — In *Rajis* foramina exteriora correspondent interioribus multo majoribus, hæc Lamellis adnexa, Pulmonum officio fungentia, in *Tetrodonte*, *Diodonte*, *Balistide* extus branchias, intus Pulmones vidit C. GORDON. — *Pisces Branchiales* Pulmone carent, sed Branchiae, lamellatae eorum loco sunt instar plumæ calami scriptorii, quæque plumula, bilamellata, & hæc lamellæ ope membranæ arcui ostleo junguntur. *Insectis* omnibus foramina respiratoria, in Larvis, Nymphisque visibilia, sed in perfecto animali magis abscondita, vidit eos tamen CC. BASIN, vidit ceb. Baro DE GEER, BONNETTUS, vidi & ego in Papilione *Jo*, *Brassicæ*, *Sesostri*, *Hippolyto*, sphinge *Atropo*, *galii*, (*clotho*) & in pulcerima sesia *Eryce*.

Mirandum hoc Systema in Infectis inimitabili modo depinxit artificiosissimus LYONNET. Erucas sive larvas, Papilionis respirare, docuerunt REAUMURII aliorumque Experimenta, sed an respirent chrysalides tentamina MUSSCHENBROEKII, MARTINETTI, BONETTI nondum plane evincunt; quasdam respireare, certo tempore, sed lentissime, ego credo ex quibusdam, quæ de ea re institui experimenta.

In *Moluscis* mechanismus Respirationis longe aliter; in *Laplysa* Pulmones liberi sub scuto dorsali, Branchiis Piscium adfines, ope *Aortæ* descendantis cum Corde communicant; Doris argo Pulmones prope anum in dorso posteriore positos contrahere valet. *Aphrodite aculeata* simpliciorem adhuc oculo præbet fabricam, celeb PALLAS enim sub quaque squamula, quæ sub dorsali tegmine latet, vidit Branchiarum rudimenta pectinulorum instar, & ego vidi hæc rudimenta bilamellata, atque BASTERO olim ostendi, hæc rudimenta in bilamellatis fæculis hærent.

In *Balano*, vidi plumulas non modo notas, sed & Proboseidem longam, in fæcum satis amplum abeuintem. *Branchias* ostrearum atque Mytilorum, Chamarum, respirationi inservire nullus dubito.

Sic æque ac Systema vasculosum, sensim simplicius fit, *respiratorium* Quadrupedius ex vasis, vesiculis glandulisque con-

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. II

constructum, carnosum avibus, membranaceum Amphibiis, subcartilagineumve, Branchiale Piscibus intermedium inter Pisces & Insecta Molluscis; Zoophytis nullum.

Præter Systema vasculosum & respiratorium, aliud æque necessarium, datur, NUTRITIUM nempe, cuius ope assimilando Corpora solida, fluida corpori animali heterogenea ei assimilantur, atque in animalem substantiam ut ita dicam abeunt, inde corpus animale undique extendatur, amissa representantur & vigeat vita & sanitas.

Æque ac oscula radicum in regno vegetabili, partes nutritivas extus adductas recipient, & Animalia, fluida solidaque, mirando mechanismo per os ad interiora deducent, ubi variis modis digeruntur & corpori nutriendo assimilantur.

Quadrupedibus, rostrum magis minusve productum, in variis; conitâ mandibulis dentatis plerisque; maxilla inferiore processu condiloideo, sola in cavitatem superioris mobilis quamvis & maxillam superiorem mobilem aliquantum, statuit (C. HUNTERUS *Natural hist. of Theets*). Quæque maxilla dentes, habet varios, primores, laniarii, molares, ut solida scindantur, ducendo maxillam inferiorem contra superiorem, ope muscularum Masseterum ac Pterygoideorum internorum; abscissum lingua excipit & prehensum inserit in intercapidem dentium; saliva mollitum atque humectatum commolunt molares, non modo pressu, sed et huc & illuc aguntur ope muscularum biventriū temporalium, masseterum & Plerygoideorum; donec cibus, ope salivæ in pastam redactus, deglutitioni par fit, quamvis hoc ita fiat in plerisque Quadrupedibus haud tamē in omnibus contingit, varius enim Dentium numerus & ordo. Homini incisores quatuor in utraque maxilla.

Laniarii conici approximati, Molares asperi, scruposi, sed Simiae cebo, (cauda prehensili) Laniarius 1. utrinque. Lemuri incisores infra sex. Didelphi supra 10, infra 8. & molares denticulati. Bradypo primores nulli, molares cylindrici 5. Myrmecophagæ dentes nulli, nec Mani. Dasypo primores nulli, molares 7—8. Talpæ incisores inferiores 6 inferiores 8. Sorici superiores incisores 2, superiores 4. intermediis brevioribus. Variat maxime numerus Dentium iuvespertilionibus, Urso iucisores 6 in quaque maxilla. Rumi-

minantibus incisores superiores nulli, inferiores 8. etc; ne nimis sim in re rotissima.

A V I B U S Dentes proprie nulli in maxillis nudis porrectis mobilibus, denticulus enim, sive protuberantia, quæ in rostro Laniorum, Psittacorum, aliarumque avium appetet, æque ac ferratæ mandibulæ Anatum aliarumque aquaticarum cernitur ut & Ramphastis, Bucerote etc., magis & solummodo ad cibum retinendum, quam ad manducationem inservit. Dentes itaque nulli avibus; *Amphibiis* vero, quibusdam dantur, non tamen omnibus, iis enim carent Ranae, Bufones, Testudini maxilla ferrata. *Lacerta volans occidentalis* dentes habet in utraque maxilla, *orientalis* vero in inferiore, *Crocodilo* dentes acutissimi, ut & *Lacertæ amboinensis*, *Iguanæ*. Serpentia quædam iis carent, aliis *La- niarii* magni, incurvi, cavi toxicum lethale stillantes ut in *Crotalo*, *Naja*, *Scytale*.

A m p h i b i a nantia quædem plures series dentium monstrant, Rajæ tres; septem numeravi in squali carchariæ sceleto. Lampræ dentes in stomacho; conchyliophagis in Palato. *Bran- chiolegi* quidam dentes exsertos monstrant duo vel quatuor in *Diodonte*, *Tetrodonte*.

P i s c i b u s Branchialibus dentium ordo variat. Anarrichæ adeo validi, ut moisu signum imo & ferro incudant, acutissimi in *Uranoscopo*, *Blennius cristatus* duos parvos primores habet in maxilla inferiore, *Blennius* vero gattorugine permultos in utraque, in *Echeneïde Neucrate* vix visibles dentes invenio in maxillis, Palatum nec Lingua ullos ostendunt. *Coryphaenam* in maxillis, palato, Lingua dentibus esse præditam, statuit WILLUGBHEY, in rarissimam illam, quam nomine *veliferæ* graphice descripsit PALLASSIUS, solum modo maxillas dentatas vidit, nec ego in palato vel Lingua inveni; *Cottis* quibusdam dentes, haud tamen omnibus;

R o s t r u m quibusdam Piscibus singulare, præter Labia duplicita quoruindam, alii rostrum porrectum habent, ut *Chæ- don rostratus*, extensile rostrum *Sparo insidiatori*. *Fistula- ria tabacaria* rostrum valvula claudit aperitque.

Erucis maxillæ curvæ, ferratæ, forficum instar scindentes; in *Cerambyce cervicorni*, in *Lucanis* præsertim *Lucano mar-*

marginato Voetii maximæ & singulares, ut & in *Cucullione* *dispare* & *Anchoragine*. Talibus maxillis forecipatis, præsertim armavit sapiens rerum omnium Summus *Creator* *Vespas*, *Libellulas*, *Spheges* etc. ob varias œconomicas causas; longissimæ & maximæ mirandæ in *Formica Leone* ut in quo conspicuntur cavæ, dentatæ, & acumine acutissimo (cavo nihilominus) terminatæ, ita ut, non modo, armorum offensivorum, sed & simul antliæ fuctoriaræ vice fungentur.

Molluscorum vero variat oris figura *Ascaridibus* linearis, *Lumbrico* proboscidis instar eminens, sub primo articulo, *sipunculo*, os tubulosum, *infidigatoris* instar retractile, papillosum. *Hirudini* trigonum, tribusque denticulis armatum, *Laplysiæ* planum, *Doridi* os subitus, foramen rotundum monstrans. *Aphrodita*, dentes in ipso habet stomacho, *Nereides* & *Sabellæ* inter antennas; *Actinia* os habet cruciforme; *Tet'rydi* os proboscideum. *Holothuria* rostrum monstrat antennulis sive tentaculis foliatis obsitum, etc. omnibus animalibus ore donatis & œsophagus adest ventriculo continuus, iste vero abit in intestina, ad interiora (tantum non omnibus) tendentia, variis gyris in canalem desinentia, qui excrementa per anum emitit. — Sed quanta, quam miranda in hisce varietas! Stomachus enim & in variis Quadrupedibus Carnivoris unus, simplex, toto cœlo differt a ruminantium ventriculo quadruplici, quibus & intestina longiora carnivoris; medius inter ruminantia & non ruminantia ungulata *sus Tajassu*. Ventriculus Ranarum & serpentium oblongus œsophago & intestino latior, in quibusdam Piscibus ovalis, aliis sphæricus, aliis bilobatus cum appendice. *Medusis* Stomachus haud patet, in *Aphrodite aculeata* oblongus, ore bilabiato, lingulam exferens.

Piscibus intestina cylindrica, linearia, nisi appendices pylori, intestina dicere velles, quibusdam Piscibus duæ tantum intestini curvaturæ, altera ad Pylorum, ad anum altera in cyprino *Bramâ*, *Tincâ*, in *Accipenser*, in *Rajâ* unica; Plerique Pisces vesicâ gaudent urinariâ, quæ duplex in Cycloptero, in *Aphrodite aculeata* intestinum, & novemdecim vel viginti paria intestinorum, in sacculum abeuntium. *Holothuria* tremula longissimum habet intestinum anno exserendum; in *Erucis* intestina crassa atque tenuia; idem & in *Pubilibus culicibusque* mihi monstravit *Microscopium* & his motus

14 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

tus peristalticus. Polypus totus quantus stomachus, Systēma nutritiū itaque in quadrupedib⁹ complicatum sensim simplicius evadit in cœteris clasib⁹.

Nec minus differunt PROPAGATIONIS organa, quæ omnia in variis recensere nimis longum foret, itaque breviter pauca narrabo: *Quadrupedia* omnia viripara; Mares feminas intrant, atque germen in ovo femine inclusum aura seminali vivificant; idque itaque fieri, nec aliter, probavit inauditis antea, experimentis, celeb. abbas SPALLANSANI, ut qui arte & instrumento semen canis masculi in uterus feminae introduxerit, felici cum successu.

Aves ovipare, germen testa calcarā inclusum fovent calore, donec vitello nutritus ad maturitatem, e carcere prodit fœtus. *Amphibia* Piscesque multi ova deponunt femine masculo, extra corpus maternum fœcundanda, nec id tamen omnibus solenne, dum *Murena*, *Blennius*, *Squalus* & alii vivos pariunt fœtus. *Insecta* ova deponunt in sinu matris fœcundata; ova hæc in quibusdam mirabilem superficiem oculo armato præbent; exit ex ovo animalculum figura a parentibus toto cœlo distans, mutatur in aliam quiescentem, ex qua tandem Imago perfecta prodit ad copulationem idoneam; sunt tamen & inter Insecta vivipara non modo, sed quæ una copulatione in quintum progeniem usque, absque mare procreant, id enim in Aphidibus viderunt REAUMURIUS, TREMBLEJUS, BONNETUS quo Triumviratu in Insectologicis, haud videt majus quid, nec præteritum, nec hocce seculum; In *Volvoce globatore* quintam ptogeniem ipse vidi, ope microscopii solaris; *Mollusca* atque *conchylia* ovipara, horum tamen quædam fetum perfectum in ovo calcareo deponunt, androgyna alia, utriusque sexus officio simul funguntur, dum fœcundant, & fœcundantur. *Zoophyta* absque copulatione, fœtum ex latere producunt, ut ramus ramulum; sicut Natura conservans sui, non modo sed & simplicitatis, vegetabilia animalibus adjungit, atque a complicatissima organorum genitalium in Quadrupedibus, ad simplicissimam descendit constructionem Polypi, quæ & adhucdum Lynceis seculi nostri fugit. Æque ac organa vitalia disperant atque sensim simplicius evadunt sic & organa sensoria mira varietate in variis animalibus variant pro vivendi varia methodo, oculus primarius, illud inter omnia sensuum instrumentum, maxime differt, non tantum in variis animalium, classibus, sed & sape

sæpe in eodem, Simia externo habitu & ingenio homini adeo affinis caret albo oculi, quod in homine amicitiae atque hilaris animi, signa demonstrat; in ceteris Quadrupedibus a latere positus oculus est, & in Lupo aliisque carnivoris obliquus signum fallacis animi, atque crudelitatis; magnus pulcerrimus in ruminantibus, præsertim in Antilopibus, parvus vix visibilis in Talpa, & in *Mure Typhlo* plane nullus; in multis Quadrupedibus, oculus membrana nictante tegitur, avium vero oculi planiores quam Quadrupedium & periophthalmo instructi, ut a variis læsionibus defendantur, atque tanta facultate pollet hocce organum ut exaltitudine 17000 & ultra pedum, videat *Aquila* pullos Gallinaceos atque *Gallina* ex eadem distantia videat inimicam avem, & instans periculum pullos notum faciat, aliter Piscium organum composuit rerum Arbiter, ob medium densius in quo vitam degunt, ast has differentias anatomicas & Physiologicas deducere terminos, quos mihi met præscripsi nimis excederet; superius dicta itaque sufficiant. Quam admiranda structura in mechanismo auditus non offert auris animalis, maxime complicata in homine & Quadrupedibus & avibus ductus auditus sive *Tuba Eustachii Tympanum*, *Canales semi circulares*, sed nec *stapes*, nec *malleus*: solummodo parvum ossiculum disciforme, & illis *Limax* deest.

Auditus Piscibus olim plane denegatus, & etiam nuper ab illustr. GOUANO, primus olfecit KLEINIUS, cui ad latus venit *Vener*. SCHÆFFERUS, qui duo ossicula auditoria in Cyprinis ostendit (*Pisc. Ratisb. pentas*) tandem magno Campero in Seculi & patriæ decus nato, hancce rem extra dubium ponere datum est, vidit enim in *Asello* organou hoc separatum a cerebro, membrana molli, flexili, pellucida tremula, canalibus semicircularibus adnexa: constat organon cavo ampio osseo, tribus canalibus instructo, qui in capsulis semicircularibus cartilagineis sedem habent. In ea cavitate pons ossæ, ad secundum cavitatem dicit, membrana tamen obtecta, secunda ex fossa cartilaginea, naviculae simili membrana nigrante investita, in qua ossiculum auditus petrosum nullibi annexum continetur, Tria talia ossicula *Lucio Pisces*, in involucrum hujus cavitatis, nervus septimi paris, ramos exserit, sensim minores. Tertio ex tribus canalibus semicircularibus cartilagineis, in quos rami paris quinti & septimi intrant, longe aliud id organum in capite Cetes invenit Doct. KLOCKNER. sed cum fata infelia Lares deserere Indiasque pe-

16 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

petere coegerint, quam mihi promiserat descriptionem haud accepi. *Amphibia* extus organon monstrant adesse cum tympani membrana, satis diaphana & malleum ostendant, Infectis, molluscisve nullum adhuc auditus organum invenerunt Physiologi, id tamen in quibusdam saltem adesse docent, quid enim Cicadarum cantus quo feminas allicere videatur, & a REAUMURIO adeo graphicè descriptum, quid barbularum attritus sonorus in *Phalæna Atropo*, nisi a congenera femella audiretur?

Intime cum auditu Connexa Vox animalium, ope mechanismi Pulmonum & Laryngis hic locum postularet; sed illa miranda compages adeo intricata, complicataque in Quadrupedibus ut nisi longa descriptione vix ac ne vix quidem intelligi possit; obiter itaque atque leviore digito, quædam adnotabo: Pulmones in animale quadrupede ope crurum laryngis, conjunguntur, quæ crura cartilaginea, annulata abeunt in tubum aëreum antice annulis cartilagineis instructum, postice musculosum; in Leone tamen totus cartilagineus perhibetur, inde horrendus ille rugitus e longinquo adveniens tonitru mentiens. In *simis* quibusdam mirandum mechanismum, ad vocis respirationisque organon pertinens, vidit in Zoologica anatome adeo clarus CAMPERUS; in *Simia nempe seniculo* (Alouatte) demptis musculis latissimis colli, vidit *Vir Celeb* faccum, ossi Hyoïdeo adfixum, ovalem, rimam patentem in radice Epiglottidis, tubus facci illius, superficiem cartilaginis Thyrodei in medio occupabat, & se junxerat cum rima mox memorata, inde foccus interne Epithelio laryngis tunicatus; supra rimam glottidis, utrinque cavitas; instar membranæ oblongæ; in *Panisco* (coita BUFF.) Adeo magnus ille foccus ut ad os sterni pertingeret; & musculos sterno hyoïdeos includeret; in *Simia Satyro Ourang Outang*; *Simia Maimon* (Mandrill BUFF.); in *Pitheco* eundem vidit; aer itaque ex pulmonibus, prius in illum faccum membranaceum venit, quo repleto, expirando per os emititur. In *Simia Seniculo* præterea vidit illustris ille ZOOTOMUS Tympanum, quoddam, medium & basin ossis hyoïdis efficiens, fistulæ qua venatores canes revocant satis simile, id ad vocem animalis, multo fortiorum reddendum mire inservit, eamque longe audiri posse testatur MARCGRAVIUS autoptæ. Tale tympanum Laryngis & Asino datum, ut fuse descripsit FERREIN in actis gallicis. Fabrica itaque Laryngis & Epiglottidis varia, varios sonos vocesque animalibus communis;

nicare extra dubium posuere, observationes & Experimenta.

Alia fabrica organi competit *avibus*. Constat hæc enim, ex variis membranis, plus vel minus tensis, in branchiis positis & vario situ concavedispositis, in aquaticis avibus quatuor tales Membranæ per paria dispositæ, superius convexæ subtus concavæ præterea & aliæ in Trachea, transversim positæ, semi lunares; præter has, & adsunt aliæ vario sensu positæ, in media, vel infima trachea; sed maximè notari hic debet alia membrana, inter processus ossis lunaris posita; omnes hæ membranæ, ope aëris ex Pulmonibus exeuntis trement, celerius tardiusve in motum excitantur, pro lubitu avis inde cantus ille suavis Lusciniæ & aliarum canorarum quo longior trachea, eo vox raucior, Trachea hæc longissima in GRUE mare, dum in femina Tracheam brevissimam invenit celeb. Zoologus BLOCHIUS. Plerisque avibus annuli Cartilaginei integri ut & Bronchiaæ, inde clara atque alta vox: præter hosce annulos Trachea permultis donata musculis, tendinibus longissimis illi adfixis, ut annuli plures vel minores numero simul agere & sic sonum variare possent, & hoc multum facit rima epiglottidis, sed ne in hisce longius hæream, Lettorem ad dissertationem Celeb. BLOCHII amandatum volo. (Berlin gesellsch. beschæft. IV. p. 586—606. tab. 16—18.)

AMPHIBIIS quibusdam, vox satis, alta ut in *Ranis* præsentir ea, quæ Surinami nomine *Tibicinis* nota est; Lacertæ quædam sibilant, ut & Serpentes.

Piscibus vox nulla nec ceteris animalibus.

Quod ad *Olfactum* & *Gustum* attinet sensus illi CAMPERIS BLOCHIUSQUE adhuc carent, nec fere nisi exteriore superficie nervos aliquot novimus.

Lævi digito itaque obiter structuram animalium internam, delineavi.

Quod ad externam figuram adtinet, mille modis eam variavit rerum artifex, ita tamen, ut in quaque classe, eandem fere formam retineat, & solummodo proportione variet, sic videmus omnia Quadrupedia sibi quo ad generalem formam ita similia, ut quidem de genere aliquando (raro tamen,) B

18 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

men,) dubitare possumus, de *classe* vero nuncquam. QUADRUPEDIA enim solummodo inter se dignoscuntur proportione partium & modo vivendi partibusque ei inservientibus; omnibus enim sequentia competit *Maxillæ* incumbentes tectæ, *Mammæ* lactantes, *Penis* intrans viviparas feminas, sensuum organa præsentia (excepto mure capensi oculis carente & auribus), omnibus *Pedes* quatuor.

AVES omnes *Plumis* tectæ, *Maxillas* nudas exsertas habent. veris dentibus carentes, *Copula* momentanea, fæminæ *oripare*, Ovum deponunt, teste calcarea tectum; *Pedes* duos totidemque *Alas* habent.

AMPHIBIA, *Maxillas* habent incumbentes, *Penes* bini, ova membranacea feminarum fœcundantes; *Linguam*, *Nares*, *Oculos* semper, *Aures* plerisque, *Tegmen* squamosum vel rugosum, *Pedes* pro corpore humiles, ita ut Abdomine terram tangant, vel nulli.

PISCIBUS *Branchie* loco Pulmonum, *Maxillæ* incumbentes, *Lingua*, *oculi*, *foramina nasalia*, ova membranacea; *Pinnæ* loco Pedum, pro motu; *Tegmen* squamosum, mucosum, cutaceum, osseum.

INSECTA *Tegmine* corneo, fœcundantur in Abdomine, atque ova deponunt, duriuscula, *Maxillæ* laterales. *Respiratio* per poros a latere hiantes, *Antennæ*, *oculi* semper distincti. *Pedes* sex & ultra. Alata plurima.

MOLLUSCA, hermaphrodita vel androgyna, ova membranacea, vivos foetus continentia, *Maxillæ* variæ in variis. *Pedes* *Pinnæ* nullæ. *Tegmen* calcareum, varie formatum bivalve vel univalve multis.

Si QUADRUPEDIA accuratius perlustramus videmus, omnibus non tantum, Corpus horizontale, sub cylindricum, Collum teretiusculum vel compressum, aures acutæ vel rotundæ, (soli *Elephant* quadratae) *Rostrum* exsertum disi-
nens in os, *Pedes* quatuor, unguiculati vel ungulati plera-
que caudata.

Primum quod, præter figuram oculos ferit *Tegmen* est; constans ex pilis eo densioribus, quanto Clima magis ad Boream ac-

accedit, in æquoreis nihilominus *Phocis* parcissimæ. Nec ulla novi Animal pilis plane destitutum; *Dasyphus* enim, quamvis testâ ossâ undique tectus, nihilominus, ad abdomen pilos monstrat; *Sexcinctus* rariſſimos albantes, ut & *Tatue-*
te BUFFONII sive *Dasyphus septemcinetus*, novein cincto & pectus pilosum; *Mani brachyræ* gula, & pectus subtus, & abdomen pilosa. *Macrouræ* vero pili tetosi inter squamas. *Pili animalium Quadrupedum*, in eo cum pilis humanis convenient, quod progerminent ex materie oleoso viscida, sive folliculis pituitosis vasis arteriosis & venosis instructis, in hacce matrice radix bulbosa ex plurimis lamellis constante surgit pilus, constans ex involucro, sive cortice in junioribus molli, in adultis duro, elastico in multis, sub hocce cortice fistulæ tenuissimæ elasticæ, in homine decem, circulatim dispositæ, hæ fistulæ, fibris inter se, & cum cortice junguntur, & canalem formant, qui totus medulla repletur. In omni cutis poro pilum esse, & locum pilis carentem etiam haud poros habere scripsit ill. ALBINUS annot. Acad. Lib VI. p. 57. quod mihi tamen valde dubium, saltem in Homine, melius HALLERUS dixit in plerisque, Elem. Physiol. IV. p. 31. nempe ubi adeps, atque id non semper nec ubique. Pili itaque animalium Plantarum bulbosarum crescere, fuse & egregie demonstravit du VERNEY oeuvr. Anatom. I. p. 295.

Pilorum in homine & animalibus color valde variat pro ætate, climate, allisque multis; quamvis ille color ita variet, semper tamen in Quadrupedibus, ternus, & infimi ordinis, colores enim pilorum sunt albus, niger, fuscus, rufus, castaneus, luteus, sulphureus, olivaceus, ocraceus, griseus, plumbeus; nuncquam vero, secundi ordinis violaceus, amethystinus, aut alias ex coloribus primariis mixtus, tanto minus, ruber, aurantius, flavus, viridis, cœruleusve, Antilopen *Leucophæam* pulcre cyaneam, perperam scripsit KOLBE, eam esse pulcri Ardesiaæ coloris, mihi narravit plus uno Auptopta nec *Lhama*, Peravianum esse sanguineum, demonstravit BUFFONIUS Suppl. a l'hist. des anim quadr. Tom. 12. ed. 12. ex vivo in Galliæ degente. Faciem Miconis Simiae dum vivebat pulcerrime pùniceam fuisse, testatus est celeb *Condamine*, sed de unica specie haud concludere valemus. — Figura Pilorum valde variare demonstravit BASTER-
RUS act. Harlem. 14. p. 399. *Sciuro Getulo* & plerisque ex glirium ordine annulatus Pilus, tardigradi *Ceilonensis* annulos

imperfectis donatus, *Vespertilioni* Spectro articulatus, nitens, *Myrmecophagæ* cuiusdam fuscus fasciis spiralibus albis; in *Bradypo didactylo* albus fuso variegatus; *gulonis* pilus trigonus, quoque latere diaphano, in *Gulone* tamen *Siberico* lumen rotundum vidi celeb *Pallas* etc. — Colores vero Pilorum variant pro climate, non modo sed & pro anni tempore; in Borealibus enim Hyeme albescunt *Vulpes Lepores*, *Martes Ermineæ*. — Paucis pilus corporis in notabilem longitudinem extenditur, qualis in *Hirco Angorensi* in *Fele Angorensi*, in *Bore cauda equinâ* donato (vid. PALL. neue Nordische beytr. I.) quædam tamen Animalia, pilos in quibusdam partibus habent longiores, ut vibrissæ in *gerbois* sive *dipodibus* penicilli aurium sciurorum quorumdam, *Juba Leonum*, *Equorum*, *Antilopes Cannæ*. Cauda Equina, Bovina etc. Nec e pilis coalescunt *Setæ*; ut voluerunt LINNÆUS & BRUNNICHÉ, hæ enim sunt modo pili duriores elasticis sese oculo armato pilorum verorum instar offerentes; tanto minus abeunt in *aculeos* *Hystricibus* & *Erinaceis*, hi *Hystricum* aculei sunt veræ raches pennarum barbulis destitutarum, Tegmen hoc itaque medium aves inter & Quadrupedia; contractione musculi cutem totam moventis eriguntur, instar restringitum Pavonis, quod haud in pilis, hi nuncquam erigendi, nisi in summo & crudeli dolore; ut in famoso regicida *Damiens* visum, vel electrica virtute in homine insulato, cui manus vel aliud anelectricum supra capillos tenetur.

Quadrupedia ope pedum, se de loco in locum, transference valent, ideoque superficiem terræ haud relinquunt, hisi pauci, qui se enormi saltu a terra elevant, vel ope membranæ parvum iter per aëra faciunt. *Pedes*, Quadrupedum, vel potius hic dicenda *fulcra* constant in *anticis*, ex osse humeri brevi, brachii, carpi, *Meta carpi* in posticis ex Femore, Tibia, Tarso & Metatarso. Sed ossa Humeri & femorum in corpore latent, dum in homine & multis avibus valde notabiles; sed sicco pede *osteologiam* hancce prætero, a d'Aubentio graphicè delineatam in immortalis opere quo una cum BUFFONIO de *Quadrupedibus* se immortales reddiderunt; cum ea *osteologia* nimis extensa pro scopo meo, absque figuris ne vix quidem, intelligi possit.

In plerisque fulcra hæc longitudine æqualia, in *Simiis* tamen quibusdam præsertim ecaudatis, Pedes antici longiores, imo

imo & in *Simia longimana* (Gibbon BUFFONII) adeo longi, ut erecto situ animalis, ad malleolos pedum attingant, in *Camelopardali* & antici pedes posticis longiores, unde & truncus solo haud parallelus, sed cum eo angulum efficit. In aliis e contrario Pedes antici breviores posticis, quod glirium in ordine magis quam alibi occurrit, & in genere *Dipodium* insigne adeo, ut pedibus quatuor incedere haud valeant, sed posticis longissimis saliendo procedant, & erecti in clunibus, dormiant, dum antici ad cibum ori admovendum inserviunt, id & *Prosimiae Tarsier* proprium quæ media *Gerboas* inter & *Prosimias*.

PEDES sive fulcra ista in *Tarsos* desinunt, unguiculatos vel ungulatos, & proprio nomine pedum veniunt, antici *Palmae*, postici *Plantæ* dicuntur, ut plantas palmas que hominis mentientes. Quod præsertim *Simiis prosimiisque* proprium inde recte *Bufo* *Manuformes*, *plantæ* enim palmis simillimæ, pauci inter *Simias* pollice carent, qualis sunt *Paniscus* & *Polycomos*. — *Unguium* numerus varius non modo in variis sed & differentia datur inter anticos & posticos pedes; sic in *BRADYPO didactylo* LINN. unguis 2 antici 3 postici, in *Fele*, *Cane* & numerius, anticorum posticorumque variat, in *Didelphide* & *Tardigrado Bengalensi* pollex a digitis posticis remotus; — *Felium* generi unguis retractiles ne lœdantur asperitate soli; indequæ ad lacerandum inepti, aliis subtus denso vellere texit soleas, alma Mater Natura, ut in *Lepore*, *Dasylo*, *Dipode* etc. aliis ne lœdantur callosæ ut in *sciuro* aliisque, fossoriis *Talpis* manus dedit latos breves fere supinas validé unguiculatas, ut terra fodire & a se diffidere possent. Aquatico *Castori* *Lutreaque* Piscivoræ pedes palmati; ut & in fluido progreedi possint, amphibia ista animalia, dum *Phocis*, *Rosmaro*, *Manati* in aquis degentibus, Pedes postici horizontales, dense palmati, vel coadunati in Pinnam, ut sic ad *cetas* progrediatur Natura. *Pecoribus*, *ruminantibusque* cum congeneribus, *Rhinoceroti*, *Elephant*i, *ungulati* pedes.

Hicce fulcris incedunt *Quadrupedia*, motu, magis minusve celeri, & moli corporis. vitæque methodo adæquato, sic omnium tardissime incedunt *BRADYPI*, iique magis repere quam incedere dici possunt, graphicè eorum gressum descripsit immortalis BUFFONIUS; celerrime è contra genus *Antilopum* & *Equi*, *Leones*, *Tigrides* & pauci alii, enormi saltu

22 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

aliquot pedum in prædam subito ruunt. Alia Animalia Arboris scandunt ut *Simiæ*, *Mustelæ* quædam, *Sciuri*.

Paucissimis Animalibus velo donavit rerum Arbiter inter pedes anticos posticosque, ut *Sciuro Petauristæ*, *Volanti*, *Sagittæ*, vel membrana hæc volans, digitis elongatis expanditur & in quiescentibus complicatur in genere *Vespertilionum*. *Cornubus* tandem armata atque ornata, gens *Pecorum* hæc capiti imposita, majestatem quasi Animali conciliant, *Rhinoceroti* vero unicum vel & alterum priori postpositum in osse nasali. *CORNUA* hæc perennia, solida, *Camelopardali* pilosa, penicillo parvo desinentia, vel *ramosa*, recta, annua maribus *Cervini* generis, imbellis femellæ vero iis earent, *Simplicia* annulata, tortuosa spiralia, incurva, recta, ve *Antilopibus* his ut & *Hirco*. *Bori*, *ovi* vaginantia & quibusdam cava; hisce pulcerrimis armis, occurasant hostem, penetrant, osfensivæ itaque simul & defensivæ armavit hæcce Animalia summa Providentia, nec his solis se defendunt, sed *Dentibus* mordent, lacerant *Feræ* non modo sed & irritata cetera tantum omnia, quibus maxilla superior *Dentibus* instructa, quod denegatum *ruminantibus*. *Tertia Quadrupedum Armatura Pedes*, unguiculatis præsertim, *Feris* unguibus acutis longis, incurvis, ope muscularum validissimum vim inferentibus, uno Pedis iectu *Leonem* prædam occidere, ut dolori necessariæ crudelitatis parcat narratur, *Ursus* posticis erectus, ambabus hostem amplectitur simulque suffocat ulnis; Pedibus posticis ruit atque calcitrat *Equus*, tanta vi ut insilientis Leonis maxillas uno iectu dentibus orbet; anticis calcitrando se defendunt *Cervi*, *Hystricis* atque *Erinæci* aculeis spinis que armatum; corpus; *Hystricem* vero aculeos e longinquæ in hostem projicere, nec verosimile, rec verum, idque a celeb LINNÆO inter alios creditum miror; sèpius ego Hystricem cristatam irritavi, pennas erexit grunnitum edidit, cucurrit, nec ultra. *Imbellia* armis, astum vel fugam substituunt, celerrime scandunt arbores, *Simiæ*, *mustelæ*, etc. *Lepus* Canem venaticum cursu antecellit; ut veloci passu mortem evitaret, Nisi Homo ingenii vires, in perniciem Animalium adhiberet atque e longinquæ necem plumbeis alis nutu oculi citius mitteret, nec uni mus sidet antro, sed pluribus gaudet ut mox adytum inveniat. *Manis* se in globum convolvit, squamasque erigit & ita crudelis hostium conatus incassum, reddit, globum aculeatum, offert *Erinaceus*, *vulpi*, in durum cantilagineum, nec dente, nec ungue è la-

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 23

Iacerandum globum mutatur *Dasyphus*. Omnes præsertim parvorum animalium astutias enumerare longum foret.

CAUDA animalium ex vertebris lumbaribus sive potius osse sacro elongata, abscondit turpissimas partes plerorumque, aliquando deest, ut in *Satyro*, *Lare*, *Inuo*, *Pitheco* in genere *Cavie* etc. vel brevissima in *Papionibus Lepori*, *Talpæ*, *Cervis*, *Dntilopibus* plerisque, *Hippopotamo* etc. vel mediocris ad genua usque descendens nec ultra *Elephanti*, *Bovi*, etc. vel longa *Cercopithecis*, *Prosimis*, *Myrmecophagis*, *Manibus*, *Dasypis*, *Cani*, *Feli*, *Gliobus* etc. Figura ejus varia, plerumque tamen cylindrica vel teres, lata, plana, squamosa, depressa *castori* cui ad ædificandum Instrumentum necessarium; depressa *sciuris* omnibus; (præter *Petauristam*), *Castori moschato* (*Souffic BUFFONII*) *Zibet'ico* (*Desman ejusd.*) prehensilis cauda Simiis quibusdam, ut sese in arboribus retineant, *Didelphidibus*, *Hystrici*, fere nuda, squamosa *Muribus*, *Didelphidibus*; *Comosa* sive tota pilosa *Equo*, *Bovi Targutano*; pilosa apice dilatato penicilliformi *Prosimiæ* *Tasier* & *Dipodibus*. Disticha *Sciuro*, *Myrmecophago*, & cauda in usum defensorium animalibus quibusdam datum, ut ea verberum instar insultantem castiget hostem, ut *Myrmecophagæ* quæ madida urinâ foetente caudam ad sperrit, atque oculos hostium ea verberat.

Varia & sunt Animalium Quadrupedum *Domicilia* ut ab injuriis Aeris & tempestatis se defendant, sic Arboris inhabitant *Simiæ*, *Ursus Articus* in scopolis glacialibus se abscondit. *Glirium* ordo sub terra sibi cuniculos fodit, admirandos, a celeb *PALLASSIO* graphicè descriptos, ubi *Murium Oeconomiam*, ex autopsia masculé narrat. *Sciuri* in arboribus nidum ex struunt rotundum superius apertum foramine conico; *Castoris* Architecturam mirabilem quis ignorat? Sic cuique, Provvidentia pro vivendo more consulit.

Omne *Quadrupedum* genus, haud ubique terrarum vagatur, e contrario paucissimis omne clima sufferre dedit rerum Artifex, ex hacce varia horum Animalium Patria, novum Telluris habitabilis illustrationem oriti jussit celeb *ZIMMERMANNUS*, in *Geographia sua Zoologica*; opus plane novum, sagacitatis doctissimi Auctoris splendidum testimonium; summa eruditione, hominem solem ubique degere posse,

demonstrat doct. Aucto^r Hominem sequitur, fidelis comitis instar *Canis*, dein *Bovinum* genus, *Oves* & *Hirci* frigus *Polare*, & ardentiore sole torridas regiones æque perferunt; quod *Equo* negatum, ab qui 64° Borealis latitudinis non sine noxa transgreditur; sub ardentiore cœlo, ad Æquatorem vegetant quidem, ast haud alacres, nec illam, qua in *Europa* excellunt majestatem acquirunt, *sus domesticus* e contrario ubique terrarum, ad gradum 64° læte crescit & saginatur. *Pecora* itaque sive agriculturæ sive rei domesticæ utilia larga manu per orbem terrarum ubique dispersit Providentia semper homini consulens, *Feræ* vero non tantum omnes *Africæ* longe ab humana societate in torridarum regionum desertis & *Aſiæ* latebris amandatae, inserviunt ut nimiam aliorum Animalium copiam devorando diminuere valerent, sicque æquilibrium servaretur inter animalia. Porro ne ullus Terræ locus ab animalibus vacuus pateret, horrida Boreæ glacialia scatent *Phocis*, *Rosmaris*; etc. quæ enormes Cetas cum Quadrupedibus jungunt. *Ulpes* à circulo Polari, usque ad æquatorem vagatur, ut & sua præda *Lepus*, *Cuniculus* vero solummodo calidiora inhabitat; a gradu 64° & infra; *Cervi*, *Damæ*, conspicuntur, ut & glires plerique, *Mustelæ* vero *Borealia* colunt; & omnia hæc utriusque orbis incolæ.

Alia vero Animalia magnas Telluris Zonas in utroque orbe occupant, ut *Tarandus*, qui a *Spitzberga*, ad 54° descendit in *Americanam*, sed *Europæus* haud sexagesimum primum transit. *Alce* a gradu 64 usque ad 45 in *Europa* cernitur & *Borusiam*, *Livoniam*, *Curlandiam*, *Poloniam Russiam*, *Sibiriam*, *Mongoliām*, *Tartariam Chinensem* occupat, olim tamen a CÆSARE in *Germania* observatus. In *America* incipit a *Canada*, & usque ad *Virginiam* cernitur *Martes Lapponibus*, & *Italis* notus. *Borealia* occupat *Castor*, olim tamen in *Italia*, *Ægypto*, *Persia* visus: in Belgii *Iffala* fluvio nuper captus, adhuc in museo Principis servatur; Nunc vero in *Polonia*, ad *Casan Orenburg* & ad *Jaic* domos suas exstruit, usque ad *Lapponum* frigidas sedes; mira quantitate *Castores* alit *America Septentrionalis*, ita ut brevi tempore 50000 in *sinu Hudsonis* necentur, & *Lutra* solum in frigidis utriusque Orbis; quamvis aliquando in *Italia* & *Græcia* visa; a *Lepponia* ad *Saxoniam* dispersus *gulo*, nec tamen ultra, habitat & in *Asia Septentrionali* & in *America* ubi *Lynxem* comitem habet, ut & volantem *sciurum*:

Iatius se extendit *Mus marmotta*, ut quæ in *Pyreneis*, *Austria*, *Tyrolia* etc. usque ad *Tatariam chinensem* procedit; sed video me terminos jam longe egressum, itaque hæc pro specimine dispersionis animalium sufficiant, hæc & cetera diserte ac fuse docet clar. ZIMMERMANNUS in laudato opere ex quo hæcce deduxi.

Larga manu Quadrupedum agmen itaque per totam terrarum orbem in varios usus dispersit summa sapientia. Novimus jam ut ex sequenti Elencho patet, quadringenta species; præter dubias; magnam sane copiam, quæ tamen ab avibus multo superatur.

Ut vero Animalia inter se dignoscantur hujus seculi Naturæ Indagatores, multum operis impenderunt, præsertim ut *Animalium*, *Plantarum* atque *Mineralium*, ordinem Naturalem invenirent unde illa Systemata tam *Naturalia* quam *Artificialia*, quæ jam paucis explanare, non ingratum fore Lectori spero.

Primus qui facem in tantis tenebris accendere nitebatur fuit JOHANNES RAJUS *Anglus* qui decurrente seculo XVII. Veterum Methodum respuens de *viviparis* & *oviparis* Animalibus, divisionem primariam ex duabus vel unicâ cavatis cordis desumvit, quæ divisio tamen æque infimo talonititur (secundum ejus ipsius sententiam) quam præcedens; nam *Crocodilus* duas habet Cavitates cordis; & in homine aliisque animalibus aliquando foramen ovale subsistere docet Anatome. Quadrupedia prorsus dividit in *ungulata*, & *unguiculata* sive *digitata*, *ungulata* dividuntur in *solid ungula* vel *bifurca*. *DIGITATA* dividuntur 10) in *Antropomorpha* 20) in *Fera caninis majoribus* & *primoribus distinctis donata*. 30) *Caninis nullis*, *primoribus quatuor*, hicce ordo glires continet. 40) *Primoribus nullis*, ut *Bradypus*, *Dasyurus*. 40) *Dentibus nullis*: ut *Manis*, *myrmecophaga*. 50) *Pinnata* pedibus posticis pinnatis compedibus, ut *Phoca Rosmarus*. VI. *Quadrupedia alata* vel *volantia* ut *Vesperiliones*. Hæcce Methodus, prima quæ genera & species ostendit magno cum applausu accipiebat seculi illius Naturalistæ, & viguit, donec LINNÆUS & KLEINUS suas divisiones Physiophilis offerebant, imo & adhuc dum *Rajana methodus Anglis laudata*; CELEB PENNANT enim absolutissimum

26 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

suum opus de Quadrupedibus , secundum hancce methodum digesit.

Anno 1734. Clar. KLEIN vir in Zoologicis clarus celebre suum opus de *Echinodermatis* edens, ei coronidis loco, adjunxit Tabulam generalem Methodi Zoologicæ: in qua RAJUM tentavit meliorem & accuratiorem reddere.

Sectio ejus prima continet QUADRUPEDIA pedibus inter se equalibus. Cl. I. pedibus integris gen. I. Auribus acutis Erectis b. neglectis Cl. II. continent bisulca. I. Cornuta gen. I. bicornia gen. 2. tricornia. gen. 3. Metopocera. II. acornia a. ore equino ; b. ore rostrato.

Cl. III. QUADRUPEDIA digitata. I. aurita. I. GENUS felinum a. auribus obtusis. b. auribus acutis. 2. GENUS caninum a. auribus acutis erectis. b. auribus subrotundis. 3. GENUS Cuniculorum , qui Corpus ita contrahunt ut gibbi vel globosi videantur a. plantis hirtis , auribus sublimibus plantis nudis. 1. auribus acutis corpore squamoso. 2. auribus obtusis. corpore a echinato b piloso 4. GENUS glirium a. cauda nuda , b. cauda pilosa , γ instrumentis volatoriis instructæ. a Volatiles. b. Petauristæ.

Ord. II. non aurita huic ordini inserit Amphibia Serpentia & serpentia.

Multa bona imo & egregia, sed plura erronea hic occurtere, quisque facile videt, ut modo unum alterumve exemplum adducam; *Dasypos*, *Hystrices*, *Erinaceos*, inter cuniculos posuit a quibus longe discedunt. Tricornia *Boves Indicos* PLINII & LUDOLPHI dicit; *Aasinum* cornutum, fabulose animal, a Rhinocerote, qui Asinus cornutus fabulæ, separat imo & genere. *Phocas*, *Manatos* inter bipedia, Avibus proximum dedit Locum.

Tandem anno 1735. Surrexit celebris ille Suecus e. LINNEUS, qui ingenio Systematico natus, novam intravit viam inauditam antea , QUADRUPEDIA ex Dentium primorum & Laniariorum numero digestis; sed quantum ne vacillat tale Systema! ut mox videbimus; his adjunxit Pedum armatura, quæ nec sine exceptione; tandem & Characteres, ani-

animalium primariis ex dentibus. Sed & hæc vacillantia.

Inter SIMIAS laniario altero, utrinque carent, omnes quæ caudam gerunt prehensilem, ut *Belzebul* (ouarine BUFF.), *Seniculus* Alouatte BUFF.), *Paniscus* (coaïta BUFF.) *Capucinus* (Saë BUFF.)

Prosimia Catta sola inter congeneres Dentes habet primores sex, dum ceteris sunt quatuor; *Laniarii* illi sunt tres molares obtusi, qui acuti in congeneribus; in *Lemure Tarsi* Dentes primores duo supra ut infra, in *Didelphide Philandri* primores superiores octo, inferiores 2. dum character genericus ex decem superioribus, octo inferioribus constet. *Sorici aquatio Laniarii* nulli (teste PENNANTO) & quantum vacillat Dentum character in *Vespertilionibus*, fusè demonstravit celeb. PALL. in *Spicilegiis Zoologicis* & ipse LINNAEUS *Noctilionem* a *Vespertilione* separare coactus, quamvis excepto Dentum numero, ejusdem plane sit generis; LINNAEUM sequitur in his cl. ERXLEBEN, qui *Pteropis* suis IV. Dentes attribuit primores, utrinque, dum *Vespertilionibus* numero inæquales esse dicit, eos ingeniosè secundum Dentum numerum separat. Et in *sue* variat numerus primorum inferiorum, & in *cervis* quibusdam LANIARI; sic & *cavia capensis* inferius Dentes primores habet IV. ceteri omnes duos; quantum differt figura Dentum Muris *Citelli* a congeneribus, vid ERXLEB. p. 368. & celebr. PALLIASSIUM spec. *glir*; ut & *Mures microphthalmus*, *talpinus* etc. præter hæcce exempla systema e dentibus desumptum, talo infirmi insistere demonstrantia, hocce additum volo: animalia vel viva vel mortua nobis obveniunt, in vivis fane nemo adeo audax ut ferarum os aperire, & Dentes numerare queat; in mortuis exsiccatis infarctis nec vi maxillæ separantur, absque animalis, damno. — Minoribus liquore contentis, Anatome in auxilium venit, sed pretiosiora, rariora, cultello subjicere Physiophilis sæpe nefas.

Postquam clariss LINNAEUS sextam systematis editionem ediderat, cl. BRISSONIUS, primam partem regni animalis, Quadrupeda coutineus promulgavit, vir ille Illustr. & Dentes pro charactere primario habet, quibus & Pedes adjungit. Primus ejus ordo continet, *Edentula* secundus *dentalia* animalia, *Dentibus molaribus*, III. *Dentibus molaribus*

&

& laniis, IV. Dentibus incisoribus in inferiore maxilla. V. Dentibus molaribus in utraque maxilla. α. Pedibus solidungulis, β. bisulcis, γ. terungulatis, anticé & posticé, δ. quāter ungulatis anticé ter ungulatis posticé, dentibus incisoribus. 1 duobus utrinque 2. decem utrinque ε. quater ungulatis anticé & posticé γ. Pedibus unguiculatis. 1. Dentibus incisoribus 2. duobus supra & infra. α. Caninis nullis, * corpore aculeato ** aculeis destituto. 1. cauda plana squamosa. 2. brevissima vel nullā ○) Auriculis longis ○○) Auriculis brevibus. 3. Cauda longa pilosa plana. 4. Cauda longa pilosa rotunda. 5. Cauda nuda vel fere nuda. b. Dentibus presentibus, * corpore aculeis destituto, ** aculeato. α. incisoribus quatuor supra & infra, a. digitis separatis, b. digitis anterioribus in ala expansis, β. incisoribus quatuor supra, sex infra, a. digitis separatis, b. anteriores membrana connexis. γ. Incisoribus sex supra quatuor infra, δ. digitis separatis, 1. quatuor antici, quinque postice, 2. quinque ante, quatuor postice, 3. quinque ante & postice * pollice remoto ** proximo. A pedibus calcaneis incidentibus. A unguibus hamatis δ. digitis palmatis incisoribus sex supra & infra. Decem supra; octo infra.

Et hocce Systema, in quo multa bona, tamen in eo pectat, quod aliquando unica species, ordinem efficiat, & quod vacillanti systemati Dentium superstructum sit.

Postquam BRISSONIUS Quadrupedum sistema ut & avium, (de quo suo loco) ediderat, duodecima comparuit LINNÆI systematis editio; sex ordinibus constans 1. PRIMATES incisores IV. paralleli, laniarii solitarii; mammæ pectorales Pedes manus sunt Brachia diducta claviculis id vero non solis, Primatibus competere docuit cl. PALLAS, ut qui solita sua solertiā & claviculas in Mustelis invenit; & delineavit. Huicce ordini inseruit Simias & ei nomine Lemuris (nescio quare) dictas Prosimias, quarum agmen claudit *prosimia volans*, Animal singulare, quod cum cl. LINNÆO magni LINNÆI filio & in siccato specimine maximo, & dein in alio minore liquore contento examinavi; in minore elegantissimo, cui of subapertum vidi: omnes *Incisores approximatos*, laniarios magnos, acutos, haud ab incisoribus remotos fere ut in *vespertilione* spectro; os non satis apertum ut molares cernere potucrim; pedes unguiculati, nec pollex re-

remotus ut in Prosimis. Noctilionem verum vespertilionem a genere perperam divulgum ad glires amandavit, ob Dentes incisores, in toto genere numero diversos. secundus ordo, ex absentibus primoribus constans, continet Elephantem, quem a latera premit Trichecus ab Elephante toto cœlo figura, habitu atque vivendi methodo distans; quem sequitur Bradypus tantum a Trichoco diversus, quam ille ab Elephanto. Tandem Myrmecophaga, Manis, Dasypus agmen claudunt.

TERTIUS ordo continet FERAS Dentibus primoribus supra sex, caninis solitariis, hic nobis obveniunt Phocæ, canes, Feles, Viverræ, Mustelæ, Ursi, Didelphides, Talpæ, Soricæ & Erinacei, in hocce ordine maximè naturali, (si tria ultima genera excluduntur) Meles cum ursis eodem genere includit cl. AUCTOR. quamvis insigni distent hiatu, ut docuit celeb PALLAS, dein Hystricem ab Erinaceo divulsit atque alium ordinem intrare jussit, ob Laniarios deficientes.

GLIRIUM ordini naturali, præter Hystricem inseruit Noctilionem; quem ad vespertiliores pertinere nemo facile negabit.

PECORUM ordinem, potius ruminantium dicendum, Antilope Grimmia vitavit, quem Cornua habere vidi & ad vivum descripserunt VOSMARIUS atque PALLAS. Genus Antilopum ei pauperrimum Cervos inter & Capras disseminavit, invita Natura; proprium enim genus efficere medium inter Cervos & Hircos primus docuit celeb PALLAS & Giraffam a Cervis separandum & pro Ente sui generis habendum docent cornua pilosa, Juba, cauda, dorsum oblique decurrens, dentes spathulati.

In classe BELLUARUM Hippopotamus structura Dentium toto cœlo differt ab Equo; Tapirum in hocce ordine (vitio credo calami) neglexit; multa plura de speciebus dicere potuissim, sed ne virum in tota naturali scientia adeo insignem, quem vivum, olim & cuius memoriam adhuc veneror, & cuius amicitia atque commercio litterario glorior, spernere viderer, hic sistam, & sane ejus sistema (quamvis, ut omnes res humanæ, haud perfectum), magni faciendum, atque si plura ipse perlustrare potuisset nec aliorum relatis confidere coactus fuisset, multa mutavissem ex litteris suis certus sum.

In-

30 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

Inter omnes Zoologos qui *Linnæanam* methodum secuti sunt, eminent tres Principes, nempe clarissimi SCHREBER, LESKE, & EXLEBENIUS, quorum duobus prioribus adhuc gloriatur seculum, diuque iis gloriaturum, mecum optant omnes veri scientiae naturales cultores, dum tertius flore ætatis in dampnum ejus eruptus, jam sub pedibus nubes & sydera videt.

Illustr. SCHREBERUS magnum ducem e vestigio sequens, systema accuratissimis Iconibus multis speciebus novis, & ante inauditis auget; idque pulcherrimum opus magnum perfectionis gradum obtenturum quis dubitat, ubi notâ omnibus Auëtoris solertia, adhuc auxilio cl. PALLASSII sulcita, omnia fausta, promittit, & ostendit, quoisque sagacitas humana, cum docti in arte principes sese invicem manum auxiliariacem, præbent, pervenire possit.

ERXLEBEN anno 1778. in lucem dedit *systematis regni animalis classem I.* in qua Methodum LINNÆI dentium sequitur; odiues tamen nullos habet, sed quantum Dentium structura atque numerus permisit, duætum naturæ sequens, variaque nova genera annotavit.

Simias in quinque genera dispescuit, secundum varias caudas, præcunte Buffonio; melius tamen unum idemque genus *Simia* in tot phalanges, separasset; ubique novas BUFFONII species, icones atque nomina excitat. *Didelphides Prosimias* seqnuntur, perperam tamen ait: *Plantæ manus*, haud differint *Plantæ* ab aliis Animalibus, nisi remoto pollice; quod & locum habet in *Tardigrado Bengalensi* a Vosmario graphice descripto, & illi animali *palmæ plantæ* que manuiformes; *cauda longa*, gracilis, subnuda, non omnibus, *Didelphis* enim *brevicauda*, caudam habet brevem pilosam, *Kanguro* longam pilosam, *Pteropum* (*Noëtilio LINN.*) ita *Vampyrum*, *Spectrum*, *Spasma*, *Perspicillatum hostatum*, *Soricinum*, *Leporinum a Vespertilione*, genere separat; præuntibus LINNÆO, & BRISSONIO. *Ursis* adnumerat *Melen*, *eotorem*, *luscum*. Rationem quare *Erinaceum*, dentibus primotibus II. ursos inter & sues collocaverit, non video; post sues *Hydrochærus* dein *Hippopotamus*, quem *Rhinoceros* a latere premit, & hure *Elephas* sequitur, *Equus*, *Camelum* itaque ruminantia pone se videt, potius tamen hoc sue *Tajussu* fieri, docent obser-

uationes Anatomicæ nuperrimæ; obscurum *Bovinum* genus, *ovibus* antepositum, dein *Capræ*; *Antilope* has cum *cervis* conjungunt; male mentum imberbe inter Characteres genericos, adeo enim in *Antilope Strepicerote*, non tamen *aruncus Hirci*, sed mentum & gula, crista setosa usque ad paleare protensa; *cavia* genus primus in systemate introduxit, minus recte *glires*, & *Spalaces* a *Muribus* destinguit; *Jaculus*, *Mures* dixerat LINNÆUS, divulgit ERXLEBENIUS, & iterum ad *murinum* genus amandat celeb PALLAS; *Muribus* adstant *Sciuri*, quos sequuntur *Castor*, *Mustela*, *Viverra*, siveque *glires*, *Lutra* ad *Feras* procedunt, *Lutra*, *Mustela*, *Viverra felis*, *Canis*, *Phoca* enim agmen Ferarum efficiunt.

Celeb LESKE & magni LINNÆI systema, sequitur, in docto suo opere *anfangsgrunde der Naturgeschichte* parte I. mutavit tamen generum Linnæanam dispositionem ejusque genera sic se sequuntur, *Simia*, *Lemur Bruta Bradypus*, *Myrmecophaga*, *Manis*, *Dasyurus*, *Rhinoceros*, *Elephas*, *Trichecus*, *Feræ Phoca*, *Canis*, *Felis*, *Viverra*, *Lutra Mustela*, *Ursus*, *Didelphis*, *Talpa*, *Sorex*, *Vespertilio Erinaceus*. *glires Hystrix*, *Cavia*, *Castor*, *Mus*, *Spalax*, *Cricetus*, *Jaculus*, *Sciurus*, *Lepus*, *Pecora Camelus*, *Moschus*, *Cervus*, *Antilope*, *Capra*, *Ovis*, *Bos* agmen claudunt Bellua, *Equus*, *Sus*, *Hydrochærus Hippothamus*; pro meritis celeb LESKENII ordinem laudavit doctiss BECKMANNUS Judex æquus & rerum de quibus Judicium fert probe guarus, atque peritus.

Tandem ultimum quod novi systema, *Linnæano* superstructum, dedit clar. BRUNNICH nomine fundamenta *Zoologica* celeb auctor LINNÆI discipulus, jam antea in scientia naturali bene meritâ laude notatus, systema suum tabellatum disposuit; atque *Dentibus*, *Pedibus*, variisque corporibus partibus, confiposuit, absque ullo ordinum discrimine; cum vero ex absentia *Dentium* incipiat, & inde secundum eorum numerum procedat, necessario genera aliter disponere debuit, quam in systemata *Linnæano*, agmen itaque ducunt *Manis*, & *Myrmecophaga*, *Dasyurus*, *Bradypus*, & *Elephas* sequuntur dein *Natatorii Manis* & *Rosmarus*, (quorum hic, illi antecedere debuisset ob exsertos caninos), jam *Vespertiliones*, *Erinacei*, *Hystrices* sese offerunt, quos a late-

32 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

tere premit gens *glirium*, quam excipiunt *Simia* & *Lemur*; quos sequitur *Phoca*, cui dentes incisores IV—VI. dein ordo *ferarum* sex incisoribus utrinque; qui post se videt *Talpam*, sex supra octo infra & *Didelphides* incisoribus decem supra, octo infra. Secundam divisionem faciunt *ungulata* *Equus*, *Rhinoceros*, *Tapir*, *Sus* (qui Equo post ponendus ob *ungulam* integrum, vel raro *bifurcam*) *Hippopotamus*, *Hydrochærus*. *Bisulca Pecora* his sequi jubet Natura, *Camelus*, *Giraffa*, *Cervus*, *Ovis*, *Capra*, *Antilope*, *Bos*, *Moschus*; qui Quadrupedium agmen claudii.

Ex his itaque patet, *Quadrupedia* in ordines secundum *Pedes*, in *Phalanges* secundum *Dentes* ordinata esse; sed unde tamen, quem tanti facio BEKMANNUS concludat BRUNNICHUM *Lepores*, *Castorem*, *Sciurum* *Simias* inter *Feras* adnumerasse sic que *glirium* & *primatum* ordinem evanuisse, non video.

Nuperrimé, duo Zoologi magni nominis sistema RAJI nevivescere jussérunt maximè auctum & melius redditum tamen, PENNANTUS scilicet in *Historia Quadrupedum* & ZIMMERMANNUS *Geographische geschichte* II. Theil.

Sic breviter præcipuos vidimus Systematicos; omnes, dentibus superstruunt sistema, sed aliud *natura* aliud *Sapientia* dixit. *Dentium* *systema* vacillare, multisque exceptionibus obnoxium esse, atque investigatione haud raro, imo & saepe impossibile; cuique attentius observanti patet, & multa sunt exempla dentis maximopare variare in *Vestimentorum* genere, in SUE; *aper* enim nostras in utraque maxilla senos habet dentes, *Babyrussa* & *Tajassu*, quatuor supra, Sex infra, *Porcus domesticus* quatuor supra, octo infra, *Aper Aethiopicus* nullos supra. *Cavia capensis* incisores habet infra quatuor, quod *gliribus* insolitum, & duo superiores a se distant & crenati sunt etc. Hæc itaque cum torquent Methodicorum ingenia, atque species ejusdem generis separare cogunt, & aliena eidem generi immiscere; alia tentanda est via & quidem ea, quæ monstrat Natura. Non est quod vellem *Dentium* numerum atque dispositionem pro nihilo & vano labore habere, longum id absit a mea sententia, e contrario multum faciunt Dentes, ubi curiosa anatomie

mes indagatio ex Organica constructione & internarum partium inspectione, animalia eadem vel diversa nutriendi, methodo congregat vel separat. Sed summus rerum Artifex, qui se ab omni mortali, ex operibus sui cognosci atque laudari voluit; omni creato sigillum quasi impressit unde mox ab alio cognosci queat, hocce constat ex figura & habitu rei; mox in oculos incurrente; nemo est qui non *Equum a Cervo*, imo *Afinum* ab *Equo* dignoscere valeat. Paucitamen Zoologici hancce, quam ipsa Natura monstrat, viam fecuti; Natura ipsa nobis clasles & genera naturalia offert, sed cum hodiernæ novæ observationes quotidie nova suppeditent, videmus nos multis carere annulis quibus magna rerum Naturalium catena cohæret; Id tamen patet, *Naturam nuncquam saltum facere*, unica enim est & simplex. Primo ope coralliorum Plantas cum mineralibus conjungit; sed earum conexio non in longum procedit, ut vulgo creditum, sed ut DONATI, HERMANNUS, aliaque sagaciora ingenia, demonstraverunt, undique radios emittit & Retis instar se ad omnem partem creati universi expandit, sic exempli graria *Quadrupediu vivos foetus lactantia per Cetas*, ad *Viviparos Pisces* accedunt, ope *Phocarum* sed eadem *Phocæ*, ad *Aves Urinatores* ope *Diomedæ & Cataractis* pergere videntur, dum ab altera parte *Gerboæ* vel *Dipodes* annulum ad structionem porrigunt; Avium numerosum agmen ope *Trochili* ad insecta transfire dixerunt Zoologi quidam; & ope *Avium Urinatorum Piscibus*. Pisces ordine tantum, non classe ab *Amphibiosis* differe docet siren *Lacertina*; a *Piscibus* vero ad *Insecta* annulo caremus, proximus enim *Pegasus* adhuc nimis distat; convenient tam corde uniloculari, unipaurito, humore frigido per vasa fluente, respiratione lateralí, ore quorundum cirroso, imo & quidam, tegmen habent osseum, ut in *Tetrodontibus* videamus, & hinc hærere magis incipit catena, an ne *Nereides vagæ scolopendris affines* haberí possunt? utrique enim *Corpus* gracile lougissimum lineare, & cirrhæ *Nereidum*, locum antennarum scolopendræ occupant, utraque corpus divisum habet in segmenta, singulo segmento, utrinque pinnato, quod si concedunt principes in arte, pergere licet a *Nereidibus* vagis ad *Tubicolas* & ab iis ut & a vagis, ad *Serpulas*, & cum *Teredo lapidaria* ad *Serpulas* perlineat, annulus ad *Tessacea* patet; ab altera parte *Nereides* vagas *Aphroditis* ita similes redidit Natura, ut Judicio opus sit ad limites statuendos.

34 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

ce ordini & *Lumbricos*, *Hirudines*, *Ascarides*, *Gordies imo* & *Tænias* adficiandos, credit clariss. PALLAS; sed haud satis molluscorum species notæ, ad ordinem rite stabiliendum. *Tænias* vero *Volvoces* & quædam alia ad *Zoophyta* accedere docuit celeb PALLAS.

Sed quamvis omnes annulos quibus magna rerum Catena coheret, haud novimus, ordines tamen & genera dari naturalia palam est; sic inter *Quadrupedia ruminantia*, *Pecora* ordinem naturalem efficiunt, sive ad partium compaginem, sive ad internam strueturam, sive ad vivendi Methodum respiciamus, idem & de *glirium ordine* constat ut & *Ferarum*, etc; genera enim hæcce ordines constituentia, sunt naturalia exempli gratia *Camelus*, *Cervus*, *Antilope*, *Capra*, *Ovis*, *Bos*. *Feras* inter *Canis*, *Hyæna*, *Felis*, *Meles*, *Viverra*, *Mustela*; hæcce genera se sequuntur, dantur & alia, quæ naturalia quidem tamen solitaria, ut *Vespertiliones*, *Equus*, *Sus*, *Elephas*, *Rhinoceros*, *Hippopotamus*; de avibus suo loco dicendum.

Paucissimi Zoologi, ductum Naturæ sequi, ausi sunt, inter præcipuos numerandi, celeb ERXLEBEN & Scopoli ille *Simias*, *Lemures*, *Didelphides* se naturaliter sequi dixit; ut & *Manis* & *Dasyrus*, *Talpa* & *Sorex*; *Hippopotamus*, *Rhinoceros*, *Elephas*, *Equus*; ut & *Bos*, *Ovis*, *Capra*, *Antilope*, *Cervus*, *Moschus*, qui ruminantium agmen efficiunt, ut & *Lepus*, *Glis*, *Cavia*, *Spalax*. *Mus*, *Jaculus*, *Sciurus* qui *Glirium* ordinem constituant; & ferarum classis naturalis ex *Viverra*, *Fele*, *Cane* constans, tandem *nantiū aquatilium* *Quadrupedium* cohors ex *Lutra*, *Castore*, *Phoca*, *Tricheco* constans, quæ ad *Cetas* sic ad *Piscium* classem pergunt.

Alter ex Zoologis Naturæ ductum sequentibus est clarissimus SCOPOLI, qui *Quadrupedum* classem, duabus Divisitionibus dispescuit, *Terrestrium* nempe & *Aquatilium*, *Terrestria* sunt, *maniformia*, *unguiculata*, *mammis* duabus vel pluribus hæcce $\alpha.$ dentibus primoribus nullis, $\beta.$ senis, benisue; *ungulata* sunt *ruminantia* vel *non ruminantia*. *Aquatilium* nulla sub divisio.

Clarissimus PALLAS pauca sed egregia, de ordinibus naturalibus, in *Miscellaneis*, & *Specielegiis Zoologicis* sparsit.

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 35

Breve itaque ordinum atque generum naturalium schema quod mihi composui ex optimis auctoribus, hic ad jungere liceat quod æqui Lectoris Judicio lubens submitto.

I. ORD. manuformes antropomorpha *Simia Lemur tardigradus*. ORDO 2) edentula *Bradypus Myrmecophaga Dasypus Manis*. ORDO 3) Feræ, *Leo Felis Hyæna Canis viverra Mustela Meles Ursus Talpa Sorex Didelphis*. ORDO 4) Glires. *Lepus Mus Dipus Sciurus*. ORDO 5) Ruminantia *Tragulus Moschus Cervus Antilope Capra Bos Ovis Camelus*. ORDO 6) Belluae *Sus Equus Tapir Rhinoceros Elephas Hippopotamus*; VII. Nantia *Lutra Castor Rosmarus Phoca*; cœ quatenus vivipare lactantes.

CLASSIS II AVES. ORDO 1. aquaticæ Urinatores *Diomedea Spheniscus Colymbus Uria Alca Rhyncops Ayocetta Anhinga Onocrotalus Pelecanus Sula Phaëton Larus Procellaria Mergus Anas*. ORDO 2) GRAILLÆ: *Platalea Phœnicopterus Charadrias Hematopus Ardea Tringa Anhima Cariama Tantalus Numenius Scopulax Rallus Fulica Parra Cancromia*. ORDO 3) Gallinæ *Otis Psophia Sagittarius Struthio Didus Pavo Meleagris Crax Numida Phasianus Tetrao Columba Urogallus*. ORDO 4) Rapaces *Strix Aquila Falco Vultur Buceros Ramphastos*. ORDO 5) PSITTACEÆ *Crotophaga Buphaga Psittacus Trogon Curvirostra Cuculus Lanus Certhia Upupa Promerops Merops*. ORDO 6) Rectirostris *Paradisea Oriolus Xanthornus Coracias Gracula Galbula Corvus Ampelis Sitta Junx Picus Alcedo Todus*. ORDO 7) Passeres. a. *Tenuirostres Muscicapa Turdus Sturnus Alauda Sylvia Motacilla Manacus*, β. *Crassirostres Tanagra Loxia Fringilla*, γ. *Colius Parus*, δ. *Brevipedes Hirundo Caprimulgus*, ε. *Rostro longo recto Trochilus*.

III. PISCES, branchiostegi *Pegasus Syngnathus Accipenser Lophius Chymæra Ostracion Diodon Tetrodon Balistes Centriscus Cyclopterus Petromyzon Raja Squalus Branchiales Lanceolatae MORMYRUS Stromateus Zeus Cyprinus*, corpore ovato lanceolato, *Pleuronectes Teuthis Chaetodon Perca Scorpaena Gasterosteus volitans Sciæna Labrus Sparus Scomber Coryphæna Trachinus*. Corpore lan-

36 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

ceolato, *Clypea*, *Salmo*, *Gymnotus*, *Gadus Elops* etc. Corpore linearis, *Cobitis*, *Silurus*, *Gobius*, *Blennius*, *Ophidium*, *Cepola*. Corpore fusiformi, α . glabro *Echeneis* etc. β . Angulato, *Trigla*, *Exocetus*, *Fistularia*, *Loicaria*; corpore; *Cylindrico Muræna*.

Ordo III. AMPHIBIA, *Cæcilia*, *Amphisbena*, *Anguis*, *Crotalus*, *Boa*, *Coluber*, *Lacerta*, *Rana*, *Testudo*.

V. INSECTA, Coleoptera *Cancer Lucanus*, *Scarabæus*, *Hister*, *Dermestes*, *Sylpha*, *Cassida*, *Necydalis*, *Coccinella*, *Chrysomela*, *Curculio*, *Cerambyx* etc. *Staphylinus*, *Forficula*. *Nepa*, *Notonecta*, *Naucoris*. HEMIPTERA *Blatta*, *Mantis*, *Gryllus*, *Cicada*, *Cimex*, *Membracis*, *Fulgora*, Lepidoptera *Papilio*. *Sphinx Sesa*, *Phalæna*. NEUROPTERA *Limbula*, *Myrmeleon*, *Panorpa*, *Ephemera Hemerobius*, *Phryganea*, *Raphidia*, *Aphis*, *Thrips*, *Chermes*, *Tenthredo*, *Cynips*, Hymenoptera, *Vespa*, *Ichneumon*, *Sphex*, *Apis*, *Nomada*, *Oestrus*, Diptera, *Tipula Musca*, *Empis*, *Hippobosca*, *Bombylius*, *Asilus*, *Conops*, *Tabanus*, *Culex*; Aptera, *Aranea*, *Phalangium*, *Scorpio*, *Podura*, *Lepeisma*, *Monoculus*, *Oniscus*, *Julus*, *Fasciola*, *Gordius*, *Ascaris*, *Sipunculus*, *Scolopendra*.

VI. MOLLUSCA. *Nereis*, *Aphrodite*, *Serpula*, *Terebellæ*, *Triton Lumbricus*, *Myxine*, *Hirudo*, *Fistularia*, *Holothuria*, *Salpa?* *Actinia*, *Lernea*, *Clio*, *Petrotrachea?* *Physsophora*, *Medusa*, *Tethys*, *Triton*, *Sepia*, *Limax*.

VII. TESTACEA univalvia *Dentalium*, *Helix*, *Haliotis*, *Patella*, *Nerita*, *Trochus*, *Turbo*, *Strombus*, *Buccinum*, *Murex*, *Cassis*, *Voluta*, *Conus*, *Bulla*, *Cyprea*, *Argonauta*, *Ammonia*, *Nautilus*, *Orthocera*; BIVALVIA *Anomia*, *Ostrea*, *Mytilus*, *Pinna*, *Pteria*, *Solen*, *Vulsella*, *Mya Tellina*, *Maëtra*, *Cardium*, *Chiama*, *Venus*, *Donax*, *Spondylus*, *Arca*. MULTVALVES *Teredo*, *Pholas*, *Chiton*, *Lepas*, *Echinus*, *Asterias*.

VIII. ZOO PHYTA α . Lithophyta *Madrepore*, *Cellepora*, *Millepora*, *Ijs*. β . Phytolitha *Gorgonia*, *Antipathes*, *Alcyonium*, *Spongia*, *Eschara*, *Cellularia*, *Tubularia*, *Sertularia*, *Pennatula*, *Brachionus*, *Polypus*, *Trichoda*, *Nais*. Sim.

Simplicia Cercaria, Bursaria, Gonium, Kolpoda, Paramecium, Cyclidium, Anguina, Vibrio, Encheleis, Vovox, monas.

Sic leviter nec mihi ipsi in omnibus præsertim, *Molluscis* & *Conchyliis* satis faciens, confeci systema habitu externo, plerumque desumptum; sæpius in eo *Scopolium* secutus, multa tamen mutavi; & cum dies diem doceat, in ceteris partibus hujus operis, poliendum, præsertim, si viri artis periti, errores, quos ei inesse, nec tamen ameliorare possum, mihi ostendere velint, errorem enim videre & tollere, idem ac veritatem invenire recte dixit BUFFONIUS.

AMPHIBIA nantia LINNÆI ad Pisces me reduxisse nemini credo infestum; Pisces *Branchiales* ad *Branchiostegos* accedunt ope *Mormyri*, cui apertura *Branchialis linearis*, & osficulo uno suffulta membrana. Porro Pisces ex habitu divisi ne in unam vel alteram partem hæret *diagnosis*. Murænam Serpentibus affinem docet *Muræna Colubrina*, cuius iconem & descriptionem Cl. PALLASSIO communicavi, qui eam publicavit in *Nordische bytrage* TOM. II. Serpentes Lacertis accedunt ope *colubris Lacertinæ* a Cl. PALLASSIO in *Comment. Petropol.* ni fallor descriptæ & *anguis Quadrupedis* a VOSMARIO depictæ. *Testudinem Cancris* a latere premere, docet tegmen osseum; vita in aquis; Id mihi tamen ipsi haud satis facere potuit, ob antennas cancrorum, dentium sive maxilarum præsentia, capite exerto, numerum *Pedum*, structura interna, *Cancros* tamen *Scarabeis* accedere docent coleoptera, numerus pedum; etc. in sequentibus hujus que classis generum enumerationibus forsitan multa mutabo; si mihi Zoologi Principes, errores benevole monstrare velint.

Ut autem in hacce scientia, ordines naturales, cognoscamus & eos rite ordinamus; in auxilium vocanda, *Musea*; *Icones* præstantiores, & Auctores, qui anatomen & animalium proportiones ritè descripferunt, nec ex uno alterove sed ex pluribus speciminibus, ejusdem speciei Judicandum; si magno LINNÆO occasio data fuisset, plura videndi, nec aliorum relationibus atque sæpe malis delineationibus nimis confidisset, immortali suo operi *Systemati Naturæ* majorem perfectionis gradum conciliasset.

Musea præcipua sunt: magnus ille Thesaurus, quo Anglia
D 3 no-

38 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

nomine *Musei Britannici*, gloriantur, in omnibus dives, dein celeb BANSKII, ASTHON Livers, Ducissæ a PORTLAND, HUNTER etc. in *Gallia Museum Regis*, curis d'AUBENTONII & BUFFONI summopere auctum; in Suecia museum Regis, summo a LINNÆO celebratum; an TESSINII comitis, Lib Baronis & de GEERII olim ditissimi adhuc supersint nescio, Museum Academicum, *Petroburgense*, curis PALLASSII demandatum, & ab eo, ceterisque illustribus viatoribus novis anteaque incognitis auctum; Museum Principis *Arauisci* quod *Hagæ comitum* servatur ditissimum & a viro illustri A. VOSMAER. ad tantum fastigium perductum, ut inter regios Thesauros locum norabilem occupet; Museum LEIDENSE variis nec ullibi facile inveniendis nisi in predicto Principis Cimelio, Superbiens. Thesaurus celeb. CAMPERI, in quo & anatomica permulta Naturalem scientiam illustrant; ut & celeb. LYONNETTHI in *Insectis conchyliisque*; Garophylacium Lib. Baronis RENGERS in Entomologicis sine pari. Gazophylacium Societatis Harlemensis, pulcerrimum, & indies acrescens; Ultrajecti museum D. Baronis RAYE DE BREUKELERWAARD, Avibus, Insectis, Zoophytis, Mineralibus stundum, ut & D. JULIAANS Pharmacopolæ Piscibus, Ampliis ceterisque in liquore contentis, Insectis, Gonchyliis ditissimum, Amstelodamum olim ditissimum Museis; adhuc dum BRANDTI conchyliis, RENSELARII, TEMMINGII, avibus, HOLTHUIZII insectis gloriatur, BURMANNI que Zoophytis etc.

Præter Musea, præstantissimæ Icones, ad studium Naturalis scientiæ maximum præbent auxilium, præsertim si ad fidem Naturæ depinguntur. Tale imprimis, opus pulcerrimum cel. SCREBERI *Zaugthiere in afbildungen nach der Natur mit Beschreibungen* 4. 1775, ubi Icones Buffonianæ, multis aliis auctæ, & accuratæ descriptæ inveniantur, avium historiam & icones, EDWARDSII *Histori of Birds*, & *gleanings* VII Vol. 4. ut & d'AUBENTONII icones coloratae ad historiam avium cl. BUFFONII pertinentes, huc & pertinent icones in *Synopsi of Birds*. cl. LATHAM cuius jam quatuor volumina prostant, ut & SEPPII *icones avium indigenarum*. Splendidum opus & quo *Fauna Belgica* vix aliquid pulchrius vidit. *Amphibia*, præter pauca qua CATESBÆUS *The natural, History of Carolina, Florida and the Bahama Islands*, dedit, iconibus coloratis, SEBÆ eni in *amphibiis* ditissimum opus, coloribus hand fidendum; Diu Pisces veris, fidisque cærebant picturis, tandem faustis avibus, hiatum

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 39

tum supplevit celeb BLOCHIUS in *OEconomische Naturgeschichte der Fischen Deutschlands* III. Vol. Berol; opus in hacce classe sine pari, & jam hunc in ex oticis desudat auctor, *Insecta* permultis gaudent iconibus coloratis, saltem ordines quidam, sic VOETIUS *Coleoptera* graphicé delineavit pinxit; SEPPUS inimitabili artificio *Lepidoptera* Belgica depingere pergit, & STOLLIUS *cicadarum* Phalangem, auxiliante eodem perito artifice, publicat adhuc; CRAMERI de Papilionibus exoticis opus splendidum, & ROSELII icones qnis non novit, *Insecta Rossiae* celeb PALLAS quorum jam duo prostant fasciculi, auctore suo, digna; & nuper celeb HERBST *Cancros* accuratis picturis, notos facere incepit. *Hemipterorum gryllorum*, & *mantidum*, multis caremus; ut & *Neuropteron*, nisi sparsas, nec semper fidas *Icones Insectorum Ratisbonensem* SCHAEFFERI excipiamus, de *Hymenopteris* & *Dipteris* idem dicendum; ut & de *Apteris* multis, *Araneas* tamen graphicē depinxit CLERCKIUS. *Mollusca* coloribus depictis caremus adhuc, præter pulcerimmos celeb LESKII *Echinos*, SLABBERI *microscopische verlustigingen*; & celeberr MULLERI *Faunam Danicam*; *historiam vermium*, hanc quamvis nondum vidi, celebre Auctoris nomen, testimonia virorum in arte Principum jubent præstantissima hac Zoolo-gica opera locum occupare primarium in hacce classe.

Conchylia e contrario haud carent picturis, atque eximiis, inter eos eminent velut inter Ignes Luna minores REGENFUSII opus, quo splendidius nihil vidit eruditus orbis, Tomus I. duodecim tabulis folio maximo, adhuc dum lucem videt, secundi tomi, editionis parium spei affulget; quamvis absolutum & ad umbilicum perductum esse audivi, sex tabulæ jam habuit celeb. MARTINI ut ex ejus Librorum Catalogo vidi; Hujus in damnum scientia nimis cito erepti, eximum opus *Systematisch Conchylien Cabinet* Iconibus pulcerimis plurimis scater. KNORRII *deliciæ selectæ* a celeb. Ph. A. MULLERO auctum, varia continet *Conchylia* pulcerima, quæ tamen locum cedere debent iis, quæ in *deliciis oculi* & *mentis* inveniuntur inter quæ præsertim eminent, quæ ex splendido suo Thesauro ad partem V. & VI. supplevit doct. HOUTTUINIUS egregia. *Zoophyta* depicta per pauca inter d'AUBENTONII icones, & KNORRII delicias selectas inveniuntur, nec alia; olim clar. PALLAS *Zoophytorum* picturas promisit (*Elench Zoophyt in præfatione*) sed tantis jam

40 CONTEMPLATIO ANIMALIUM.

obratus aliis, de iis pro sua sagacitate & ingenii acumine cogitare tempus vetare videtur.

Præter citatos auctores & alii *miscellanea* in Zoologicis dederunt, tum coloribus fucata, tum nuda sed accurata impressione conspicua. Tales primum se offerunt cl. VOSMARII *monographia variorum animalium* in Museo Principis, cui tanta cum laude præest hæ *Quadrupedia*, *Aves*, *Amphibia* sistunt, pro maxima parte accuratè depictæ atque omnes ad exemplaria in Museo descriptæ, nec sua lauda carent; quamvis in iis nimis durus BUFFONIUS; inter non depictas coloribus eminent, atque claro jubare fulgent PALLASSII, *miscellanea Zoologica & Spicilegia*, quibus nemo cui animalium historia cordi est carere potest; dein *miscellanea scrutatorum Berolinensium* (*Beschäftigungen der Naturforschende freunde*, IV. Tomi in Octavo & scripta eorundem, IV. Partes; dein opus aliud ejusdem indolis *Naturforscher dictum*, cujus jam XX Tomi prostant. Icones quas Laudatus HOUTTUINIUS in *commentariis ad systema LINNAEI* Belgice editis, optimæ, præsertim *Piscium insectorum* etc. & de in feligendis rarioribus ingenio cl. *auctoris* testantur.

Jam restat ut de BUFFONIANO opere pauca dicam, sine pari illud, nec antecedentia secula, nec quæ nostrum sequentur, facile aliud monstrare valebunt, quod ei palmam eripiat; tanta de Illustri opere Judicia. quædam forsitan adulantia, alia justo duriora, data, ut pauci medium tenuere viam; ut omnia mortalium opera, haud sine erroribus, quæ facile Tyroneum a recta cognitione, deducere possunt, præsertim cum summa & inimitabili eloquentia fucata proponuntur, nihilominus tamen veritates, atque bona, paucos errores longe vincunt & descriptiones animalium tum externe, tum anatomice viros laude totius *Europæ* dignos monstrant, quoad icones, pleræque bonæ ac fidæ, saltem *Quadrupedum* hic & inde minus bonæ obveniunt, præsertim in supplementis, ubi vir Illustris *Iconibus editionis Amstelodamensis* nimis fudit, quæ ad delineationes coloratos *capenses* factæ sunt; quæ delineationes, quamvis animalia ita monstrant ut dignosci possint, haud tamen ea ad amissim exprimunt, vidi delineatos, vidi & multa animalia secundum quæ delineatae sunt; Avium icones, (loquor de iis quæ in opere inveniuntur), magnitudine & crassitie rostrorum pedumque ple-

CONTEMPLATIO ANIMALIUM. 41

plerumque peccant; sed id coloratis figuris ad quas appellat cl. auctor restauratur, quid quid non coloratae habent erroris.

Multa adhuc alia de Iconismis dicere possem, fed ea tantum citavi, quae vidi & possideo.

Haud satis tamen omnia novisse animalia, (quod & impossibile credo,) sed & in usum eorum œconomicum, diæticum, medicum, inquirere debemus quod si quis tentat & animum ad ea vertit, forsan multa quæ adhuc latent in exoticis & nostratibus speciebus inveniet; & inde noua summi NUMINIS sapientiae vestigia & ejus in generus humaanum amoris signa videbit.

G E N E R A
QUADRUPEDIUM.

I. T E R R E S T R I A.

A. U N G U I C U L A T A.

A. *Quadrumania.*

I. SIMIA.

CAPUT : facies calva , trigona rostro produc-
to , nasus haud prominens. *Dentes* IV
utrimque.

CORPUS pilosum , versus inferiora tenuius
mammæ pectorales II versus axillas po-
sitæ.

PEDES manuiformes.

α. SIMIÆ proprie dicta *cauda nulla.*

β. PAPIO cauda abbreviata , *buccæ fac-*
catæ.

γ. CERCOPITHECUS cauda longa, non pre-
hensilis ; nates callosæ.

δ. CEBUS cauda longa prehensilis ; nates
pilosæ.

ε. CALLITRIX cauda longa non prehen-
silis ; nates tectæ , facci in buccis
nulli.

II. PRO-

II. PROSIMIA (*Lemur LINN.*)

CAPUT : *rostrum* elongatum ; *vulpinum*, *aures* penduli. *Dentes superiores IV.* intermediis remotis inferiores **VI.** longiores compressi approximati.

Laniarii solitarii.

Molares sublobati antici longiores.

CORPUS pilosum, *Mammæ* quatuor pectorales ; *cauda* longa, pilosa.

PEDES : femora posteriora longiora, *plantæ* manuformes.

*III. TARDIGRADUS (LEMUR LINN. PROSIMIA BRISS.)

CAPUT rotundum, *oculi magni*, rotundi, approximati.

Rostrum subacutum.

Auriculæ rotundæ.

CORPUS macrum, pilis mollioribus, *cauda* nulla.

PEDES crura posteriora longiora, subnuda ; Ungues rotundi, digitæ indicis acuti incurvi.

B. *Unguiculati unguibus longis.*

IV. BRADYPUS.

CAPUT rotundum, *rostrum* productum, nudum. *Dentes primores nulli.*

CORPUS pilosissimum, longum, *cauda* nulla.

PEDES crura femoraque brevia, crassa.

Palmæ Plantæque 2 vel 3 validissimis unguibus, longis incurvis.

44 GENERA QUADRUPEDUM.

V. VESPERTILIO.

CAPUT rotundum, *rostrum* productum; *nasus* varius in variis.

Auriculæ magnæ, aliquibus duplicatæ, intus striatæ.

Dentes varii in variis.

Brachia longa, palmarum digitis, (excepto pollice) radiatim in membranam volitantem expansis.

CORPUS pilosum.

Cauda brevis, teres.

VI. DASYPUS.

CAPUT: aures acutæ. *Rostrum* productum.

Dentes Incisores nulli, molares 8.

CORPUS testa ossa Zonis interstincta tectum.

Pedes subtus villosi.

Habitant in cuniculis formicis infensi.

VII. MANIS (PHOLIDOTUS BRISSONII.)

CAPUT: *Rostrum* acutum, *Lingua* extensilis, *os* angustum.

CORPUS Squamis magnis tectum; *cauda* longa.

Pedes breves, *ungues* validi.

Vlctitant formicis.

VIII. MYRMECOPHAGA.

CAPUT: *Rostrum* longum, teres; *Dentes* nulli. *Oculi* parvi.

CORPUS pilis duriusculis (in plurimis) *cauda* longa.

GENERALA QUADRUPEDUM. 45

Pedes unguibus incurvis, validi; vicitant formicis.

II. FERÆ.

IX. DIDELPHIS.

CAPUT: *Rostrum productum. Lingua ciliata. Dentes primores X. supra VIII. infra Molares VII. antici troni.*

CORPUS pilosum; *Mammæ abdominales; plurimis longa, Cauda seminuda.*

Pedes breves, digitis V. Plantarum pollex remotus.

X. URSUS.

CAPUT subconicum, *Oculi parvi, membra na nictitans. Aures breves. Dentes primores VI.*

CORPUS pilosissimum. *Cauda brevis.*

Pedes pentadactyli, talis incedentes.

*MELES (URSUS LINN.)

CAPUT *Rostrum elongatum. Dentes primores VI. fascia oculari, quibusdam.*

CORPUS longum pilosum. *Cauda longiuscula.*

Pedes talis innixi.

XII. VIVERRA.

CAPUT rotundum, *Rostrum porrectum. Dentes incisores inferiores VI. molares sex; Lingua aculeata.*

CORPUS gracile, *flexile; cauda longa; folliculus putorius plerisque Mephitin olens.*

Pedes breves pentadactyli.

46 GENERA QUADRUPEDUM.

XIII. MUSTELA.

CAPUT viverræ, sed *aures* breviores *Lingua* læviuscula.

CORPUS gracile, vellus laxum tenerius, cauda viverris brevior.

XIV. FELIS.

CAPUT rotundum, *Aures* breves, os vibrissatum, *Lingua* retrorsum scabra.

CORPUS longum, plerisque maculatum, cauda longa.

Pedes digitii antici IV. postici V.

XV. HYÆNA.

CAPUT rotundum, *Aures* rotundæ, *Rostrum* porrectum obtusum.

CORPUS collum & dorsum jubatum; cauda longiuscula, folliculus supra anum.

Pedes longi tetradyctyli.

XVI. CANIS.

CAPUT oblongum; *rostrum* porrectum; acutiusculum, vel obtusum. *Dentes* primores lobati. *Laniarii* majores.

CORPUS pilosum, aliis torosum, aliis macre; cauda varia, plerumque longa.

Pedes digitati, digitis anticis V. posticis IV.

III. GLIRES.

XVII. LEPUS.

CAPUT rotundum, auriculæ acutæ, labium fissum. *Dentes* incisores II.

CORPUS longum. pilosum; cauda brevis, vel nulla.

Pe-

GENERALA QUADRUPEDUM. 47

Pedes breves, digiti antici V. postice IV.

XVIII. CAVIA (Mus LINN.)

CAPUT rotundum; *Aures parvæ rotundæ.*

Rostrum productum mystaces ad os.

CORPUS obesum, longiusculum; *Cauda vel nulla vel brevis.*

Pedes digitis anticis IV. posticis III.

XIX, MUS.

CAPUT varium in variis. *Dentes primores utrinque II. molares III.*

CORPUS subventricosum, *cauda horizontalis, varia in variis.*

Pedes anteriores digitis IV unguicula pollicari posticis V.

a. *Soporosi.*

b. *Subterranei.*

c. *Cunicularii.*

d. *Buccati.*

e. *Lethargici.*

f. *Myosuri.*

XX. DIPUS (Mus LINN. PALLAS.)

CAPUT breve, *oculi magni, rostrum obtusum; Vibrisæ longæ Aures rotundæ. Dentes incisores II..*

CORPUS subobesum, cauda longa vestita, apice floccosa.

Pedes, antici brevissimi, crassi, pilosi, postici prælongi, nudi, solisque iis incedunt.

48 GENERA QUADRUPEDUM.

XXI. SCIURUS.

CAPUT *Rostrum* porrectum; *Dentes* primores II. *Oculi magni*, vividi, *Aures acuminatæ penicillatæ*.

CORPUS Murinum, *cauda* longa pilosissima, compressa vel depressa (excepto *Taguan*, cui *Cylindrica*.)

Pedes antici, *digiti V. postici IV.* subtus callosi ungues validi.

XXII. MYOXUS. (SCIURUS, MUS LINN.)

CAPUT: *Aures nudæ*, rotundæ, *oculi* protuberantes. *Dentes* primores II.

CORPUS *sciuri* cauda longa, teres pilosa. *Pedes breves*, palmarum *digiti IV. plantarum V.*

XXIII. SOREX.

CAPUT: *Rostrum elongatum*, gracile, rectum, acutum. *Dentes incisores supra II. infra IV. parvi*.

CORPUS obesum *cauda varia*.

Pedes digitis V.

XXIV. TALPA.

CAPUT rotundum, *auriculæ brevissimæ*, vel nullæ; *oculi minutissimi*, *rostrum porrectum*.

CORPUS obesum, fere Cylindricum, *cauda, varia*.

Pedes breves; antici fossorii lateraliter extensi.

XXV. HYSTRIX.

CAPUT: rotundum, lateribus subcompresso; Aures rotundæ. *Rostrum* breve; Labium superius fissum; Dentes incisorum II.

CORPUS spinis longis, duris tectum. Pedes breves, pentadactyli.

XXVI. ERINACEUS.

CAPUT: *Rostrum* productum, subsuillum. CORPUS Hystrice longius, spinis brevioribus, flexilioribus tectum, cauda brevis.

Pedes breves pentadactyli.

IV. RUMINANTIA.

XXVII. TRAGULUS (Moschus LINN.)

CAPUT: ecorne, Cervinum, Aures magnæ, latæ. Dentes primores superiores nulli; inferiores VIII. *Laniarii* exserti.

Pedes longi, bisulcati.

XXVIII. CAMELOPARDALIS.

CAPUT: *cornua* solida, obtusa, erecta, pilosa, penicillata. Dentes primores superiores nulli, inferiores VIII. spathulati. Collum longum, jubatum.

CORPUS dorso oblique descendente. Cauda longiuscula apice crinita.

XXIX. CERVUS.

CAPUT: *cornua*, solida, ramosa, annuita tenui corio hirta apice nuda crescentia.

D

Ocu-

Oculi magni; sinus lacrymales; Aures latæ collum longum, subcompressum.
CORPUS cylindricum; cauda brevis.
Pedes bisulci.

XXX. ANTILOPE.

CAPUT: cervinum, *cornua simplicia, erecta, annulata, nec decidua; nulli sinus lacrymales.*
CORPUS cervi.
Pedes: scopi ad genua anteriora; bisulci.

XXXI. HIRCUS (CAPRA LINN.)

CAPUT: oblongum, *cornua compressa, carinata, sursum versa, scabra, Mentum arunco barbatum.*
CORPUS pilosum; cauda brevis.
Pedes, crassiuscnli bisulci.

XXXII. OVIS.

CAPUT: *cornua concava intorta, rugosa, Aures penduli; frons nuda, glabra.*
CORPUS lanatum cauda longiuscula.
Pedes teretes, bisulci.

XXXIII. BOS.

CAPUT: *cornua concava, lævia, lunata frons pilosa; rostrum obtusum & quasi truncatum.*
CORPUS torosum; cauda longiuscula, apice fetosa.
Pedes torosi, crassi, bisulci.

XXXIV.

XXXIV. CAMELUS.

CAPUT: longum, *Labium superius propendens*. *Aures breves; cornua nulla.*

CORPUS: collum teres; *Dorsum vel pectus tophosum, lanatum, cauda brevis.*

Pedes, crura callosa, longa, *Pedes didactyli, ungulati.*

UNGULATA non ruminantia.

XXXV. SUS.

CAPUT: *Rostrum productum, conicum, truncatum, mobile; Aures penduli; Oculi parvi.*

CORPUS: collum fere nullum, corpus pilosum, *dorsum fetosum; cauda longiuscula vel nulla.*

Pedes breves.

XXXVI. EQUUS.

CAPUT: propendens, longum, *collum jubatum, latum, compressum.*

CORPUS subcylindricum, dorso subconcavo, cauda crinita.

Pedes monunguli.

XXXVII. HYDROCHÆRUS.

CAPUT: *auriculis erectis, majusculis, Oculi parvi. Nasus propendens proboscidis instar, extensilis. Maxillæ apice acuminatæ.*

CORPUS: *collum, breve, equinum fere, arcuatum, cauda nuda, brevissima.*

Pedes ungulæ anticae quatuor, posticæ tres.

52 GENERA QUADRUPEDUM.

XXXVIII. RHINOCEROS.

CAPUT: oblongum, *nasus cornutus*, *labium superius propendens*, mobile.

CORPUS: cute durissima, plicata testem, *cauda brevis apice pilosa*.

Pedes quadriungulati.

XXXIX. ELEPHAS.

CAPUT: magnum, *Aures magnæ, quadratae; Nasus proboscis elongatus mobilis, valvula claudendus. Dentes Laniarii superiores exserti, curvi, acuti, conici.*

CORPUS: lœve plicatum, maximum obesum. *Cauda longiuscula, apice crinita.*

II. AQUATILA.

A. UNGULATA.

XL. HIPPOPOTHAMUS.

CAPUT: grande; *Aures parvæ, rotundæ Oculi parvi. Dentes incisores IV. in utraque maxilla. Laniarii inferiores exserti magni, oblique truncati. Labia crassa, tumida, pilorum fasciculis obsita.*

CORPUS: crassum, obesum, cauda apice pilosa.

Pedes quadrifulci.

XLI. CASTOR.

CAPUT: subrotundum, auriculæ parvæ, rotundæ. *Dentes incisores II.*

CORPUS: obesum, longum, *cauda*, depresso, lata ovalis; vel compressa, longa.

GENERALA QUADRUPEDUM. 53

Pedes antici fissi, postici palmati; digiti V.

XLII. LUTRA.

CAPUT: rotundum, *oculi* magni. *Aures* rotundæ, parvæ. *Dentes* ut in *Mustelis*.

CORPUS longum; *cauda* pilosa.

Pedes digitis V. palmatis, *crura* crassa, brevia.

XLIII. ROSMARUS.

CAPUT: auriculæ nullæ; *Labium* superiorius setosum. *Laniarii* superiores exserti.

CORPUS longum, teres, *cutis* rugosa; *cauda* brevis.

Pedes *crura* brevia, *pedes* postici lati, retrorsum directi.

XLIV. PHOCA.

CAPUT: rotundum; *os* vibrissatum. *Dentes* tecti; auriculæ quibusdam.

CORPUS posticé gracilescens, *cauda* brevis.


Pedes antici pentadactyli; breves incurvi, mutici, Pinnæformes; postici distincti, longi, retrorsum versi, horizontales.

XLV. MANATI (TRICHECHUS LINN.)

CAPUT: auriculæ nullæ. *Dentes* *Laniarii* tecti; *Labia* tumida; *collum* breve, capite crassius.

CORPUS nudum, antice obesum, posticē
gracile.

Pedes antici Pinnæformes, postici, con-
nati in *caudam* horizontalem.



S P E C I E S

QUADRUPEDIUM.

I. ANIMALIA TERRESTRIA.

A. QUADRUMANIA.

I. SIMIA CAPUT trigonum, Oculi rotundi.
Nasus depresso Labia proprié nulla.
CORPUS pilosum; ad ilia tenuius.
Artus: suræ nullæ, Pedes manus.

α. Ecaudatæ. SIMIÆ facie plana.

*Satyrus. 1. S. lacertorum pilis reverfis. LINN. Syſt. XII.
p. 34.
Ourang Outang VOSM. monogr. CAMPER Verhand.
Habitat in in Jaya, Borneo.
α. The man of the wood EDWARDS Glean.
tab. 213.
β. Jocko & Pongo. BUFF. hift. nat. XIV.
tab. I. (mediocris).

Lar 2. S. manibus longissimis, ad malleolos usque extenfis.
LINN. mantiff. Gibbon BUFF. XIV. tab. 2. 3.
angl. longarmed Ape.
α. Niger barba alba. MILLER illuſtr. tab. 27.
Habitat in Coromandel.

Sylvanus. 3. S. ecaudata, natibus calvis, capite subrotundo,
LINN. Syſt. XII. p. 34. 2. Pitheque BUFF.
D 4 XIV.

xiv. p. 84. anglicé *Pigmy Ape.* SCHREB.
Saugth. i. tab. 4. fig. bona.
 Habitat in *India & Africa.* Gregaria.

Inuus 4. S. ecaudata natibus calvis, rostro producto griseo;
 alba. LINN. syst. XII. p. 35. *le Magot* BUFF. XIV.
 tab. 7. 8. (figura mediocris) Angl. *the Barbary
 Ape.*

Habitat in *Arabia, India, Malabar.*
 Ferox, mala.

† Maderogaster. 5. S. ecaudata, caninis superioribus exser-
 tis, pectore abdomineque calvis. ZIM-
 MERMAN *Zool. geogr.* II. p. 176. (edit.
 germ.) Angl. *Tufted Ape* PENNANT quadr.
 p. 174. tab. 16. 2.* *Singe à toupette.*
 Habitat in *Africa.*

β. Brevicaudæ. PAPIONES.

* Sphinx. 6. P. Semicaudata, ore vibrissato, unguibus acu-
 minatis, natibus calvis. LINN. syst. XII. p. 35. n.
 5. *Babouin* BUFF. XIV. tab. 13. 14. (fig. bona)
 SCHREB. *Zaugth.* I. tab. 6. Angl. *great
 Baboon.* PENN.
 Habitat in *Africa*, Animal forte, salax, ferox.

* Maimon. 7. P. facie violacea, rubro striata, unguibus
 acuminatis, natibus purpureis. LINN. p. 35.
 n. 7. *Mandrill* BUFF. XIV. tab. 16. mas 17.
 femina. Schreber *Zaugth.* I. tab. 7. Angl.
the ribbed noosed Baboon. PENN.

Habitat in *Guinea*, ad caput. bon. sp.
 Salax docilis.

Bipedalem dicunt BUFFON, ZIMMERMAN. tetra-
 pedalem vidi.

(*) o. P. Mormon. ALSTROMERRII *Schwed.*
Abhand. tab. 3. SCHREBER tab. 8, Solum
 mo-

(*) Fide cl. ZIMMERMANNI & PENNANTII, horridam hanc spe-
 ciem citavi, cum clariss. Schrebero eam pro difformi *Maimons*
 facile crederem, judicent autoptæ.

modo præcedenti differt topho verticis piloso; nafoque rubro, male cl. PENNANT eam ad *Papionem* retulit.

† Ethiops. 8. P. facie corporeque nigris ZIMMERM. Geogr. Zool. II. p. 180. n. 71. *Babouin noir*. Angl. *wood Baboon* PENNANT hist. of quadr. p. 176. tab. 10. fig. bona.

Habitat in *Guinea*.

Nemestrina. 9. P. subbarbatus, griseus, iridibus brunneis, natibus calvis. LINN. p. 35. n. 4. *Maimon* BUFFON XIV. tab. 19. *Pigtailed Monkey*. EDW. glean. I. tab. 214.

Habitat in *Sumatra*, *Japonia*, mitis, docilis.

Apedia. 10. P. palmarum pollice approximato, unguibus oblongis, pollicum rotundatis, natibus tectis. LINN. p. 35. 5. *Amænitat Acad.* I. p. 558. *Babouin a courte queue*. Angl. *the little Baboon*. PENNANT.

Habitat — —

Nullibi depectus.

γ. *Cercopithecus cauda longa facci in buccis*.

Hamadryas 11. C. cinereus, auribus comosis, unguibus acutis, natibus calvis. LINN. syst. 12. p. 36. 8. *Babouin gris*. Angl. *the dog faced Monkey*. PENN. SCHREB. Zaugh. I. tab. 10. ex delineatione inedita EDWARDSII.

Habitat ad *Caput bon.* sp. *ferox*, *salax*, docilis.

α. *Ursinus*, totus fuscus. PENN. hist. of quadr. p. 181. n. 86. β.

† Senex 12. C. barbatus totus albus, *Erxleb.* p. 24. 3. SCHREBER Zaugh. tab. 10. A. *Cercopitheque blanc*. — *the white Baboon*.

Habitat in *Zeilonia*, *Asia*,

An πιδηκος εν πρωτοισ τοις ιδικοις ÆLIAN. XVI. c. 10. Simiae candentes toto corpore PLINII VI. c. 21?

* Vetus. 13. C. niger barba alba. LINN. 12. p. 36.

Ouanderou. BUFF. XIV. tab. 18. (figura bona.)
Angl. the Lion tailed Monkey. PENNANT *hist. of quadr.* p. 138. n. 88. tab. 22. fig. 1. minus bona figura.

Habitat in *Ceilon & Coromandel.*

Huc & pertinet *Silenus* LINN. p. 36. totus niger.
Caudam Vetuli longam credo; quamvis *Buffonius* brevem depinxerit, nihil minus talem vidi olim in Museo D. KLOKNER, qui (ni fallor) nunc in Mnseo Societatis *Harlemonis.*

Πίθηκος εν Ινδίαις AELIAN. XVII. 39. an ille.

Veter. 14. C. barbatus albus, barba nigra. LINN. *syst.* 12. p. 36. n. 9. *Lowando* BUFF. XIV. p. 169. SCHREB. *Zaugth.*

Habitat in *Ceilona.*

Varietatem modo credo praecedentis.

*† *Cepha-* 13. C. niger barba alba triangulari, canda longi-
lopterus. ore. ZIMMERM. *Zool. Geogr.* 11. p. 185. n. 84. Angl. *purple faced Monkey.* PENN. *quadr.* p. 184. n. 39. tab. 21. 2. *Cercopitheque à face pourprée.*

Habitat in *Ceilon.*

* *Faunus.* 16. C. caudatus barbatus supra niger, infra albus cauda floccosa. LINN. *syst.* 12. p. 36. II. *Malbrouc.* BUFF. XIV. tab. 29? SCHREB. *Zargth.* 1. tab. 12.

Habitat in *Bengala.*

An hic vel sequens sit *Malbrouc* BUFFONII cum cl. ZIMMERMANNO dubius hæreo.

* *Cynamol.* 17. C. imberbis, naribus bifidis elatis, cauda arcuata, natibus calvis. LINN. *syst.* 12. p. 38. *Macaque* BUFFON XIV. tab. 20. SCHREB. *Zaugth.* p. 91. tab. 13. Angl. *Hare lipped Monkey.*

Habitat in *Guinea, Angola;* Oryzæ fur, Nigritis edulis.

Diana. 18. C. barbatus, fronte barbaque fastigiata LINN. p. 26. 8. Schwed. *Abhand.* XVI. tab. 6. (figura m2-

mala. Exquima BUFFONII? *Spotted Monkey.*
PENNANT *quadr.*

†* *Mona.* 19. *C. barbatus*, supra rufus fuscus; cauda grisea, natibus macula utrinque alba. ZIMMERMAN *Zoogr.* p. 181. n. 88. *le Mone* BUFF. XIV. tab. 36. SCHREB. *Zaugth.* tab. 15. *varied Monkey* PENNANT *hist. quadr.*
Habitat in *Barbaria, Ethiopia, mitis.*

* *Sabea.* 20. *C. imberbis*, flavicans, facie atra, cauda cinerea, natibus calvis. LINN. p. 38. n. 18. *callitricha* BUFF. XIV. tab. 36. Angl. *St. Jago Ape* EDW. *glean.* 215.
Habitat ad *Cabo Verde, Senegal, Gregarius.*

† *Patas.* 21. *C. barbatus*, supra ruber, subtus eanus. ERXLEB. pag. 34. *Patas a bandeau noir.* BUFF. XIV. tab. 25. I. tab. 16. *Red Monkey.* PENN. p. 193.
Habitat in *Senegal.*

† *Flavus.* 22. *C. buccis barbatis*, facie, auribusque atris, supra cinereo flavus, subtus flavus. *Gellowith Monkey.* PENN. *quadr.* p. 188. n. 94. *Singe Jaune.*
Habitat in *Guinea.*

† *Talapoin.* 23. *C. buccis barbatis*, pedibus nigris, cauda supra olivacea, subtus cinerea *Erxleb. syst.* p. 36. *Talapoin.* BUFF. XIV. tab. 40. Schreb. *Zaugth.* tab. 18. *Talapoin.* PENNANT.
Habitat in *India Orieniali.*

* *Cephus.* 24. *C. buccis barbatis*, vertice flavescente, labio superiore niveo, pedibus nigris, cauda apice ferruginea. LINN. 12. p. 39. 19. *Monstac* BUFE. XIV. 39. Schreb. *Zaugt.* tab. 19. Angl. *Monstache Monkey.* Penn. *quadr.* p. 190. n. 97.
Habitat in *America.*

Nictitans. 25. *C. imberbis niger*, punctis pallidis, naso albo, pollice palmarum brevissimo. LINN. 12. p. 40. n. 23. *Cercopitheque amical.* *the winking Monkey.* PENNANT *quadr.*

Habitat in *Guinea*. Capite nictitat, junior ludibundus, magis adultus ferox.

* † *Petaurista*. 26. *C. barbatus* facie nigra nasi apice, macula alba, auriculis nudis. *Blanc nez Allamand ad BUFF.* xiv. tab. 39. *the withe noosed Monkey.*
Habitat in *Guinea*.

* *Aethiops*. 27. *C. imberbis* vertice piloso pilis arrectis, lunula que frontali albis. LINN. *syst.* 10. p. 28. *Mangabey BUFF.* xiv. tab. 32. 33. Schreb. *Zaugth.* tab. 20. 21. Angl. *white eyelid Monkey.* PENNANT, *quadr.* p. 189. 95. β.
Habitat in *Ethiopia*. *Madagascar*, mitis.

Aigula. 28. *C. subimberbis*, griseus, eminentia verticis pilosa, reversa, longitudinali. LINN. *syst.* 12. p. 39. *Aigrette BUFF.* xiv. tab. 22. *Egret Monkey,* Penn. p. 193. 101.
Habitat in *India*, Gregorius.

† *Maura*. 29. *C. totus ater*. *Erxleb.* p. 41. Schreb. *Zaugth.* tab. 22. B. *Cercopitheque noir.* Angl. *Negro Monkey.* Penn. p. 191. 100. Angl. *blak Monkey*, EDW. *glean.* rab. 311.
Habitat in *Guinea*, *Ceilon*.

* *Sinicus*. 30. *C. imberbis*, capillito horisontali plano. *Erxleb.* p. 41. n. 20. LINN. *mant II.* p. 521. *Bonnet Chinois BUFF.* xiv. 30. Schreb. *Zaugth.* tab. 23. *figura BUFFONII mediocris. Chinese Monkey.* Penn. *quadr.* p. 193. n. 104.
Habitat in *Bengala*, *Ceilon*.

† * *Rolo-way*. 31. *C. barbatus*, barba bifida, corpore nigro fusco, way. subtus albo. *Allamand ad BUFF.* tom. xv. tab. 13. *figura mala.* Schreb. *Zaugth.* 1. tab. 25. mala. *Roloway.* Penn. *quadr.* p. 185.
Habitat. — —

Nemæus. 32. *C. mento buccisque barbatis*, natibus pilosis, cauda alba. LINN. *mant.* 11. p. 521. *Douc.* BUFF. xiv. tab. 41. Schreb. *Zaugth.* 1. tab.

24. *Cochinchina Monkey.* Pennant quadr. p. 196.
n. 107.
Habitat in *Madagascar.*

† *Mulatta.* 33. *C. fuscoluteus caninus:* inferioribus magnis ZIMMER. Zool. geogr. 11. 195. *le Mulatte Tawny Monkey* Pennant quadr. n. 108. tab. 22. 2.
Habitat in *India.* terox.

♂. *CEBUS Cauda longa prehensili.*

Beelzebul. 34. *C. barbatus niger,* cauda extremo, pedibusque brunneis. LINN. 12. p. 37. *Sapajou Quarine* BUFF. XV. 6. *Preaching Monkey.* Pennant quadr.
Habitat in *terra firma, Guajana, Brasilia gregaria.*

Seniculus 35. *Cebus cauda prehensili, barbatus rufus* LINN.
syft. 12. p. 37. 13. *Alouatte (Sapajou)* BUFF.
XV. 7. *Royal Preacher Monkey.* Pennant quadr.
p. 200. n. 114. α.
Habitat in *America australi gregaria* uti Alonattte,
magnus, quem edit clamor ex mira Laryngis fa-
brica & peculiari ossiculo, concavo. Vid *Camper*
Natuurk. Verhand. I.
Varietatem præcedentis credunt aliqui Zoologorum.

* *Paniscus.* 36. *C. imberbis,* ater palmis tetradactylis cauda
prehensili. LINN. 12. p. 37. n. 14. *Coaita* BUFF.
XV. tab. 1. Schreb. Zaugh. I. tab. 26. Bosch-
duivel VOSM. mononr. (figura mediocris.)
Habitat in *America australi* ubi Quoata audit.

† *Polyco-* 37. *C. cauda prehensili, dense comatus, coma*
mos. flavescente, corpore fuscō, cauda alba; Palmis
tetradactylis. ZIMMER. Geogr. Zool. p. 202. n.
105. *Sapajou coffé.* Angl. *Full bottom Monkey*
Pennant quadr. p. 197. n. 110. tab. 24.
Habitat in *Sierra Leone, Guinea.* Pellis magni
pretii apud Nigritas.

* *Capucinus.* 38. *C. cauda prehensili, imberbis fuscus, pileo ar-*
tubusque attris. LINN. 12. p. 42. n. 30. *le*
Saz

Sai BUFF. xv. tab. 8. Schreb. Zaughth. tab. 29. Fluitaap Vosm. monogr. (fig. optima.) *Weepper Monkey. Penn.*

Habitat in *Guajania Brasilia*, moschum redolet.

* *Apella*. 39. C. imberbis; cauda prehensili, corpore fusco, pedibus nigris. LINN. 12. p. 42. n. 29. *Mus Adolph. Fred. tab. 1. Schreber Zaughth. tab. 28. Sapajou Sajou. BUFF. xv. tab. 4. Capucin Monkey. Pennant. p. 201. n. 117.*

Habitat in *America australi*.

Nimis affinis præcedenti.

Trepidus. 40. C. cauda prehensili villosa, capillitio arrecto, manibus pedibusque cœruleis LINN. 12. p. 39. n. 20. *Sapajou trembleur. Bushtailed. Monkey. EDW. glean. 312.*

Habitat in *America australi*.

Fatuellus. 41. C. imberbis, cauda prehensili capitis fasciculis pilorum duobus erectis. LINN. 12. p. 42. n. 28. *Sapajou cornu. Angl. the horned Monkey. Penn. quadr. p. 206. n. 120.*

Habitat in *America*.

* *Sciureus*. 42. C. imberbis, flavo fuscus, cauda prehensili, ore cœrulecente, pedibus ferrugineis. LINN. 12. p. 43. n. 31. *Saiumiri BUFF. xv. tab. 10. Schreb. Zaughth. tab. 30. Orange Monkey. Pennant. quadr. p. 205. n. 119.*

Habitat in *America*. Moschum redolet.

† *Quadri-* 43. cauda prehensili, imberbis, facie, cruribus ex-color. tatus tatis, dorso ex aurantio nigroque mixtus, abdome albo, cauda cinerea. — *Sapajou a quatre couleurs. Antigua Monkey. Pennant quadr. 266. 109.*

Habitat in *Antigua*, mitis ludibundus.

† *Lugubris*. 44. C. imberbis niger facie ferruginea. *Erxleb. syst. p. 53. 9.*

Habitat — —

ε. *Callitrichæ* cauda longa, non prehensili, buccis nullis.

* Pi-

* *Pithecia*. 45. *C. subimberbis*, vellere nigro, cauda nigra villosissima. LINN. 12. p. 40. 22. *Saki* BUFF. xv. 17. Schreb. Zaugth. 1. tab. 32. *Fox tailed Monkey*. Penn. quadr. p. 207. n. 122.

Habitat in *Gujana*.

* *Jacchus*. 46. *C. auribus villosis*, patulis, cauda hirsutissima cinerea nigro annulata. LINN. 12. 40. 24. (*Sagoin*) *Ousiti* BUFF. xv. tab. 14. *Striped Monkey*. Penn. quadr. p. 209. n. 124.

Habitat in *Brasilia*.

* *OEdipus*. 47. *C. imberbis*, capillo dependente, cauda rubra. LINN. 12. p. 41. n. 25. *le Pinche*. BUFF. xv. 17. Angl. *the red tailed Monkey*. Penn.

Habitat in *Brasilia*.

* *Rosalia*. 48. *C. capite piloso*, faciei circumferentia, pedibus qrubris, LINN. 12. p. 41. n. 26. *Marikina*. BUFF. xv. tab. 16. *Silky Monkey*. Penn. quadr. p. 210. n. 125. tab. 25. (optime) Schreb. tab. 35.

Habitat in *Brasilia*.

Argentata. 49. *C. argentata*, facie rubra, caudu castanea; corpore argentato albo. LINN. mantios 11. p. 521. *Mico* BUFF. xv. tab. 18. *Fair Monkey*. Penn. quadr. p. 211. n. 127. Schreb. tab. 36.

Habitat in *Brasilia* & ad flumen Amazonum.

* *Midas*. 50. *C. labio superiore fiso*, nigra, pedibus croceis. LINN. 12. p. 42. *Tamarin* BUFF. xv. tab. 13. Angl. *Little black Monkey*. EDW. birds iv. tab. 196. *great eared Monkey*. Penn. quadr. 208. 123.

Habitat in *America australi*.

O B S E R V A T I O N E S.

- I. Hæ sunt Simiæ notæ, atque descriptæ a Zoologis, & tantum non omnes depictæ; sunt tamen & quædam minus cognitæ, dubiæque. Sic inter Simias. Recenset cl. ZIMMERMANNUS.

Si-

*Simiam troglodytem, macrocephalam, torosam, dorso humeris pilosis, reliquo corpore glabro. BLUMENB. handb. illa mihi videtur *Satyri* LINN. varietas, ex iconē *Tulpii* cognita.*

2. Ex speciminibus a me visis, cumque iconibus collatis tres varietates *Satyri* citavi.
 3. Inter dubias Simias & cum ZIMMERMANNO refiero.
 - a. *Papionem minorem.* Petit Papion. BUFF. xiv. tab. 14. quem Papionem nondum adultam esse credo.
 - b. *Papionem novum the new Baboon* PENNATII tab. 23.
 - c. *Papionem maximam ex Benin,* quam descriptis celeb *Allamand* ad BUFF. xv. p. 74. nihil nisi varietas *Papionis Maimon*, morbo, vel incuria pectore ferè calvo.
 - d. *Papionem.* Boggo, haud satis descriptam.
 - e. *Papionem Porcariam,* quam ex picturis Sloaneis dedit, *Pennantus*, si icon ad naturam, foret *χοιροπίτης* Aristoteles.
 - f. *Papionem trétrétrétré ex Magadascar.* a Flacourto obiter descriptam.
 - g. *Cercopithecum hircinam,* ex picturis descriptis Pennant p. nomine *goat Monkey*, si cauda brevis, foret *Maimon*.
 - h. *Cercopithecum,* horridum, quem obiter descriptis comes de Forbin (mem. p. 219.)
 - i. *Syrichtam,* ex mala icone *Petiverii* a Zoologis citatam.
 4. Recte annotavit cl. BUFFONIUS, quo magis facies Simiarum, ab humana recedat, eo ferociores, salaciiores evadant, patet hoc in *Satyro*, *Lare*, & *Callitrichis* ut quæ mites, dociles, ludibundæ.
 5. Si ad internam structuram Simiarum oculum vertamus, videmus, præter ea, quæ tam graphice descriptis DAUBENTONUS, in multis fuccos aëros, sat magnos ad Laryngem, quos primus detexit, descriptisque celeb. CAMPER (Natuurk. Verhand. Tom. I.)
- In *Allouatte*, seniculus LINN, (v. 36.) Belzebul (35) officulum, concavum, galeæ instar, ad Laryngem, unde vox illa sonora ex longinquó audienda. (Vide CAMPER. l. c.)
6. Omnes Simiae Phytivoræ, quamvis & dentur, qui araneis aliisque Infectis vescuntur, oryzæ, fructuumque fures, inde in perniciem hortorum Indicorum natæ, qui-

quibus incredibile damnum inferunt, quædārum Nigritis esca deliciosa, nec male sapere reserunt Itinera-tores.

7. Clima Europæ ferre vix pares; &rarissime hic patiunt; id tamen in Jaccho felici cum successu efficere tentavit Marchio de Nielles.

II. PROSIMIA (LEMUR LINN.) CAPUT: rostrum acutum porrectum Vulpis. Aures penduli.

CORPUS macre longum, pilis lanosis tectum posteriores longiores, cauda longa.

Pedes: Manus in plantis, palmisque.

* Mongoz. 1. *Prof.* caudata grisea; cauda unicolor pilosa, LINN. 12. p. 44. n. 2. Mongous BUFF. XIII. tab. 26. the Mongous EDW. glean. 1. tab. 216. the woolly Maucauco. PENN. quadr. p. 213. 130.

Habitat in Madagascar.

* Macaco. 2. *Prof.* caudata nigra; collaris barbato; cauda pilosa. LINN. 12. p. 44. 3. vari BUFF. XIII. tab. 27. SCIIREB. Zaugh. 1. tab. 40. & B. Black Maucauco EDW. glean. 1. tab. 217. Rubed Maucauco PENN. 215. 132.

Habitat in Madagascar.

Animal ferox, adeoque vociferans, ut ubi in Sylvis duo vel tres simul adsunt centum audire crederes.

* Catta. 3. *Prof.* grisea; auribus erectis, cauda annulata. LINN. p. 45. 4. Mococo BUFF. XIII. tab. 22. Angl. Maucauco EDW. birds IV. 179. Ringtailed Maucauco PENN. quadr. p. 214. 131.

Habitat in Madagascar, Isle de France.

* Volans. 4. *Prof.* caudata membrana ambiente volitans LINN.

12. p. 45. 5. *Maki volant. flying Maucauço*
PENN. quadr. p. 218. n. 135. tab. 27.

Habitat in *Philippinis*.

Auctoritate omnium principum in arte, hic posui animal anomalam, rarissimum, forte sui proprii generis, certe non *Lemur*, uti mihi intuenti duo specimina patuit, quorum alterum cum nuper defuncto *Liunæo* examinavi. *Dentes* ob os clausum in farcto animale, haud videre potui.

Nec rostrum adeo acutum, ut huic generi solet, nec crura posteriora, anticis longiora, nec cauda longitudine corporis, quod *Prosimiis* solenne, nec pedes manuiformes.

†* *Spectrum*. 5. *Prof.* cauda gracili nuda apice floccosa, tibiis posticis nudis. ERXLEB. syst. p. 71. *Tarsier* BUFF. XIII. tab. 9. SCHREB. Zaugh. tab. 155. *Lemur spectrum* PALL. nov. sp. ex glir. ord. p. 275. in notis.

Habitat in *Molluccis*.

Inter *Gerboas* vel *Dipodes*, *Opossa*, *Prosimias* & *Tardigrados* (meos) media.

Minima. 6. *Prof.* cauda longa prehensili corpore supra cincereo subtus albo. *Rat de Madagascar* BUFF. suppl. III. tab. 20. *little Maucauço*. PENN. p. 217. 134. BROWN illust. of Zool. tab. 44.

Habitat in *Madagascar*.

O B S E R V A T I O N E S.

Pedibus manuformibus, vixtu, moribus, simiis affines, plerisque aures pendulae, flaccidae, nudae. Prosimia volans ens sui generis; & quare huc amandaverit cl. LINNÆUS mihi latet; animal rarissimum, in paucissimis museis obvium.

An & spectrum huc pertineat dubito.

* III. TARDIGRADUS CAPUT: rotundum Simiae; sed os productum; auriculæ rotundæ.

CORPUS macrum, lanosum, cauda nulla.

Pedes, crura posteriora longiora, nuda, digitus index ungue acuto incurvo.

* Loris. 1. *T. ecaudatus*, corpore attenuato, artibus longioribus. ZIMMERM. p. 211. Loris BUEF. XIII. tab. 30. 31. SCHREB. Zaugh. tab. 38. tardigradus LINN. 12. p. 44. I. the tailless maucauco PENN. quadr. Habitat in Ceylon.
Mingit elitoride? sic d'Aubenton.

Coucang. 2. *T. artubus auriculis que brevioribus, corpore crassine linea dorsali sub fusca.* The tailless Maucauco PENN. quadr. pag. 212. n. 128. tab. 26. Paresseux pentadaestyle de Bengale VOSM. monogr. Habitat in Bengal.

O B S E R V A T I O N E S.

Hocce genus Prosimiis, Bradypisque interposui; utrique affine. Tria *Loris* specimina vidi, examinavi, nec Tardigradum Linnaei ad Prosimias pertinere, mihi docuit: Caput, magis Bradypi, mammae quatuor duas pectorales duas abdominales, aures rotundæ, oculi magni, approximati, caudæ absentia, pedes nudi, haud maniformes, Unguis digiti indicis in pede posteriore; præterea anatome mihi monstravit, cristam osseam perpendicularem futuræ sagittali, ad firmandum masseterem, qualis in Feris nonnullis; alter habitu crassiore, victu moribus, corpore crassiore ad *Bradypus* accedit, capite tamen & ungue indicis priori congener, ut & illi pollex plantarum remotus, hæc duo itaque Animalia, catenam a Prosimiis ad Bradypus efficere mihi videntur.

IV. BRADYPU.S CAPUT: rotundum pilosum.
Dentes incisores nullæ , nec
 Laniarii.

CORPUS valde pilosum.
Pedes , crassi villoſi , ungu-
 bus validis , longis , incurvis.

* Didactylus. 1. B. manibus didactylis cauda nulla. LINN.
 12. p. 51. 2. Unau BUFF. XIII. tab. I. Two
 toed sloth Penn. quadr. p. 496. 360. SCHREB.
 Zaugth. II. tab. 65.
 Habitat in Ceilon.

*Tridactylus. 2. B. pedibus tridactylis , cauda brevi. LINN.
 12. p. 50. 2. Al. BUFF. XIII. tab. 5. 6. The
 sloth EDW. glean. tab. 310.
 Habitat in America meridionali in arboribus.

O B S E R V A T I O N E S.

Bradypus didactylus , habitat quidem æque in antiquo ,
 quam in novo orbe , ut recte affirmat Doct. ERXLEBEN ,
 negante BUFFONIO , haud tamen *Potto* mihi videtur
Guineenium , qui *kinkajou* BUFFONII , quem postea vi-
 debimus inter *Mufelas*. Costæ huic animali viginti tres
 in quoque latere ; Altur tridactylus , pigerrimus , mi-
 ferrimū animal , potius quasi vegetans , quam vivens.

V. VESPERTILIO. CAPUT: rictus oris spati-
 ofus , auriculæ striatæ in-
 tus ; Brachia longa , &
 Palmæ digitis , quasi in ra-
 dios alarum membranace-
 arum longe protractis.

α. Naso simplici.

*Vampyrus. 1. V. ecaudatus , rostro canino , membrana in-
 ter

ter femora divisa. LINN. *syst.* 12. p. 46. 1.
Rougette & Roufette. BUFF. x. tab. 14. 17.
Ternate Bat. PENNANT. *quadr.* p. 548. n. 393.
great Bat. EDW. *birds* 180. SCHREB. II. *tab.* 44.
 Habitat in *Guinea, Madagascar.*
 Extensis aitis 20. pollic.

* *Leporinus.* 2. V. caudatus labio superiore siffo. LINN.
 12. p. 88. 1. (*Noctilio*) *Chat volant. the*
Peruvian Bat. PENN. *quadr.* p. 554. n. 398. β.
 Habitat in *America.*

* *Auritus.* 3. V. auriculis capite majoribus. LINN. 47. 5.
oreillard. BUFF. VIII. tab. 17. *long eared Bat.*
 EDW. *glean.* 201. *Britt. Zool. illustr.* tab. 103.
 Habitat in *Europa.*

* *Murinus.* 4. V. auriculis longitudine capitis. LINN. 47. 4.
le Chauve souris, BUFF. VIII. tab. 16. f. 1. 2.
the commun Bat. PENN. *quadr.* p. 563. 411.
 Habitat in *Europa.*

† *Noctula.* 5. V. auriculis capite brevioribus, corpore cano.
La Noctule. BUFF. VIII. tab. 18. 1. *Noctule Bat.*
 PENN. *quadr.* p. 559. n. 407.
 Habitat in *Gallia, Anglia.*

† *Serotinus.* 6. V. auriculis capite minoribus, corpore ferrugineo. *Serotine* BUFF. VIII. tab. 18. 2. SCHREB.
Zaugth. 1. tab. 53. *Serotine Bat.* PENN. *quadr.*
 p. 560. 408.
 Habitat in *Gallia, Germania.*

† *Pipistrella.* 7. V. auriculis longitudine capitis, corpore subtilis nigricante, *Pipistrella* BUFF. VIII. tab. 19.
 2. SCHREB. *Zaugth.* 1. tab. 54. *the Pipistrelle*
Bat. PENN. *quadr.* p. 561. n. 409.
 Habitat in *Gallia, Russia, Siberia.*

† *Barbastella.* 8. V. buccis barbatis, auriculis longioribus
 frontem tegentibus. *La barbastelle* BUFF. VIII.
 tab. 19. f. 2. SCHREB. *Zaugth.* 203. tab.

VESPERTILIO.

55. *the barbastelle Bat.* PENN. *quadr.* p.
561. 410.

Habitat in *Gallia*.

† *Hispidus.* 9. *V. auriculis longitudine capitis, fronte sulcata longius pilosa.* *Chauvesouris etrangere.*
BUFF. x. tab. 20. fig. 1. 2. *the Senegal Bat.*
PENN. quadr. p. 556. n. 400.

Habitat in *Senegal*.

† *Kiriwoula.* 10. *V. auriculis longitudine capitis, membrana volitante striata.* *Le Muscardin volant.*
BUFF. x. tab. 20. fig. 3. *Schreb. Zaugh. tab.*
56. *Barded Bat.* *PENN. quadr.* 557. 402.

Habitat in *Ceylon*.

† *Nigrita.* 11. *V. auriculis brevioribus, valvulis aurium acuminatis.* *Marmotte Volante.* *BUFF.* x. tab. 18.
(*chauvesouris etrangere.*) *The Senegal Bat.*
PENNANT quadr. p. 556. 400.

Habitat in *Senegal*.

† * *Molossus.* 12. *V. auriculis brevioribus valvulis rotundatis,*
labiis pendulis. *Mulot Volant.* *BUFF.* x. tab.
19. f. 1. 2. (*chauvesouris etrangere*) *Buldog Bat.*
PENN. quadr. p. 555. n. 399. *SCHREB.*
Zaugth. tab. 49.

Habitat in *America*.

† * *Cephalotes.* 13. *V. capite magno, labio superiore fisso,*
naribus cochleatis, valvulis auricularum nullis. *Chauvesouris; a narines spirales.* *PALLAS spicileg.* III. tab. 1. *BUFF. suppl.* vi.
pag. 116. tab. 19. *Molucca Bat.* *PENN.*
quadr. p. 558. n. 405.

Habitat in *Moluccis*.

† * *Lepturus.* 14. *V. membrana ad cubitum saccata, naribus tubulatis.* *Le chauvesouris a bourse* SCHREB.
Zaugth. I. tab. 57. *Pouch Bat.* *PENN. quadr.* p.
556. n. 401.

Habitat in *Surinami*.

† No-

VESPERTILIO.

71

† Novebor 15. V. apice nasi subfimo, macula alba ad basin acus, membranæ volitantis, *le point blanc.* SCHREB.
Zaugth. 1. p. 176. *Newyork Bat.* PENNANT quadr. p. 557. n. 403.

Habitat in *Noveboraco.*

† Lasurus. 16. V. cauda longissima, rostro oblique truncato, *la longue Queue.* SCHREB. tab. 52. B. *longtailed Bat.*

Habitat. — —

Quare Doct. ERXLEBEN, ZIMMERMAN, PENNANT hunc notabilem vespertilionem omiserunt, mihi latet.

β. Naso foliato.

* Spasma. 17. V. naso foliato obcordato. LINN. *Syst.* 12. p. 47. *le Rat volant.* SCHREB. 191. tab. 48. *the cordated Bat.* PENN. quadr. p. 554. n. 397.

Habitat in *America.*

* Spectrum. 18. V. naso infundibuliformi, lanceolato, cauda nulla. Andira (vampire BUFF. x. p. 55.) SCHREB. tab. 45. *the spectre Bat.* PENNANT quadr. 552. 394.

Habitat in *America.*

† * Sorici- 19. V. subcaudatus, canus, naso foliato, ovali, acuminato, lingua propendente, *la feuille,* D'AUBENT. PALLAS *spicileg.* III. tab. 3. BUFF. *supplem.* III. tab. 20. *leaf Bat.* PENN. quadr. p. 553. n. 396. *small Bat.* EDW. *glean.*

Habitat *Surinami.*

* Perspicil- 20. V. ecaudatus naso foliato, plano acuminato. latus. LINN. 12. p. 47. 3. *fer de Lance.* BUFF. XIII. tab. 33. *Javelin Bat.* PENN. quadr. p. 553. n. 395.

Habitat in *America.*

† Ungula. 22. V. ecaudatus, folio nasi ungulam equinam referente. *Fer a Cheval.* BUFF. XIII. tab. 17. 20. E 4. SCHREB.

OBSERVATIONES.

SCHREB. Zangth. tab. 62. Horse shoe Bat. PENN;
quadr. p. 559. n. 406.

Habitat in Burgundia, Gallia, & comitatu Kent
angliae.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Inter omnia Quadrupedia vespertiliones soli volitant, volatus enim sciurorum quorundum, & Prosimiae volantis magis subsultus, ab arbore in arborem.
2. Tota earum compages, volatui adaptata; thorax peramplus, musculi pectorales magni, lati, crassi. Posteriora exilia levia; membrana inter artus posticos expansa superpondium aequat, & pedum posteriorum motu, volatum regit, itaque officio rectricum sufficitur.
3. Omnibus cerebrum & cor prægrande, intestinum breve, cœcum nullum.
4. Omnes lucis exosce, in tenebris latent, & vespere exeunt.
5. Pulli omnibus pauci; neonati impotentes ut feris plerisque; utque Fera, famem satis longam sufferre parres.
6. Nullum genus magis systematicorum, de *Dentibus* legem infringunt, inde LINNÆUS & BRISSONIUS amore Methodi ducti, *Pteropos* & *Noctiliones* a genere vespertilionum, invita Natura, separaverunt; qua de re legi meretur, (ut in omnibus, quæ scripsit) celeb. PALL. *Spicil. Zool. fasc. III. p. 6—10.*
7. Vespertilionum Phalanx ad Ruminantia accedere quis crederet? *Hastatus*, tamen & *Cephalotes* labia & Buccas habent intus villosas; ventriculus bipartitus & in nostro vespertilio.

VI. DASYPUS CORPUS: *Rostrum elongatum,*
subacutum.

CORPUS testa ossea mobili ope
Zonarum, tectum.
Pedes subtus villosi.

* *Tricinctus.* 1. *D. cingulis tribus pedibus pentadactylis.* LINN.
 p. 33. 2. *Apar.* BUFF. x. *the three banded*
armadillo. PENN. *quadr.* p. 498. SCHREB.
Zaugth. II. tab. 72.
 Habitat in *America.*

* *Sexcinctus.* 2. *D. cingulis senis pedibus pentadactylis.* LINN.
 12. p. 54. n. 4. *l'Encoubert.* BUFF. *Suppl.*
 III. tab. 24. *the six banded armadillo.* PENN.
quadr. p. 499. 362.
 Habitat in *Brasilia, Mexico.*

Octocinctus. 3. *D. capite longiore cingulis octo.* LINN. 12.
 p. 54. 5. *Tatuete* BUFF. x. KNORR. tab. 43.
 f. 2. SCHREBER *Zaugth.* II. tab. 72. *eigt banded*
armadillo. PENN. *quadr.* p. 500. n. 363.
 Habitat in *America australi.*

* *Novem cin-* 4. *D. cingulis novem, palmis tetradactylis,*
ctus. *plantis pentadactylis* LINN.. 12. p. 54. 6.
Cachicame BUFF. x. tab. 37. SCHREB. *Zaugth.*
 II. tab. 74. *the nine banded armill.* PENN.
quadr. p. 500. n. 364.
 Habitat in *America australi.*

* *Duodecim-* 5. *D. cingulis duodecim, pedibus pentadacty-*
cinctus. *Kabassou.* BUFF. x. tab. 41. *Twelve ban-*
ded armadillo. PENN. *quadr.* 501. n. 365.
 Habitat in *America.*

Otto decim 6. *D. cingulis octodecim pedibus pentadactylis.*
cinctus. (*unicinctus*) LINN. p. 53. 6. *Cirquinçon* BUFF.
 x. tab. 42. *eighteen banded armadillo.* PENN.
 p. 502. n. 366.
 Habitat in *America australi.*

OBSERVATIONES.

1. Totum hocce genus, dentibus incisoribus & Laniariis carens ; singulari modo a CREATORE vestitum ; ita ut inde quasi transitum ad Testudines monstrare voluisse, testa hæcce ossea non modo variat numero cingulorum, sed & figurarum, quibus ornata est.
Figuræ regulariter sparsæ opus Musivum (Mosaïque) mentiuntur, omnes pelliculâ quâdam tenuissima, tunicâ arachnoideâ, quasi tectæ, inde animal vernice obductum crederes, figuræ hexagonæ, in novem cincto etc. Osseæ sunt Naturæ, partim cellulosæ, partim spongiosæ.
2. Ope cingulorum imo & illarum particularum, sese in globum voluant *Dasyodes*, Erinaceorum more ubi terrefacti.
3. Habitant in cuniculis, subterraneis, nec die sæpius exeunt nocturna hæc animalia. Vicitant fructibus & carne, quod singulare in animale edentulo.
4. Edules præsertim Juniores ; testa Indicis magni usus.
5. Quadricinctum sciens omisi, non nisi ex vitiosa testa a COLUMELLA descriptum, a nemine alio visum.

VII. MANIS CAPUT: rostrum acutum, Lingua extensilis.

CORPUS tectum squamis. Mammæ pectorales. Cauda longa.

*Pangolinus. 1. M. cauda fere longitudine corporis, pedibus pentadactylis. LINN. 12. p. 52. 2. Pangolin BUFF. x. tab. 34. *Short tailed Manis*. PENN. quadr. p. 505. n. 368.
Habitat in *Guinea*, *Formosa*, *China*.

*Phatagus. 2. M. cauda corpore longiore, pedibus tetradactylis. LINN. 12. p. 52. 1. Phatagin BUFF. x. tab. 34. *long tailed Manis*. PENN. quadr. 506. n. 367.
Habitat in *Guinea*.

OBSERVATIONS.

1. Et hocce genus Lacertis adeo & magis adhuc affine, quam præcedens Testudini, ita ut & inde catena a quadrupedibus ad repentes quodammodo pateat.
2. Lingua saliva gummosa, obducta, inde formicæ omni gummoso avidæ, lingua conglutinantur sicque devorantur.
3. Se detendit involvendo in globum, erectis squamis margine asperimis, animal mite innocuum.

VIII. MYRMECOPHAGA. CAPUT: *rostrum*
longissimum ratione Capitis;
Dentes nulli. Oculi minimi.
CORPUS pilosum. Cauda longa.
Pedes unguibus incurvis validis.

* **Didactyla.** 1. M. palmis didactylis, plantis tetradactylis cauda villosa prehensili. LINN. *syst. 12.* p. 55. I. Fourmiller BUFF. *x. tab. 30.* *lest anteater.* PENN. *quadr. p. 510. n. 372. tab. 50.* EDW. *glean. tab. 220.* SCHREB. *Zaugth. II. tab. 66.*
 Habitat in *America australi.*

* **Tridactyla.** 2. M. palmis tridactylis, plantis pentadactylis cauda villosa. LINN. *syst. 12. n. 2. fourmiller a longues oreilles, theetoed anteater.*
 Habitat in *America australi.*

* **Jubata.** 3. M. palmis tetradactylis, plantis pentadactylis, cauda jubata. *Tamanoir.* BUFF. *x. tab. 29.* SCHREB. *Zaugth. II. tab. 67. the great anteater.* PENN. *quadr. p. 507, n. 369.*
 Habitat in *Brasilia, Guajana.*

† **Striata.** 4. M. palmis, plantisque pentadactylis, maxilla inferiore breviore, cauda longa pilosa, cylindrica, corpore striato. *Tamandua* BUFFON *suppl. III. tab. 56. edit 40. vi. tab. 23. edit 12°. the striped anteater.* PENN. *quadr. 509. 371.*
 Habitat in — —

†* *Afra.*

DIDELPHIS.

†* *Afra.* 5. M. rostro elongato fulvo, truncato, auribus magnis acutis, pedibus tetradactylis. PALL. *miscell. Zool.* p. 65. *Cochon de Terre* BUFF. *suppl. XII.* tab. 31. *earth Hedge.*

Habitat ad Cap b. Sp.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Animal nocturnum, formicis vescens, quarum nidum aperit, (saltēm jubata,) quamvis edentula, nihilominus periculosa, præsertim femella, unguibus strenue pugnat, nec Pantheram timet, natat trans flumina, cauda in dorsum posita, pluviam metuit.
2. Plane edentes esse Myrmecophagas crediderunt Zooli; molares tamen adesse demonstravit doctiss. CAMPERUS.
3. *Africanam* speciem cum *Americana* convenire scripsit PENNANTUS ut res confirmata, sed comparetur icon BUFFONII *suppl. VI.* tab. 31. cum *Americanis*, tum maximam videbimus differentiam.

II. F E R Æ.

IX. DIDELPHIS CAPUT: *rostrum*, elongatum, *Lingua ciliata*. *Aures nudæ*, pendulæ.

CORPUS longum, pilosum, *cauda* subnuda, murina, feminis aliquando, foccus abdominalis; *Penis* duplex manibus.

Pedes plantæ submanufornmes, pollice multico, remoto.

* *Marsupialis.* 1. D. atrospadiceus in dorso, subtus slaveans, maculis supra oculos, obscure fulvis. LINN. *syst. 12.* p. 72. 3. *Sarigue* BUFF. XI. tab. 45. 46. *Virginian Opossum*. PENNANT *quadr. p. 301. n. 181. 182. tab. 34.*

Habitat in America.

* Phi-

DIDELPHIS.

77

*Philander. 2. D. auriculis pendulis, mammis quaternis LINN.
syst. 12. p. 72. 2. Philandre; SEBA thes. 1.
p. 57. tab. 36. 4.
Habitat in Brasilia.

*Opossum. 3. D. cauda semipilosa, superciliarum regione
pallidiore LINN. p. 72. 3. PALLAS miscell. p.
63. Rat des Bois.
Habitat in Virginia, Louisiana, Mexico.

†* Orien. 4. D. rostro minus producto, linea dorsali nigra,
talis. PALLAS miscell. p. 59. Phalanger BUFF. XIII.
tab. 10. 11. opossum Phalanger PENN. quadr.
311. n. 190.
Habitat in India, Orientali.

†* Brevi- 5. D. cauda brevi, crassa. SEBA thes. 1. tab. 31. 6.
cauda. Philandre a courte Queue. BRISSONII the short
tailed opossum. PENNANT quadr. p. 311. n. 189.
Habitat in America.

* Murina. 6. D. rostro acutiusculo, sulco bilobo, ungue pol-
licum palmarum acuto, cauda semipilosa. LINN. p.
12. n. 4. Marmose BUFF. x. tab. 50. SCHREB.
Zaugh. III. tab. 149. Murine opossum. PENN.
quadr. p. 308. 385.
Habitat Surinami, in Guajania.

†* Cayopollin. 7. D. cauda ad basin pilosa, ceterum nuda,
maculata; mammis sex extra abdomen. LINN.
syst. 10. 2. Cayopollin BUFF. x. tab. 55.
Mexican opossum PENN. quadr. p. 309. 186.
SCHREBER Zaugh. III. tab. 184.
Habitat in America.

*Dorsigera. 8. D. cauda basi pilosa, corpore longiore, di-
gitis manuum muticis. LINN. syst. 12. p. 72.
Philandre de Surinam. MERIAN Suriu. tab.
66. the Merian opossum. PENN. quadr. 392.
191. SCHREB. Zaugh. III. tab. 150.
Habitat Surinami.

†Carcinophaga. 9. D. caninis superioribus exsertis, vellere
hir-

DIDELPHIS.

hirto, cauda squamosa. *Crabier.* BUFF. *Supplm.* III. tab. 54. *the Crab eater.* *cayenne opossum.* PENN. 309. 187.

Habitat in *Gujana.*

† *Kanguro.* 10. D. gigantea, abdomine incrassato, pedibus anticis brevissimis, posticis longioribus, cauda attenuata longitudine corporis. ERX. p. 409. ZIMM. *geogr. Zool.* p. 231. n. 134. *le Kanguro.* COOKS *trav.* tom. III. tab. 20. SCHREB. III. tab. 154. *Kanguroo.* PENN. *quadr.* p. 306. n. 184.

Habitat in *Nova Hollandia.*

† *Javanus.* 11. D. cauda corpore breviore, auribus erectis, fascia trans oculos fusca; pedibus anticis brevioribus, palmis pentadactylis, plantis tridactylis. *la Marmote des grandes Indes.* FILANDER *Bruins reiz.* tab. 213. *Jayan opossum* PENN. *quadr.* 305.

Habitat in *Java.*

† *Peregrinus.* 12. D. cauda longa pilosa, apice nuda corpore supra ferrugineo, subtus albo. *Filandre du sud.* *New Holland opossum* PENN. *quadr.* 311. n. 188.

Habitat ad *flumen Endeavour.*

O B S E R V A T I O N E S.

1. *Genus* hoc difficile definiendum, plerique enim Zoologi Dentes atque saccum abdominalem pro signo diagnostico acceperunt perperam tamen.

Opossum enim octo dentes incisores habet in quaque maxilla; *Sarigue* BUFFONII decem supra, octo infra. *Kanguroo* quatuor supra, duo infra.

Saccus abdominalis, femellis solis, & non omnibus, *murina* (*Marmose*) solum modo plicam habet abdominalem; nec eo gaudet *Cayopollin*, nec *Cancrophagus*, nec *Brevicauda*, nec *Dorsigera*.

Nec cauda criterion, ea enim non omnibus, nec longa, nec seminuda.

2. *Kanguronem*, hicce generi adjeci, sive PENNANTI & ZIM-

ZIMMERMANNI, non modo, sed & Doct. CAMPERUS, in ditissimo Museo sceleton conservat *Didelphidis*, pedibus anticis brevissimis posticis longissimis, quod ex rudi delineatione quam currente calamo confecerat vir peritiss. statim pro *cangurone* agnovi.

Gens *Phytiphagis*, carnivorisque intermedia, vegetabilibus enim, æque ac avibus nutritur.

X. URSUS. CAPUT: subconicum, oculi parvi, membrana nictitans.

CORPUS dense pilosum, cauda abrupta.

Pedes talis incedentes.

**Arctos*. 1. U. auriculis brevioribus rotundi, collo brevi.

LINN. *syft.* 12. p. 69. 1. *Ours*. BUFF. VIII. tab.

31. SCHREB. *Zaugh.* III. tab. 139. 140. *Black bear* PENNANT *quadr.* p. 285. 174.

Habitat in *Europa*, *Asia*, *Japan*, *Ceylon*, *America boreali*, *Peru*.

†**Americanus*. 2. U. capite angustiore rostro canino, corpore aterrimo pilo teneriore, gula, genisque ferrugineis. *Ours d'Amerique*. PALL. *spicil.* XIV. p. 6. *American bear*. PENN. *quadr.* p. 286.

Habitat in *America*.

†*Maritimus*. 3. U. albus cauda abrupta, capite, colloque elongato, corpore graciliore. *Ours blanc*. BUFF. *suppl.* III. tab. 34. *Poler bear*. PENN. *quadr.* p. 288. n. 175. tab. 34. 1.

Habitat in *Groenlandia*, *Nova Sembla*, *Spitzberg*, *Hudsonsbaay*.

O B S E R V A T I O N E S.

I. Ursos, cum mele conjunxerat in uno genere cl. LINNÆUS, quem alii secuti Zoologi, uti PENNANTUS, BRISSONIUS, imo &, quod miror, cl. ZIMMERMAN cui for-

forsan, ei distinctio, quam doctiss. PALLAS dedit (*spicil. Zool. fasc. XIV.* latebat).

2. Ursi mole & forma robusti, artubus, lacertosis, victu semi vegetabili, se distinguunt, ut & hyberno sopore. *Arctos* animal segne, haud sine injuria hominem adorans; arbores, concendit, descendit prae eunte cauda. *Pellis urforum*, borealibus incolis tegmen atque vestitus; inde objectum mercaturæ.

Maritimus ferox, carnivorus, hominem adoritur. Hybernat sub nive in fossis profundis, strenue defendit prolem.

XI. MELES. CAPUT: *rostrum* subacutum, fascia oocularis.

CORPUS longum, *cauda* longa.
Pedes breves, talis innixi.

* *Taxus*. 1. M. cauda concolore, abdomine, fascia que oculari nigris. LINN. *syst. 12.* p. 70. 2. *le Blaireau*. BUFF. VII. p. 104. tab. 7. 8. RIDINGER *Jachtb.* tab. 17. *the badger* PENN. *quadr. 297.* 179. *commun badger*.

Habitat in *Europa*.

β. *Americanus*, linea alba nigra que a naso, trans frontem ad dorsum; abdomine cinereo. *Blaireau d'Amérique*, *American Badger*. PENN. *quadr. 298.*

Indicus. 2. M. facie atra, pedibus pentadactylis. *Blaireau des Indes*. *Indian Badger* PENN. *quadr. 299.* 180.

Habitat in *India*.

* *Lotor*. 3. M. cauda annulata, fascia per oculos transversali nigra (*Ursus*) LINN. *syst. 12.* p. 70. n. 3. *Raton*. BUFF. VIII. tab. 43. *Raccoon* PENN. p. 295. n. 178. SCHREB. tab. 143.

Habitat in *America*.

Luscus. 4. cauda unicolor, rostro pedibusque fuscis sanguineis & lateribus pallidis LINN. 12. p. 72. n. 4. *la Wolverine* EDW. *birds II.* tab. 104. *glouton* BUFF. sup-

Suppl. iii. p. 244. perperam. *Wolverenne Bear.*

PENN. *quadr.* 291. 176.

Habitat in *America*.

Gulo. 5. M. rostro conico obtuso, corpore macilento, canescente, ephippio aterrimo. PALL. *spicil.* XIV. tab. 2. Ginberg ut Holm. 1773. part. III. tab. 7. 8. glouton BUFF. *suppl.* III. tab.

Habitat in *Sibiria, America*.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Meles Taxus jam veteribus notus, uti ex Plinio Lib. VIII. c. 38. patet.
2. Lotoris historiam plenariam dedit KALMIUS autoptam.
3. KLEINIUS & BRISSON hunc cum Viverra *nasua* perperam confunderunt.
4. Pili boni pro consciendis pileis.
Huic generi adjunxit PALLASSIUS Melen caudivolvulam, suam, quæ mihi potius *Viverra* videtur, vidi duo animalia, ut & *viverram tetradaëtylam*; de quibus in observationibus ad *Viverras*.
5. Gulo adeo graphicè a doctiss. PALLAS & GENBERG depictus, atque depictus, Viverras cum Mele & Ursò connectit, ope horum in arte principum, Gulonis historiam veram a fabulis purgatain, habemus.
Pilos Gulonis Americani (fulvi) quadrangulares esse in medio, triquetros prope finem jam nunc mihi ostendit lens microscope, uti olim celeb. BASTERO scripsi. (Vid. ait. *Harlem.* tom. XIV. tab. I. fig. 15.) quade re dubitare videtur amiciss. PALLAS, qui eos in Gulone Sibirico rotundos invenisse dicit.

XII. VIVERRA CAPUT, rotundum rostro porrecto, Aures rotundæ; Dentes parvi. Lingua aculeata. CORPUS gracile, flexile, cauda longa. Pedes digitati 5. 5. Folliculus putorius, plerisque fætidus.

Civetta. 1. V. subjugata, albo, nigro, rufa fasciata & maculata cauda mediocre. LINN. syst. 12. p. 65. n. 1. *la civette* BUFF. IX. tab. 34. SCHREB. Zaugh. III. tab. 111. *Civet Weesel*. PENN. quadr. p. 346. 223. Habitat in *India*, *Guinea*. etc.

*Zibetha. 2. V. cauda elongata, annulata, dorso cinereo nigro undique striato, collo laevi. LINN. syst. 12. 1. *le Zibet*. BUFF. IX. tab. 31. SCHREB. tab. 112. *Civet Weesel*. PENN. l. c.

Habitat in *Syria*, *India*, *Malabar*, *Siam*.

Genetta. 3. V. cauda annulata, corpore fulvo, nigrante maculato. LINN. syst. 12. 2. *la Genette* BUFF. IX. tab. 36. suppl. III. tab. 47. SCHREB. Zaugh. III. tab. 113. *Genet Weesel*. PENN. quadr. p. 394. n. 224. Habitat in *Gallia* meridionali *Hispania*.

† *Fossa. 4. cauda annulata, corpore cinereo maculato. ERXLEB. syst. p. 498. *Fossane* BUFF. XIII. tab. 20. SCHREB. Zaugh. tab. 114. *Fossane Weesel*. PENN. quadr. p. 349. n. 225. tab. 37. 2. *Bizam Kat.* VOSM. monogr.

Habitat in *Africa* meridionali.

† Hermaphro- 5. V. nigro cinereoque varia, dorso fasciis dita. tribus atris, cauda apice atra, *l'Hermaphrodite*. PALL. apud. SCHREB. Zaugh. III. p. 426. ZIMMERM. geogr. Zool. II. p. 285. Habitat in *Barbaria*.

* Ichneumon. 6. V. cauda basi incrassata, sensim attenuata, apice floccosa. LINN. 12. p. 68. 1. *la grande*

de mangouste. BUFF. *supp.* III. tab. 26. PENN *quadr.* p. 333. 210.

* β . V. cauda e basi incrassata, sensim attenuata corpore minore. VOSM. *monogr.*

γ . Nems. V. ruto fusca, albo striata pedibus obscure fulvis BUFF. *suppl.* III. tab. 29.
Habitat in *Africa, Orientali.*

\ddagger Capensis. 7. V. cauda apice attenuata, corpore flavescente, dorso fusco nigricante, pedibus nigris. *Ichneumon du Cap.* PALL. apud SCHREB. III. p. 434. *Capweef. l.*

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

\ddagger Tetradactyla. 8. V. pedibus tetradactyliis corpore flavescente. ERXLEB. *syst.* p. 488. *le Suricate* BUFF. XIII. tab. 8. SCHREB. *Zaugth.* tab. 117. *the fourtoed Weesel.* PENN. *quadr.* p. 336. n. 212.

Habitat in *Asia & ad Cap. bon. Sp.*

\ddagger Mellivora. 9. V. dorso cinereo, fascia laterali nigra, unguibus longis, cavis, folioriis *Ratel* SPARRM. *Schwed Abh.* 1777. tab. 4. f. 3. PENN. *quadr.* p. 344. 220.

Habitat ad *Cap. b. Sp.*

\ddagger Capensis. 10. V. nigra dorso griseo, albo marginato. ERXLEB. p. 493. 9. *Blaireau puant du Cap. the Fiezler Weesel.* PENN. *quad.* p. 340. 215. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 125.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

* Nasua. 11. V. rufa, cauda albido annulata. LINN. *syst.* 12. p. 64. 2. *Coati* BUFF. VIII. tab. 48. *Brazilian Weesel.* PENN. *quadr.* p. 340. 215.

Habitat in *Braflia, Guajana.*

β . V. Narica ; subfuscus cauda concolor. LINN. *syst.* 12. p. 64. 3. *Coati noiratre* BUFF. VIII. tab.

47. SCHREB. *Zaugt.* III. tab. 119. *Dusky Brasiliæ Weasel.* PENN. *quadr.* l. c. β .
Habitat cum præcedente.

† *Vulpecula.* 12. V. castanea subtus slavecens. ERXLEB. *syst.*
p. 490. *le Corse* BUFF. XIII. tab. 38. SCHREB.
Zaugth. p. 440.
Habitat in *Mexico, Virginia.*

β . *Viverra cauda fusca, lutes annulata, corpore spadiceo.* LINN. *syst.* 10. p. *Coase* BUFF.
XIII. tab. 38, *Stifling* PENN. 341.

* *Putorius.* 13. *nigricans, lineis dorsalibus albis.* LINN. *syst.*
12. p. 64. 4. *le Conepate* BUFF. XIII. tab. 40.
Polcat CATESB. *Carol.* tab. 62.
Habitat in *America Septentrionali.*

† β . *Puerilis, lineis duabus albis.*
Habitat in *Mexico.*

*† *Fœda.* 14. V. dorso albo, linea longitudinali nigra. ERXLEB.
syst. p. 491. *le Chinche* BUFF. XIII. tab. 39. SCHREB.
Zaugth. III. tab. 121. *the Skunk Weasel.* PENN.
quadr. p. 343.
Habitat in *Mexico.*

† *Semistriata.* 15. V. nigra, fascia alba a fronte ad medium
dorsi, caudæ apice alba; *le demi strié*
Schwedisch. Abhand. 1769. p. 68.
An varietas præcedentis sic cl. ERXLEBEN.
Habitat in *Mexico.*

† *Zorilla.* 16. V. albo nigroqne varia. *Zorilla* BUFF. XII.
tab. 41. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 123. *the*
Zorilla Weasel. PENN. *quadr.* p.
Habitat in *Mexico, Peru, California.*

†* *Vittata.* 17. V. corpore brunneo; vitta grisea, albo marginata, cauda mediocri ZIMMERM. *geogr. Zool.*
II. p. 296. n. 194. *le grison* ALLAMAND ad
BUFF. *suppl.* III. tab. 25. 23. SCHREB. *Zaugth.*
III.

III. tab. 124. *Grison Weesel* PENN. quadr. 331.
p. 201.

Habitat Surinami.

† Caudivolvola. 18. V. capite rotundo rostro producto, corpore flavo, cauda longa prehensili. *Potot*, ou *Kinkajou Potot*. BUFF. suppl. vi. pl. 18. (edit. 120. *Potto Weesel* VOSM. monogr. the *Yellow Maucaco* PENN. quadr. p. 337. 213. the *Yellow Weesel*.

Habitat. — — —

β. Kinkajou BUFF. suppl. vi. pl. 17. huic cauda non prehensilis.

† * Ceilonensis. 19. V. mystacibus, longioribus, corpore griseo fulso, cauda longitudine corporis. ZIMMERM. geogr. Zool. II. p. 288. n. 183. *Viverra Ceilonensis* PALL. apud SCHREB. Boshond VOSM. monogr.
Habitat in Ceilon.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Viverræ, agiles, graciles, dentium numero majore, diæta animali, differunt a *Melibus* quibus affines.
2. Praeter citatas species doct. PALLAS his subjungit Lutram, Lutreolam; Lubenter & has hic, nutu tanti Zoologi adduxissim, sed vetat, pedum palmatorum conformatio; victus ex Piscibus, & sub aquis, ut & interna structura.
3. *Nasuam* & *Naricam* conjunxi; ambas vidi & habui nec discrimin præter coloris, notabile videre potui.
4. Species aliquas obscuras ab amicissimo ZIMMERMANNO citatas, ut *felem capite acuminato* SEBÆ I. tab. 48. *Caudevolvole* satis ad finem, *Mustelam subfuscum* linea longitudinali alba per utrumque latus ducit BROWNII jam. p. 486. I. *Squasch* DAMPIERII, *Chinche* FEUILLEI, Maikel *Falknerii* sciens præterii cum non satis definitæ.
5. *Ceilonensem* ultimam citavi, cum illa media *Viverræ* inter & *Mustelas* transitum duorum generum sibi valde assi-

assimum efficiat, ita ut cl. PENNANTUS utraque genera in unum confundat viverram *caudivolvolum*, & *tetradactylam*, ductu amicissimi PALLAS hic stare jussi, priorem, antea Pennantus ad *Prosimias* numeravit in *synopsi quadr.* sed jam hunc in *historia quadr.* ad *viverras* amandavit; *tetradactylam*, quamvis digitis modo quatuor instructa in viverris adnumeravi, quamvis cl. PALLAS eam *M. lem* salutaverit ut & *caudivolvulum*, textu generi *Melis* inserit & in nota expressis verbis, verum esse *viverram* dixit; vide spicil. Zool. XIV. p. 26. ubi ait (in textu) hisce utique (*Nasue & Naricæ*) suillo rostro simillimam *MELEM tetradactylam* & singularem in hoc genere *M. caudivolvolum* etc. & in nota (c) est enim (*M. caudivolvula*) vera *viverra mitissimæ* ut *tetradactyla indolis*. Sint tamen haec pace viri amicissimi Zoologi summi, & quæ tanti, facio dicta.

XIII. MUSTELA. CAPUT: Viverræ. Sed aures breviores; Lingua læviuscula.

CORPUS: gracile, vellus laxum tenerius, cauda Viverris brevior.

Barbara. 1. *M. atra*, collo subtus maculâ albâ triloba. LINN. Syst. 12. p. 67. 4. *Marte de la Guyane*. The Guyana Weezel PENN. quadr. p. 215.
Habitat in *Brasilia, Gujania*.

† Galera. 2. *M. tota fusca*, auribus subnudis appressis BROWNE Jam. tab. 29. 1. *Vansire* BUFF. XIII. tab. 21. SCHREB. Zaugh. III. tab. 135. *Madagascar Weesel*. PENN. quadr. p. 329. 203.
Habitat in *Madagascar, Guinea*.

† *Canadensis. 3. *M. corpore fulvo nigricante macula alba. Pekan* BUFF. XIII. tab. 42. SCHREB. III. tab. 134. *Pekan Weesel*, PENN. quadr. p. 331. 204.

β. Vison BUFF. XIII. tab. 43. fusca. SCHREB.
Zaugth. III. tab. 134.
 Habitat in *America boreali*.

* Martes. 4. M. corpore fulvo nigricante, gula flava LINN.
 12. p. 67. 6. *la Marte* BUFF. VIII. tab. 22.
Pine Weasel. PENN. quadr. p. 321. n. 200.
 Habitat in *Europa*.

† * Foina. 5. M. corpore fulvo nigricante gula alba. *La Fouine* BUFF. VII. tab. 18. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 129. *The Martin.* PENN. quadr. p. 320. n. 199.
 Habitat in *Europa*.

† Mephitis. 6. M. albo nigroque varia (*Viverra* ERXLEB. p. 492. 8.) *Zorille* BUFF. XIII. tab. 41. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 123. *The Zorille Weasel.* PENN. quadr. p. 344. n. 319.
 Habitat in *America australi*.

† Sarmatica. 7. M. ferruginea, flavo maculata, gula pectore & abdomine atris. *Tiger-Jetis* PALL. itin. I. p. 175. 454. *Spicil. Zool.* XIV. tab. 4. f. 1. *Sarmatian Weasel.* PENN. quadr. 317. n. 196. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 317.
 Habitat in *Polonia, Russia, Asia boreali*.

* Iltis. 8. M. flavo nigricans, ore auricularumque apicibus albis LINN. 12. p. 67. 7. *le Putois* BUFF. VII. tab. 23. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 31. *the Fitchet Weasel.* PENN. quadr. p. 316. n. 195.
 Habitat in *Europa, Asia*.

* Furo. 9. M. corpore pallidé flavo pedibus, oculis rubicundis LINN. 12. p. 68. 8. *le Furet Putois* BUFF. VII. 26. 325. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 133. *the Ferret* PENN. quadr. p. 319. 198.
 Habitat in *Hispania*.

† Sibirica. 10. M. narium septo nudo, producto, corpore fulvo rufo, rostro nigro, albo punctato. PALL.
 F 4 itin.

MUSTELA.

itin. II. p. 701. *spicil. Zool. tab. 4. 2. le Choroc Siberian Weesel* PENN. *quadr. 318. 197.*
Habitat in *Siberia*.

† * Erminea. 11. M. auricularum marginibus albis, caudae apice nigro. *l'Hermine ou le Roselet* BUFF. VII. *tab. 29. 2. tab. 31. 1. SCHREB. tab. 137.*
β. Stoat. PENN. *quadr. p. 314. n. 193.*
Habitat in *Europa, Asia, America, boreali,*

β. Mustela nivalis LINN. 12. p. 69. 11. eadem mihi videtur.

* Zibellina. 12. M. obscuré fulva, gutture cinereo. LINN.
12. p. 68. 9. PALLAS *spicil. XIV. tab. 3. la Zibelline* BUFF. XIII. *The Sable.* PENN. *quadr. p. 322.*
Habitat in *Asia, Septentrionali, Tataria.*

† Melanoryncha. 13. M. naso nigro, facie cinerea, corpore atro, lateribus fuscis. cl. PENNANTI ERX-LEBEN p. 470. ZIMMERM. *Zool. geogr. II. p. 310. n. 208. Fischer Weesel* PENN. *quadr. p. 328. n. 202.*
Habitat — —

† Flavigula. 14. M. atra, mento, genisque albis, gula citrina dorso, abdomineque flavis, *la gorge dorée White-cheeked Weesel.* PENN. *quadr. p. 331. n. 206.*
Habitat — —

O B S E R V A T I O N E S.

1. Hocce genus viverris affine, pedes habet breviores, trunco curvato procedit, scandit arbores: intestina viverris breviora.
2. An ne *Mustela barbara* (1) & *galera* (2) *Vansire* BUFFONII modo varietates sunt dubito *Pekan* & *Vison* BUFFONII sub nomine canadensis conjunxi; quum ipse cl. BUFFONIUS eas varietates esse credat ut & Marten sylvaticam cum domestiço.

3. Sas-

3. Sarmaticam Mustelam a PALLASSIO graphicè descriptam illius nutu interposui *Mephiti* & *Putorio*; post Bradypum didactylum, maximo gaudet costarum numero; septendecim costas enim numeravit PALLAS: animal ferox vix cicurandum, catulos oculatos, validosque parit.
 Furonem maculatum BUFFONII (*Furet putois*) non ci-tavi, quippe Furones colore mirè varient. *Zibellinæ* historiam plenariam dedit PALLAS.
4. Vulgaris Mustela, veteribus nota a PLINIO jam citatur Lib. 29. c. 4. forsan gale.
5. Siberieam Mustelam celeb PALLAS inter multa alia rariora primus descripsit antea vix nota.
6. Gens hæc fœtens, avibusque domesticis infesta, tamen pelle valet, quibusdam pretiosissima, ut *Zibellinæ*, *Ermineæ*, *Melanorynchæ*, quæ auro cariores, ceterorum viliores, quamvis, nihilominus Russis Polonisque in mercatura veniunt.

XIV. FELIS. CAPUT: rotundum os vibrissatum
Lingua retrorsum scabra.

CORPUS longum plerisque maculatum, *cauda longa cylindrica.*
Pedes: digitæ antici quatuor; postici quinque lingues retractiles.

* Leo. 1. F. cauda elongata, corpore helvolo. LINN. *syst.*
 12. p. 60. 1. *Lion.* BUFF. IX. tab. 1. 2. SCHREB.
Zaugth. III. tab. 77. A. & B. optimæ. *The Lion*
 PENN. *quadr.* p. 254.
 Habitat in *Africa*, in *Asia*.

* Tigris. 2. F. cauda elongata, maculis virgatis. LINN. 12.
 p. 61. 2. *Tigre* BUFF. IX. tab. 9. SCHREB. *Zaugth.*
 tab. 98. *The Tiger.* PENN. *quadr.* p. 257.
 Habitat in *Asia*, *Malaber*, *Coromandel*, *Ceylon*,
Bengale, *Pegu* etc. atque ad 47° . Boream ver-
 sus. ZIMMERM.

* Pardus. 3. F. cauda elongata, corpore fulvo, maculis an-
 nularibus centro notalis, nigris. *La Panthere*
 F 5 BUFF.

FELIS.

BUEF. IX. tab. II. 12. SCHREB. Zaugth. tab. 99.
The Panther PENN. quadr.

Habitat in *Barbaria*, *Guinea*, *Congo*, *Abyssinia* ad
Caput bon. Sp.

† *Panthera*. 4. F. cauda elongata, corpore albido, maculis
irregularibus nigris. ERXLEB. p. 508. *Onça* BUFF.
IX. tab. 13. SCHREB. Zaugth. tab. 100.
Habitat in *Asia*, & boreali, *Persia*, *China*.

† * *Leopardus*. 5. F. cauda mediocri, corpore flavo fusco,
maculis sub coadunatis nigris. ERXLEB. p.
509. *le Leopard*. BUFF. tab. IX. p. 14. SCHRE-
BER Zaugth. tab. 101. *The Leopard* PENN.
quadr.
Habitat in *Barbaria*, *Senegal*, usque ad *Cap.*
b. Sp.

Jubata. 6. F. cauda mediocri, corpore fulvo, maculis nigris;
collo jubato. ERXLEB. p. 510. *le Guepard* BUFF.
p. 249. 254. *le Jaguar* suppl. tab. 37. *Hanping*
Leopard, PENN. quadr. p. 264. tab. 30. f. 1.
SCHREB. Zaugth. tab. 105.
Habitat in *India* ad *Cap. b. Sp.*
Animal, mite. ad capiendas *Antilopes* inservit.

* Concolor. 7. F. cauda mediocri corpore immaculato. LINN.
mautissa. II. p. 522. *le couguar* BUFF. IX. tab. 29.
The Puma PENN. quadr. 269. 160. SCHREB.
Zaugth. tab. 104.
Habitat in *Mexico*, *Callifornia*, *Terraferma*, *Chili*.

† Nigra. 8. F. cauda elongata corpore nigro, labiis albis
ERXLEB. p. 513. *Couguar noir*. BUFF. suppl. III.
tab. 42. SCHREB. Zaugth. tab. 104. *B. Jaguer*
PENN. quadr. 161. tab. 30. 2. fig. bona.
Habitat in *Brasilia* rarum animal, ferocissimum.

Onça. 9. F. cauda subelongata, corpore fusco luteo ocellis
nigris, rotundato angulatis, medio flavis. ERXLEB.
p. 513. LINN. 12. p. 61. n. 4. *Jaguar*. BUFF. IX.
tab. 18. SEHREB. tab. 102. *The Brasilian Panther*.
PENN.

PENN. *quadr.* p. 266. n. 185 tab. 31. 1. fig. bona.
Habitat in *America*.

* Pardalis. 10. F. cauda elongata, corpore fusco, maculis ocellaribus elongatis. ERXLEB. p. 515. LINN. 12. p. 62. 5. Ocelot BUFF. XIII. p. 35. 36. SCHREB. Zaugh. III. tab. 103. *The Mexican Panther.* PENN. *quadr.* p. 267. n. 157. tab. 31. f. 2.

Habitat in *America*.

† Tigrina. 11. F. cauda elongata, corpore fulvo, nigro striato maculatoque, subtus albido. ERXLEB. p. 517. Margay BUFF. XIII. tab. 37. SCHREB. Zaugh. III. tab. 106. *The Cayenne Cat.* PENN. *quadr.* p. 271. n. 163.

Habitat in *Mexico, Antilles, Gujaua, Brasilia, Marignon.*

† * Serval. 12. F. cauda sub abbreviata, corpore supra fusco, maculis nigris, abdomine orbitisque albis. ERXL. p. 523. Serval BUFF. XIII. tab. 35. SCHREB. Zaugh. III. tab. 108. Serval PENN. *quadr.* 278. n. 169.

Habitat in *Malabar, Tibeth. Cap. b. Sp.*
Ferox non domandum.

* Lynx. 13. F. cauda brevi apice atra, auriculis apice barbatis, corpore maculato. ERXLEB. p. 525. 15. LINN. 12. p. 62. 7. Lynx BUFF. IX. tab. 21. SCHREB. Zaugh. III. tab. 106. Lynx PENN. *quadr.* p. 279. n. 170.

Habitat in *Borealibus, Europa, Asiae, America.*

† Manul. 14. F. cauda longa annulata, apice nigra, habitu Lynceo corpore immaculato. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 265. n. 157. le caracal. Manul PALL. itin. p. 692. 2.

Habitat in *Mongolia.*

Hunc varietatem Lyncis credit PENNANTUS.

† Chaus. 15. F. cauda sub a breviata apice annulata corpore fusco immaculato. ZIMMERM. Geogr. Zool. II. p. 266. n. 159. le Chaus GULDENSTADT comment.

Pe-

Petrop. xx. tab. 14. Kirmischak SCHREB. Zaugh^h
tab. 110. B.
Habitat in Ruffia.

† Caracal. 16. F. cauda sub abbreviata, auriculis apice barbatis; corpore immaculato rufo fusco. ERXL. p. 524. n. 14. le Caracal. BUFF. ix. tab. 24. SCHREB. tab. 110. Siyagusch. EDW. posthum. Persian Lynx PENN. quadr. p. 283. n. 173. tab. 32. 2.
Habitat in Persia.

† Catus. 17. cauda elongata annulata; corpore maculato vel striato. Striis dorsi longitudinales, lateralibus spiralibus. ERXLEB. p. 518.

α. Ferus, griseus, nigro guttatus. SCHREB. Zaugh. tab. 107.
* β. Domesticus, colore varians.
* γ. Cinereus. Chat des Chartreux. BUFF. vi. tab. 4.
* δ. Maculatus, albo, fulvo, nigroque varius. Chat d'Espagne, BUFF. vi. 3. the Tortoise Shellcat PENNANT.
ε. Angorensis. Chat d'Angora. BUFF. vi. p. 267. 5.
ζ. Japonensis, cauda subbrevi auribus pendulis. VOSMAER monogr.
Habitat in Japonia.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus hoc ferox, rapax, crudele, pro maxima parte fylvas Africæ & Asie calidioris inhabitans. Pele pulcerima eximum, inde magnum mercaturæ objectum.
2. Secundum omnes systematicos, LINNÆUM secutos Leo Catorum agmen dicit, an jure dubito, & jam BUFFONIUS negavit; & certe nihil cum catis commune habet, nulli collum crinitum, nulli cauda floccosa, non retrahit ungues incedens Leo; observante D'AUBENTONIO; generofus, atque grati animi longe a moribus Tigridum Catorumque abest; nec cum alio, illius genus.

neris, animale coit; ens itaque sui generis; ne tamen, solus tantis in arte viris obstatem, atque novarum rerum actor haberer, *Leouem* invitus catis adnumeravi. Olim *Leo* minus quam hodie rarus, Romani enim centenos simul in Theatro, populo ostenderunt.

3. *Tigris* cattis habitu, & moribus magis accedit, Leone rario, & ille olim magna copia Romæ adductus in populi recreationem. (Vid PLIN. Lib. VIII. c. 4. 17. 18.) solita sua eloquentia eum eleganter descripsit BUFFONIUS ejus icon satis bona; Pellis ejus Chinensibus corus, in Europa raro advenitur, nec multi pretii.
4. *Pardus*. ($\pi\alpha\rho\delta\alpha\lambda\iota\varsigma$ Græcorum ARIST. ÆLIAN. OPP.) a pardali Zoologorum (. 10.) qui ocelot BUFFONII, probe distinguendus; ut & à *Leopardo* (quo cum confundit auctor DICTIONN. des anim. II. p. 611.) animal crudele, enormes Tigridis saltus adæquans. Vide BUFFONIUM. Edulis ejus caro, Pellis magni pretii, quamvis plus ad luxum, quam ad verum usum inserviat.
4. Icon PENNANTI sine juba animal pronuntiat ut & icon BUFFONII, jubatum tamen dicit ERXLEBENIUS, forsitan ex mala KOLBI iconē (quem hunc ad manū non habeo), nec est *Tigris crispa* BRISSONII, uti statuit ERXLEBEN.
6. Præter citatas atque notas catorum species cl. ZIMERMANNUS quasdam obscuras species describit, ut primo *catus capensis*, qui varietas *cati feri* videtur 2. *Leopardus minor* varietas *Leopardi* 3. *Catus Japonensis brevicauda* quæ ad varietatem *cati* pertinet.

XV. HYÆNA. CAPUT: rotundum aures rotundæ.

CORPUS: collo & dorso anteriore jubato.

Pedes tetradactyli.

Folliculus supra anum.

Striata. 1. cauda recta, floccosa; pilis cervicis erectis, auriculis nudis, corpore striato. LINN. syst. 12. p. 58. 3. Hyæna BUFF. IX. tab. 25. *The striped Hyæna*. PENN. quadr. p. 250. n. 149.

Ha-

HYÆNA.

Habitat in *Syria*, *Perſia*, *Barbaria* ad montes *Altai-*
cas, *Caucasum*.

† * **Crocuta.** 2. H. cauda pilosa fusca, corpore maculis ni-
gris, rostro productiore ERXLEB. p. 578. 16.
Hyæna tachetée. *The spotted Hyæna* PENN.
quadr. 552. n. 150. tab. 29, 2. icon bona.
Habitat in *Guinea*, *Ethiopia*, ad *Cap. bon. Sp.*

O B S E R V A T I O N E S.

1. Hyænam striatam ad canes retulit LINNÆUS. ad *Mufle-*
las, quibus certe quodammodo accedit, BRISSONIUS.
Primus a canibus avulsit PENNANTUS in *synopst*, *Qua-*
drupedum p. 161. dein b. ERXLEB. *syst. mammal.*
tamen cum cane conjunxit, a quo tamen multis titulis
discrepat, dentibus solis conveniens, sed rostrum, ju-
ba, palmisque tetradactylis, differt.
2. Non est *Jackal*, uti creditit BUFFONIUS, fide BOS-
MANNI.
3. Genus hoc crudele; gulosum, & ipsa cadavera vorans:
Hyæna & veteribus nota, (vid. PLIN. *Hist. Natur.*
VIII. c. 30. IX. 37. XXVIII. 8. etc.)

Hyænam potius suisse, quam ursum, qui pueros *Elifant*
eridentes devoravit i Reg. cap. 2. vs. 23. 24. Verosi-
mile mihi videtur, cum Hyæna pueros valde appetat.
& eos a latere perentum sub jove pluvio dormientium
rapiat, secundum celeb. NIEBUHR. *Ursus* e contra
hominem non adoritur nisi lacefstitus, præterea, no-
men Arabicum *Dabba*, quod hyænam denotat, facile
cum *Dubb* confunditur, quo *Ursus* ab *Arabis* fa-
luntatur.

XVI. CANIS. CAPUT: oblongum, *Rostrum*, porrectum, vel obtusum. *Dentes* primores lobati, *laniarii* maiores incurvati.

Pedes digitati, digitis anticis quinque posticis quatuor, *ungues* parum curvi.

*Lupus. 1. C. cauda incurva, oculis obliquis. LINN. 12. p. 58. 2. le Loup. BUFF. VII. tab. 1. SCHREB. Zaugh. III. tab. 88. tab. 81. (Caput) *The Wolf* PENN. quadr.

Habitat ubique, non tamen intra circulum arcticum, nec ab Anno 800. p. Chr. in *Brittannia*.

Aureus. 2. C. cauda recta; corpore pallide fulvo. LINN. 12. p. 57. 7. *Chacal*. BUFF. tom. XXVIII. p. 40. edit 12. SCHREB. Zaugh. tab. 94. *The Sackall* PENN. quadr. p. 242.

Habitat in *Oriente, India, Orientali*.

Familiaris. 3. C. cauda sinistrorum curvata LINN. 12. p. 38. n. 1. le Chien SCHREB. Zaugh.

* α . C. domesticus auriculis erectis: cauda subtus lanata LINN. *Chien de berger*. BUFF. V. p. 28. *Shepherds Dog*. PENN. quadr. 222. I.
.. Canis Lupus. BUFF. V. tab. 29.
.. Canis Sibiricus ibid. tab. 30.

β . C. venaticus fagax, rostro producto, auribus pendulis. *Chien Courant*. BUFF. tab. 32.
. Pantherinus. *le braque*. BUFF. V. tab. 33.

.. Dalmaticus. *Braque de Bengale* BUFF. V. tab. 34.

... Vertagus. LINN. amœnit. acad, IV. p. 47. n. 8. *Basset a jambes tortes* BUFF. V. tab. 35.

.... Canis aquaticus. LINN. p. 57. *grand Barbet*. BUFF. V. taq. 37.

γ . C. avicularis LINN. auribus pendulis pilo longo.
. Me-

CANIS.

. Melitensis pilis brevioribus. LINN. *Gredini*.
BUFF. v. tab. 39. 1. *King Charles Dog*.
PENN.

.. Pyramus * niger extrenitatibus luteis. *Pyrame* BUFF. v. tab. 39. 2.

... Melitaeus *Bichon* BUFF. v. tab. 40. 1.

♂. C. auribus brevibus pendulis, corpore pedibusque longioribus.

. Custos. *Martin* BUFF. v. tab. 25.

.. Grajus. *Levrier*. BUFF. v. tab. 27.

... Danicus. *le grand Danois* BUFF. v. tab. 26.

.... Molossius. LINN. p. 57. *Dogue de forte race*.
BUFF. v. tab. 45. *Mastif anglis*.

ε. auribus brevibus pendulis, corpore breviore,
toroso, pedibus brevioribus.

. Ferox. *Naso brevi*, maxille inferiore longiore.
Dogue BUFF. v. tab. 43. *Bulldogg*. PENNANT.

.. Fricator. LINN. multo minor præcedente, cui
simillimus *Doguin* BUFF. v. tab. 44. *Pugdog*
PENNANT.

... Spurius. *le Roquet*. BUFF. v. tab. 41. 2.

.... Turcicus, nudus. *Chien Turc*. BUFF. tab. 40.

Mexicanus. 4. C. cauda deslexa lœvi corpore cinereo fasciis
fuscis, maculisque fulvis. LINN. 12. p. 60.

Loup de Mexique. BUFF. xv. p. 149. *Mexican*
Dog. PENN. quadr. p. 233. 138.

Habitat in *Mexico*.

† Mesomelas. 5. C. cauda recta, corpore ferrugineo, fascia
dorsali nigra. *le Chacal*. BUFF. XIII. p. 268.
SCHREB. *Zaugh*. III. tab. 95

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

* Vulpes. 6. cauda recta apice albo vel nigro. LINN. 12. p.
59. 4. Renard BUFF. VII. tab. 4. *Fox*. PENN.
quadr. p. 234. 139.

Habitat in *Europa*, *Asia*, *Boreali*, *Africa*. Hujus
varietates sunt.

v. Canis Alopex. LINN. caudæ apice nigro.

β. Vul-

♂. *Vulpes crucigera le Renard croisé* BUFF. XIII.
p. 276.

† ♀. *Vulpes totus ater*. *Loup noir*. BUFF. IX. 40.

† ♂. *Pensylvanicus*. *naso acutiore, ex nigro, ruflo, cinereo mixtus*. *Cauda subtus luteo rufa*. *Branz fox* PENN. quadr. p. 235.

† ♂. *Karagan*. *Cauda recta corpore griseo*. PALL. itin. I. p. 299. 234.

Habitat in desertis *Calmuccis & Kirgiscis*.

† Zerda. 7. *C. auriculis maximis acutis, cauda attenuata, apice nigra*. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 247. 141. *Animal anonyme*. BUFF. suppl. III. tab. 19. *vulpes minimus Zaarchensis* Schwed. Abh. 1777. tab. 6. *Zerda* PENN. quadr. pag. 248. tab. 28.

Habitat in *Barbaria*.

Corsac. 8. *C. cauda recta fulva, basi, apiceque nigra*, LINN. 12. p. 223. *Isatis* BUFF. suppl. III. tab. 17. *perperam, Isatis enim sequens*. *Corsac Fox*. PENN. quadr. p. 236. 5. SCHREB. *Zaugth.* tab. 91.

Habitat in — —

Lagopus. 9. *C. cauda recta palmis, plantisque pilosis*. LINN. p. 59. 6. *Isatis* BUFF. XIII. p. 272. *Arctic Fox*. PENN. quadr. p. 238. 140.

Habitat ad *Polum arcticum*.

† Griseus. 10. *cauda recta corpore cinereo argenteo, collo lateribus fulvo*. ERXLEB. p. 576. SCHREB. *Zaugth.* tab. 92. *Grey Fox*. PENN. quadr. 241. 142.

† ♂. *Canis virginianus, cauda recta, corpore cinereo albicante*. *le Renard gris*. CATESB. Carol. II. tab. 78.

Habitat in *Virginia, Carolina*.

Thous. 11. *C. cauda deflexa laevi, corpore subgriseo, subtus albo*. LINN. 12. p. 60. *Renard de Surinam, Surinam Dog*. PENN. quadr. p. 147.

Habitat *Surinami*.

OBSERVATIONES

1. Nullum mammalium genus difficilius determinandum, mire enim inter se differunt veneris vagæ producta, ita ut nihil stabile nihil certi, ex tanta specierum faragine statui possit.
2. Canem familiarem, Lupum, (Hyænam forsan, & Lupum aureum pro stemmatis originem agnoscere, solitâ suâ folerua, atque Ingenii acumine extra dubium posuit cl. PALLAS inde eos speciebus canum ante posui.
3. Species familiarium Canum; secundum cl. PENNANTIE methodum dividere consultum duxi. Nec dubios, atque ex vulgivago coitu notos adnotavi.
Et cum, uti recte monet amicissimus ZIMMERMAN, nullum post hominem animal, magis per orbem dispersum sit, nulli certam patriam in qua habitat addixi.
4. Chacal sive *C. aureus*, in Oriente degens, mihi *Vulpes* ille videtur, de quo in sacris litteris saepius mention, fit, præsertim ubi Simsonus eorum ope Philistinorum auralia combusit; *Jud.* XV. vs. 4. & ubi Salomo in *Cantico Canticorum.* Cap. . eos, vitum, uvulas devorare, dixit; estque ille Θως ARISTOT. II. c. 19. n. 150. PLIN. VIII. 34. x. 74. itaque veteribus notissimus, cauté distinguendus a Thoo LINN.
5. Canis mexicanus mihi valde dubius, America enim nullius hujus generis patria, forsan olim ex Europa ibi allatus.
6. Vulpium quatuor citatas varietates, a quibusdam Zoologis pro speciebus habentur, forsan *Vulpis* ater species, ceteri sibi nimis propinquai, hujus pellis carissima, pretium Mustelæ Zibellinae excedit & aliquando 900 florenis Hollandicis venditur.
III ferarum terrestrium agmen claudunt, *Lutra* enim *Lutreola*, *Phoca*, quæ & hoc certe pertinent, *Aquatilia*.

III. GLIRES.

XVII. LEPUS. CAPUT: auriculæ acutæ (excepto *Lepore alpino*). Labium fissum, rostrum obtusum, vibrissatum.

CORPUS: longum. Cauda brevi vel nulla.

Pedes: digitæ antici quinque postici quatuor.

a. Auriti, Caudati.

*Europæus. 1. L. apice aurium, capite longiorum, cauda que supra atra. PALL. glir. p. 30. LINN. sys. 12. p. 77. 1. Lievre BUFF. VI. tab. 38. *The common Hare*. PENN. quadr. p. 368. n. 241. Habitat in *Europa*, *Asia*, *Japan*, *Ceylon*, *Ægypto*, *Barbaria*.

† Tolai. 2. L. auribus apice nigro marginatis, cauda supra atrâ. PALL. nov. sp. gl. p. 17. *le Tolai. The Baikal Hare*. PENN. quadr. 374. 245. Habitat in *deserto Gobeenſi*.

‡ Variabilis. 3. L. apice aurium atro, cauda concolore alba. PALL. nov. spec. glir. p. 30. *Lievre du Nord* *The varying Hare*. PENN. quadr. p. 370. tab. 40. 1. *Britisch Zool.* tab. 47. Habitat in *Scandinavia*, *Lapponia*, *Fennonia*, *Russia*, *Siberia*, *Scotia*, *Lironia*.

† Hudsonius. 4. L. apice aurium caudaque cinereis. PALL. nov. sp. glir. p. 30. *American Hare*. PENN. quadr. 372. 243. *Lievre de la baye d'hudson*. CATESB. append. 1. 38. Habitat in *America*.

Pedes postici, corpore dimidio longioribus.

* Capensis. 5. L. aurium apice griseo margine nudo; cauda rufa. PALL. nov. sp. glir. p. 30. LINN. 12. p. 78. 3. Lievre du Cap. The Cape Hare. PENN. quadr. p. 375. n. 246.
Habitat ad Cap. bon. Sp.

* Tapeti. 7. L. auritus collari albo, cauda nulla. *Lepus Brasiliensis*. LINN. 12. p. 78. 4. Le Tapeti. Brazilian Hare. PENN. quadr. p. 376. n. 247.
Habitat in Brasilia, Mexico.

* Cuniculus. 7. L. auribus apice atris, cauda concolore, cruribus posticis truncо brevioribus. PALL. nov. sp. glir. p. 30. LINN. 12. p. 77. 2. Lapin. BUFF. VI. tab. 51. The Rabbet. PENN. quadr. p. 373. 244.

a. *Angorensis* pilis longis, undularis. *Lapin d'Angora*. BUFF. VI. tab. 53. 54. *Angora Rabbet*. PENN. 374. B.

† β. *Argenteus* pilis ex argenteo griseis, pedibus fuscis. *Le Riche*. BUFF. VI. tab. 52. *The silver haired Rabbet*.

(b) *Reptabundi, ecaudati.*

† Pusillus. 8. L. ecaudatus, fusco griseoque mixtus, auribus subtriangulis, albo marginatis. PALL. nov. sp. glir. pag. 31. tab. I. le petit Lievre. *Caling Hare*. PENN. quadr. p. 380. n. 250.
Habitat ad Kamaram & Samaram ad Volgam usque ad Tanaiti.

† Ogotona. 9. L. ecaudatus griseo pallidus, auribus ovalibus, subacutis, concoloribus. PALL. nov. sp. glir. p. 59. tab. III. *Ogotona Hare*. PENN. quadr. p. 379 n. 249.
Habitat in Mongolia.

† Alpinus. 10. L. ecaudatus rufescens, auriculis rotundatis; plantis fuscis. PALL. nov. sp. glir. p. 45. tab. 2. it.

it. II. p. 701. tab. 4. *Lievre montain. The Alpine Hare.* PENN. quadr. p. 377. 208.
Habitat in *Montibus Altaicis.*

OBSERVATIONS.

1. Genus *Leporinum* dentibus utrinque II. laniariis nullis, ad *glirinum ordinem*, tum & rodendo cortices, ceterisque moribus & vivendi methodo accedere palam est. Ordo haec naturalissima certe, Feris inter & ruminantibus intermedia, mediis tamen desideratur annulus, quo, feris connectitur nec enim figura, nec habitus, nec vivendi methodus, nec anatome partium internarum aliquid Luminis adferunt, ordo haec itaque insulata, donec species intermedia, ordinum genera colligat.
 2. Ante solertissimi PALLASSII detecta, genus pauperum speciebus, sed infatigabilis ille Zoologus, sex novas plate, antea notis addidit; sorsan & plures latent.
 3. *Lepus, hudsonius* an non ad *Dipodes* vel *gerboas* pertineat ob longitudinem pedum posteriorum valde dubito, sed cum nec animal, nec ejus delineationem viderim, nihil affirmo.
 4. Cuniculus multo facilius cognoscitur, quam determinatur, sola crurum brevitas; character distinctivus.
 5. Cuniculum argenteum vellere mutantem, ex EDWARDSII picturis pro varietate singulari, citavit PENNANTUS nomine *Hooded Rabbet*, qui *Russiam* patriam ad gnoscit, sed cum ipse cl. PALLAS, nesciat, quid sibi velit; hacce varietate in *Russia* haud nota hanc neglexi,
 6. Ex omnibus citatis speciebus veteres nullam praeter Leporem Europaeum & cuniculum, norunt, ille Romanis in deliciis; inter *Quadrupedes gloria prima* *Lepus* ait MARTIALIS, qui & aliis locis Leporem celebrat.
- Pellis Leporis in mercatura hodie magni usus, ob pilos, qui intermescerunt pilis castoris, praesertim in pileis illis rotundis Philantropinis dictis, cujus margines ex illis pilis, conficiuntur; quibus se decorant pueræ & juvenes ut femina comiti.

XVIII. CAVIA. CAPUT : rotundum , aures parvæ , rotundæ , rostrum productum , mystaces ad os . CORPUS : obesum , longiusculum . Cauda nulla , vel brevis . Pedes : digitis anticis quatuor , posticis tribus .

Capybara. 1. C. plantis palmatis , cauda nulla- (*Sus Hydrochærus*) LINN. 12. p. 103. 4. Cabiai. BUFF. XII. tab. 49. *Capibara Cary.* PENN. quadr. p. 360. n. 231.

Habitat in America.

*Paça. 2. C. cauda tenuissima pedibus pentadactylis , lateribus flavescenti lineatis . LINN. 12. p. 81. Paça. BUFF X. tab. 43. *Spotted, Cary.* PENN. quadr. p. 363. n. 235.

Habitat in America.

† Patagonica. 3. C. cauda brevissima , obtusa , nuda ; labium fissum , aures longiusculæ , corpore cinereo : pedum digiti 4—3. *Cavia des Patagons, Patagonian Cary.* PENN. quadr. p. 363. tab. 39.

Habitat in Patagonia.

*Aguti. 4. C. caudata , corpore ex ruflo fusco , abdomine flavescente . LINN. 12. p. 80. Agouti. BUFF. VIII. tab. 50. SCHREB. Zaugh. tab. 172. *The long nosed Cary.* PENN. quadr. p. 364. 236.

Habitat in Brasilia , Guiana.

†*Acouchy. 5. C. caudata , corpore olivaceo . ERXLEB. p. Akouchy BUFF. xv. suppl. vi. p. 19. tab. 3. edit 12°. *Olive Cary.* PENN. quadr. p. 365. n. 237.

Habitat in Brasilia , Guiana.

† Ape.

{ Aperea. 6. C. ecaudata corpore ex cinereo rufo, *Aperea*. BUFF. xv. p. 160. *Rock Cavy*, PENN. *quadr.* 362. 233. Perperam.

Habitat in *Brasilia*.

* Cobaya. 7. C. ecaudata corpore ex nigro, fulvo, albo vario. LINN. 12. p. 79. I. BUFF. viii. tab. I. EDW. *glean.* tab. 294. *The restless Cavy*. PENN. *quadr.* p. 361. 232.

Habitat in *Guinea*.

* Bicolor. 8. caudata, auribus nudis, corpore supra rufo, setoso, infra albo, pedibus longioribus. *Mus Leporinus*. LINN. 12. p. 80. 3. *Javan Hare*. CATESB. *Append.* tab. 18. *Cavie Lievre*.

Habitat in *Americæ meridionalis Calidiora*.

† * Capensis. 9. C. ecaudata, auribus ovalibus vellere tectis, rostro conico, abdomine ventricoso, dorso setis longioribus PALL. *spicil.* II. p. 16. tab. 2. *Klipdas* VOSM. *monogr.* *Marmotte du Cap*. BUFF. *suppl.* III. tab. 29. *The Cape Cavy*. PENN. *quadr.* p. 366. n. 239.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

O B S E R V A T I O N E S.

1. Caviarum genus, evidentissimum in naturali glirium ordine; a BRISSONIO cuniculis inter mixtum.

Linnæus *Cavia* muribus partim, partim Leporibus imo Suibus intermiscat, quamvis KLEINIUS jam genus distinxerat, cl. ERXLEBEN, PENNANT, ZIMMERMAN, KLEINIUM, PALLASSIUMQUE secuti proprium genus nomine *cavie* seu potius *Savie* condiderunt. — Pluræque species Americanæ.

2. *Caviam Capyaram* (1) suem perperam dixit LINNÆUS, cum *Tapiro* ab eo toto cœlo omnibusque numeris differente conjunxit ERXLEBEN; *Tapiro* enim primores 10. *Capybaræ* 2. *Tapiro* pedes regulati; palmati unguis *Capybaræ*; habitus, omnino differens, confer, iconem *Tapiri* BUFF, xi. tab. 43.

CAVIA.

- cum *Capybara* tab. 49. Tomi. XII. loco proprio starz
jussit PENNANTUS ut & ZIMMERMANNUS.
3. *Cavia Patagonica*, media inter *Lepores* & *Cavias* la-
bio fisso, auribusque lanceolatis, sed dentibus ungu-
busque *Cavia*. Soli PENNANTO ex Museo D. ASTHON
LEVERS nota atque depicta.
 4. *Pacam*, *Agouti*, *Acouchy*, *Apeream*, solum modo va-
rietas *Paca* esse crediderim facile, vidi enim *Pacam*
serie macularum pallidarum vix visibili, ita ut an *Pa-
ca* an *Agouti* erat, facile dubitares, *Apeream* non
novi, nisi ex BUFFONIONA descriptione, *Acouchy*, ab
Agouti haud differt nisi colore; cui vix fidendum, ut
pote facile varians sexu vietu, nutritione, loco.
 5. Nomen triviale *Javanensis*, octavæ speciei, male ad
plicavit CATESBY qui id animal ipse in patria ejus vidit
atque graphicè depinxit, Vir enim cl. J. G. LOTEN
Ceylonæ olim Gubernator prudentissimus & ob innu-
mera quæ ad historiam naturalem promovendam præ-
stítit officia omnibus Zoologis carus, cl. PENNANTO
mibiique affirmavit, se nuncquam id animal in *India*,
Orientali vidisse; America est Patria: ego eam
bicolorē dixi.
 6. Ultima species, *Capensis* nempe *Caviarum* huc usque
cognitarum agmen claudit, novum inde genus struxit
celeb. SCHREBER quod *Hyrax* dixit. Certe quibusdam
nominibus a *Caviis* separand, dentes inferiores pri-
miores illi quatuor, Pedes pentadactyli, corpus, fetis
longis in cervice, dorso, lateribus conspicua; ha-
biens tamen, moribus, vivendi Methodo caviam men-
titur.
 7. Porro *Caviae* genus Muribus, Leporibusque adeo affi-
ne; ut LIMNEUM *Cavia* in ambobus generibus id
distribuisse non miror.

XIX. MUS. CAPUT: varium in variis, semper tamen os vibrissatum. Dentes primores utrinque duo cuneati. Molares tres.

CORPUS: omnibus, subventricosum, cauda varia in variis, horizontalis.

Pedes: anteriores tetradactyli, unguicula pollicari: posteriores pentadactyli.

a. *Mures soporosi.*

* Marmota. 1. M. capite gibbo, auriculato, cauda villofa, brevi: palmis tetradactylis, corpore fusco, subtus rufescente. PALL. nov. sp. gl. p. 74. I. LINN. 12. p. 81. 7. *Marmotte*. BUFF. VIII. tab. 28. *Alpin Marmot*. PENN. quadr. 369. n. 258.
Habitat in Alpibus Helveticit.

Monax. 2. M. capite gibbo, auriculato, rostro cœrulescente, cauda longiuscula; villofa; palmis tetradactylis corpore gryseo. PALL. nov. sp. glir. p. 74. LINN. 12 p. 81. 8, *le monax*. *Bahamy Cony*. CATESBY Carol. 4. tab. 79. EDW. birds III. 104. *Maryland Marinot*. PENN. quadr. 398. 260.
Habitat in *Marilandia*, *Virginia*, *Carolina*.

† Arctomys. 3. M. capite gibbo auriculato; cauda brevi, villofa, palmarum ungue pollicari; corpore gryseo subtus luteo. PALL. nov. sp. gl. p. 97. tab. v. *Bobak*. BUFF. XIII. p. 136. tab. 18. mala. *Bobak Marmot*. PENN. quadr. 399. 262.
Habitat in *Polonia*, *Russia australi*, *Ukrania* ad *Boryslhinen*, *Don*, *Wolgam*.

† * Empetra. 4. M. capite gibbo auriculato; cauda villofa brevi, palmis tetradactylis; corpore supra vario, subtus ruso. PALL. nov. sp. glir. p. 75.

4. *Quebek Marmot.* PENN. *quadr.* p. 397.
295. tab. 41. 2. bona.

Habitat in *America Septentrionali.*

**Citellus.* 5. *M. capite gibbo, auriculis nullis; cauda brevi, villosa, corpore vario.* PALL. *nov. sp. glir.*
p. 119. tab. 6. 7. LINN. 12. p. 80. 4. *Zizel BUFF.*
Earles Marmot. PENN. *quadr.* p. 403. n. 263.
tab. 42. 1. fig. bon. *Synopsis* 276. fig. *pessima.*

Habitat in *Siberia, Kamtschatka.*

(b) *Subterranei.*

† **Typhlus.* 6. *M. ecaudatus, palmis pentadactylis, incisoribus supra infraque latis, oculis, auriculisve nullis.* PALL. *nov. sp. glir.* p. 154. tab. 7.
l'Aveugle, blind mole Rat. PENN. *quadr.* p.
469. 331. tab. 47. 1.

Habitat inter *Tanaïm & Wolgam.*

† *Gondi.* 7. *M. cauda brevi villosa; auribus truncatis dentibus incisoribus supra cuneatis, infra acuminatis corpore testaceo.* PENN. *quadr.* p. 405. n. 264.
ZIMMERM. *geogr. Zool. le Gondi.*

Habitat in *Barbaria.*

† *Aspalax.* 8. *M. brachyurus: incisoribus supra infraque cuneatis; nullis; unguibus palmarum elongatis.* PALL.
glir. nov. sp. p. 165. tab. x. l'Aspalax. Dayurian Rat. PENN. *quadr.* p. 471. 332.

Habitat in *Dayuria.*

† **Capensis.* 9. *M. brachyurus: incisoribus cuneatis, auriculis nullis; palmis pentadactylis ore albo.* PALL.
nov. sp. gl. p. 172. tab. 7. Taupe du Cap.
Journal hist. p. 64. f. 64. Cape Mole rat.
PENN. *quadr.* 473. 334. tab. 47. 3.

α. *Africanus, incisoribus longioribus sulcatis; cauda compressa. African, Mole rat* PENN.
quadr. 472. 333.

Habitant ambo ad *Cap. bon. Sp.*

† *Tal-*

† *Talpinus.* 10. M. brachyrus: fuscus incisoribus supra infraque cuneatis; auriculis nullis, palmis pentadactylis. PALL. nov. sp. glir. p. 176. tab. xi. A. *Talpine Mole rat* PENN. quadr. p. 475. 335. *Souris Sourde*.

Habitat in *Russia, Siberia*.

(c) *MURES CUNICULARII.*

Lemmus. 11. M. brachyurus: auribus vellere brevioribus; palmis pentadactylis, corpore fulvo, nigroque vario, subtus albo. PALL. nov. sp. glir. p. 180. tab. 12. d. B. LINN. 12. p. 80. sp. 5. *le Lemming*. BUFF. XIII. p. 314. *Lemmus*. PENN. quadr. p. 454. n. 417. tab. 42. 2.

Habitat in *Lapponia, Norvegia*.

† *Lagurus.* 12. M. brachyurus: auribus vellere brevioribus, palmis subtetradactylis, corpore cinereo; linea longitudinali nigra. PALL. nov. sp. glir. p. 210. tab. 13. A. *Hare tailed*. PENN. quadr. p. 458. 320. *la courte Queue*.

Habitat ad *Tack, Irtim, Jenisei*.

† *Torquatus.* 13. M. brachyurus: auribus vellere brevioribus; palmis pentadactylis, corpore ferrugineo vario, torque interrupta albida. PALL. nov. sp. glir. p. 206. tab. 11. B. *Ringed Rat*. PENN. quadr. p. 457. n. 318.

Habitat ad *Oby*.

† *Socialis.* 14. M. cauda semiunciali, auriculis orbiculatis brevissimis, palmis subtetradactylis, corpore palido, subtus albido. PALL. nov. sp. glir. p. 218. tab. 13. B. *le Compagnon*. *The Social Rat*. PENN. quadr. p. 459. 329.
Habitat inter *Wolgam & Taik*.

* *Arvalis.* 15. M. cauda unciali: auribus vellere prominulis, palmis sub tetradactylis, corpore fusco. PALL. nov. sp. glir. p. 78. *Campagnol*. BUFF. VII. p. 369. tab. 47. *Mus Terrestris*. LINN. 12. p. 82. n. 10. *Meadow Rat*. PENN. quad. p. 450. 322.

† OECC-

† Oeconomicus. 16. M. cauda subsesquicinali ; auriculis vellere molli latentibus , palmis subtetradactylis , corpore fusco. PALL. nov. sp. glir. p. 225. tab. 14. A. Rat Oeconomico. Oeconomic Rat. PENN. quadr. p. 457. 313.
Habitat ad Kamtscham.

Gregalis. 17. M. cauda subsesquiunciali : auriculis vellere longioribus , palmis subtetradactylis , corpore supra cinerascente. PALL. nov. sp. glir. p. 238. le Souris Siberien. Gregarious Rat. PENN. quadr. 461. 323.
Habitat inter Tmo & Jeniseam.

Rutilus 18. M. cauda unciali , auriculis vellere langioribus palmis subtetradactylis , corpore fulvo , subtus cano. PALL. nov. sp. glir. p. 247. tab. 14. B. le Roux. Mus Gregarius. LINN. p. 84. 16? Red Rat. PENN. quadr. p. 453. 314.
Habitat in Russia.

† Alliarius. 19. M. cauda unciali auribus majusculis , subpilosis ; corpore cinereo ; subtus albido. PALL. nov. sp. glir. p. 252. tab. 14. C. Bulbivore. Garlic Rat. PENN. quadr. p. 453. 315.
Habitat ad Lenam.

† Saxatilis. 20. M. cauda longiuscula , auribus vellere majoribus ; palmis subtetradactylis. PALL. nov. sp. glir. p. 255. tab. 23. B. Rat de Roche. Rock Rat. PENN. quadr.
Habitat in montibus Astragalis.

* Amphibius. 21. M. cauda longitudine dimidia corporis ; auribus vix vellere prominulis . palmis subtetradactylis. PALL. nov. sp. glir. p. 80. n. 20. LINN. 12. p. 82. 11. Rat d'eau. BUFF. VII. tab. 43. Water Rat. PENN. quadr. p. 442. n. 300.

α. Mus paludosus. LINN. mantisf. II. p. 553? ater ille.
Habitat in Europa.

(d)

(d) *Mures buccati.*

**Cricetus.* 22. M. buccis facculifens, corpore subtus aterrimo; cicatricibus lumbaribus detonfis. PALL. nov. sp. glir. p. 83. LINN. 12. p. 182. 9. Hamster. BUFF. XIII. tab. 14. Hamster. PENN. quadr. p. 461. n. 324. tab. 46. 1. (Sat bona icon.) Habitat in *Germania*, *Polonia*, *Ukrania*, *Russia* & *Siberia australi*.

α. Ater ore albo. *Black Hamster.* PENN. quadr. p. 325. tab. 46. 2.
Habitat in *Ceylon*.

†*Accedula.* 23. M. buccis facculiferis; auriculis sinuatis, corpore gryeo subtus albido. PALL. nov. sp. glir. p. 257. tab. 18. A. *Rat du Taik.* Taik Rat. PENN. quadr. p. 465. 326.
Habitat ad *Taik*.

†*Phæus.* 24. M. buccis facculiferis, corpore caudaque fusco cinerascentibus, subtus albis. PALL. nov. sp. glir. p. 261. tab. 15. A. *Rat a moustache.* Phæus. PENN. quadr. p. 466. n. 327.
Habitat in *Astrakan*.

†*Arenarius.* 25. buccis facculiferis; corpore cinereo, lateribus subtusque albo, cauda, pedibusque albis PALL. nov. sp. glir. p. 265. tab. 16. A. *Rat de Sable.* Sand Rat. PENN. quadr. p. 466. n. 328.
Habitat in aranosis *Brrabæ*.

†*Furunculus.* 26. M. buccis facculiferis, corpore supra gryeo, iriga dorsali nigra, subtus albido. PALL. nov. sp. glir. p. 273. tab. 13. B. *le petit larron.* Barata Rat. PENN. quadr. p. 467. n. 330.
Habitat ad *Obium* & *Argunum*.

†*Songarus.* 27. M. buccis facculiferis; dorso cinereo, linea spinali nigra; lateribus albo fuscoqne variis, ven-

ventre albo. PALL. nov. Sp. glir. p. 269. tab. 16. B. Songar Rat. PENN. quadr. p. 467. n. 329.

Habitat in locis siccis arenoso Salinis Barabæ.

(e) *Mures Lethargici.*

* Nitidula. 28. M. cauda longa, subfloccosa corpore rufescente, subtus albo, area oculorum nigra. PALL. nov. sp. glir. p. 83. n. 32. Lerot. BUEF. VIII. tab. 25. *Mus Quercinus* LINN. 12. p. 84. 15. *Sciurus Quercinus*. ERXLEB. syst. p. 432. n. 15. *Garden Dormouze*. PENN. quadr. p. 424. n. 288.

Habitat in Borealibus.

* Avellanarius. 29. M. cauda longa subfloccosa, corpore fulvo, gula alba. PALL. nov. sp. glir. p. 89. 34. LINN. 12. p. 83. 14. *Muscardin* BUFF. VIII. tab. 26. EDW. glean. tab. 266. Common dormouse. PENN. quadr. 425. n. 289.

Habitat in Europa.

† Betulinus. 30. M. cauda longissima nudiuscula, corpore fulvo, fascia dorsali nigra auribus plicatis. PALL. nov. sp. glir. p. 332. tab. 22. 1. Rat de bouleau. Beech Rat. PENN. quadr. 448. 309.

Habitat inter Oby & Jenissa.

† Vagus. 31. M. cauda longissima nudiuscula, corpore cinereo, fascia dorsali nigra, auribus plicatis. PALL. nov. sp. glir. p. 327. tab. 22. 2. le nomade. Wandering Rat. PENN. quadr. p. 447. 308.

Habitat in desertis Tataricis.

* Striatus. 32. M. cauda longiuscula subnuda, corporis striis plurimis paralelis, albo guttatis. PALL. nov. sp. glir. pag. 90. 37. LINN. 12. p. 84. 17. SEBA thes. II. p. 22. f. 2. Rat strié. Oriental Rat. PENN. quadr. p. 445. 304.

Habitat in India & ad Caucasum?

† Tri-

† *Triticus*. 33. M. cauda longiuscula, auribus veilere prominentibus; corpore supra ferrugineo, subtus albo. *Rat du bled.* *Hervet Rat.* PENN. *quadr.* p. 445. 303.

Habitat in *Hampshire anglie.*

Barbarus. 34. M. cauda mediocri, corpore fusco, striis decem pallidis; palmis tridactylis, plantis pentadactylis. LINN. in *additam.* *Barbary Rat.* PENN. *quadr.* 446. 305.

Habitat in *Barbaria.*

† *Mexicanus*. 35. M. cauda longiuscula; capite albo, corpore albido rufo mixto, macula rufa utrinque ad abdomen. *Rat tacheté de Mexique.* SEB. *thes.* I. tab. 45. f. 5. *Mexican Rat.* PENN. *quadr.* p. 446.

Habitat in *Mexico.*

† *Virginianus*. 36. M. auribus acutis, naso nigro; corpore niveo cauda longa. *Rat blanc des champs.* SEB. *thes.* I. tab. 47. f. 4. *Virginian Rat.* PENN. *quadr.* p. 446. 307.

Habitat — — —

(f) *Mures myosuri.*

Piloides. 37. M. cauda longiuscula squamata, truncato obtusa; corpore albido. PALL. *nov. sp. glir.* p. 91. n. 38. *Piloris.* BUFF. X. p. 2. *Musk Cavy.* PENN. *quadr.* p. 367. 240.

Habitat — — —

Caraço. 38. 38. M. cauda longa, squamosa, obtusiuscula; corpore griseo; plantis subsemipalmatis. PALL. *nov. sp. glir.* p. 335. tab. 23. A. le Babillard. *American Rat.* PENN. *quadr.* 441. 299.

Habitat in *America Septentrionali.*

† *Decumanus*. 39. M. cauda longissima squamata, corpore setoso, gryseo subtus albido. PALL. *nov. sp. glir.* p. 91. n. 40. *Surmulot.* BUFF. VIII. tab.

tab. 27. *Brown Rat.* PENN. quadr. p. 439.
n. 298.
Habitat in *Europa.*

Rattus. 40. M. cauda longissima squamosa, corpore atro,
subtus canescente. PALL. nov. sp. *glir.* p. 43. 41,
LINN. 12. p. 83. n. 12. SCHREB. Zaugh. IV.
tab. 179. *Black Rat* PENN. quadr. p. 438. n. 297.
Habitat ubique.

*Sylvaticus. 41. M. cauda longa, squamosa, corpore gry-
geo lutescente, subtus lateribusque abrupte
albo. PALL. nov. sp. *glir.* p. 94. n. 42. LINN.
p. 84. 17. *Fieldmouse.* PENN. quadr. p. 444.
302. *Mulot.* BUFF. VII. tab. 41.
Habitat in *Russia.*

*Musculus. 42. M. cauda longissima squamosa; corpore
fusco subtus cinerascente. PALL. nov. sp. *glir.*
p. 95. n. 43. LINN. 12. p. 83. sp. 13. *Sci-
urus.* BUFF. VII. tab. 39. *Mouse.* PENN. quadr.
p. 443. 301.
Habitat ubique excepto *arctico.*

† Agragrius. 43. M. cauda longa squamosa; corpore lute-
scente, striga dorsali nigra. PALL. nov. sp.
glir. p. 341. tab. 23. A. SCHREB. Zaugh. tab.
182. *Rufic Rat.* PENN. quadr. p. 448. n.
310.
Habitat in *Russia, Siberia.*

† Minutus. 44. M. cauda longa squamosa; corpore supra
ferrugineo, subtus albido. PALL. nov. sp. *glir.*
tab. 24. B. *little Rat.* PENN. quadr. p. 449.
n. 311.
Habitat in *Russia.*

Longipes. 46. M. cauda longa vestita, rufa, corpore ful-
vescente; subtus albo, pedibus posticis majus-
culis pentadactylis. PALL. nov. sp. *glir.* p. 314.
tab. 18. B. LINN. syst. 12. p. 84. 19. *Rat
enjambé.*

† Tu-

† *Tamarieinus*. 47. M. cauda longissima, vestita, fusco annulata, corpore cinerascente subtus albo, PALL. nov. sp. *glir.* p. 322. tab. 19. *le Tamarisc.* *Tamarisc Rat.* PENN. *quadr.* p. 437. n. 296.

Habitat ad Taik.

O B S E R V A T I O N E S.

- i. Genus hoc *Caviis*, *Leporibus*, & *Gerbois* proximum & affine, a Zoologis ante PALLASSIUM & PENNANTIUM haud bene cognitum. ERXLEBENIUS in plura discerpsit, sic mures *soporosos*, & *buccatos* quosdam ut *Marmotam*, *Monacem*, *Cricetum*, *Hamslerum* etc. sub nomine generico GLIRES conjunxit, ex *Mure Capensis* & *Talpinum*, genus *Spalacis* condidit ceteros vi notos, *Mures* dixit, aliam & meliorem intravit palæstram cl. PENNANT, qui sub nomine *Ratti*, totum genus comprehendit, atque dividit in Phalanges, quorum mures *longipedes gerbois* sive *Dipodibus* affines primam efficiunt, hos a latere premit phalanx altera *Murium Myosurorum*, tertiam Phalangem constituunt, *Mures*: *cauda mediocri*; hos sequitur *Brachyuorum* Phalanx, cuius vestigia legunt *mures buccati*, *brachyuri*, qui *Mures talpinos* proxime præcedunt; qui satis ad ordinem Naturæ, genus hoc, cum *soricino* connectunt. Clarissimus vero Zoologus PALLAS cui Historia naturalis universa, & præcipue Zoologia tanta debet, pro ea qua pollet sagacitate, aliam Phalangum distributionem tentavit. Phalanx ei prima continet *mures soporosos*; his, corpus obesum, caput grande, gibbum cauda brevis, villosa, cœcum intestinum ampliatum sopor hybernius. — Altera Phalanx *muribus* constat *Subterraneis*, dentibus primoribus latis, cuneatis, pedibus anticis fossoriis, cauda perbrevi vel nulla; hyeme sorpent. Immediatè sequuntur *Mures cunicularii* capite grandiusculo aurito, dentibus parvis; hyeme vagantes, plerique migratori. — Quartam Phalangem constituunt *Mures Criceti*, quibus corpus breve, ut & artus, caudaque, buccæ faccatae, unde gens illa *mures buccati* dicta, frigus sumnum sustentans. — Quinta Phalanx *Lethargicas* species ele-

gantissimas continet quæ insigniter auritæ atque caudæ, cauda apice floccosa; cruribus posticis longissimis, desultoriis, frigore spondae sextæ denique Phalanx, dat vagabundos Mures, auribus majusculis, cauda nuda, longa, annulis squamata.

Ego tanta viri, in enumerandis speciebus, vestigia secutus sum, sed Mures Lethargicos artubus poslicis longioribus exclusi, atque ad genus sequens retuli, pace enim viri quem tanti facio, dicam: eos capite, auribus, pedibus posticis, ut & anatome satis differre, ut genus peculiare, muribus proxime ad fine condere possint, capite enim & sterno ab illis recedunt; ut & incessu saltabundo.

2. Gens murina in construendis nidis atque cuniculis, in servando penu eminet, atque excellit & castorum ingenium atque sagacitatem æmulatur; opus eruditissimum cl. PALLASSII novas species ex glirium ordine continens, de iis legi meretur; uti omnia, quæ illi eruditio, autopsia, & anatome docuerunt, notabilia, summo cum studio docte digessit.

XX. DIPUS. CAPUT: breve, oculi magni, rostrum obtusum, vibrissæ longæ, Aures rotundæ. Dentes primores supra & infra duo.

CORPUS: subobesum, cauda longa vestita, apice floccosa.

Pedes: antici brevissimi, vestiti; postici, prælongi, nudi, folisque iis, saltando incedunt.

† * *Jaculus. I. D.* cauda longissima, apice pinnata, nigro alba, pedibus posticis maximis pentadactylis. PALL. nov. sp. glir. p. 204. tab. 20. *Cerboa. Siberian Jerboa.* PENN. quadr. p. 429, 292. tab. 45.

α. *Medius*, magnitudine Ratii. PENN. l. c.
Habitat in Siberia, Tataria, Barbaria, India.

β. Mi-

β. Minor. caret albo nasi circulo; minor præcedenti, nec cauda adeo floccosa. PENN. I.
c. p. 430. γ.

† Sagitta. 2. D. cauda longissima, apice subpinnata, nigro
alba, pedibus posticis longissimis tridactylis. PALL.
nov. sp. glir. p. 306. tab. 21. *Mus jaculus*. LINN.
12. p. 85. *le Gerbo*. BUFF. XIII. *Gerbua*. EDW.
glean. tab. 219. *Egyptian Gerboa*. PENN. quadr.
p. 427. n. 291. tab. 42. 3.
Habitat in *Egypto*, *Barbaria*, *Palæstina*.

‡ * Cafer. 3. D. cauda longissima, apice floccosa, nigra pe-
dibus posticis longissimis tetractylis. PALL. nov.
sp. glir. p. 87. n. 29. *le grand Gerbo*. ALLA-
MAND monogr. 1776. BUFF. suppl. tab. 15. *Cape*
Gerboa. PENN. quadr. p. 432. n. 293. *Terbuæ*
capensis act. Holm. 1778. p. 103. tab. 3:
Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

† Hudsonius. 4. D. cauda longa, pedibus posticis longissi-
mis, labio superiore bifido, corpore fusco,
linea laterali flava. ZIMMERM. geogr. Zool. II.
p. 358. n. 268. *longlegged Mouse of Hud-
sonbaay*. PENN. quadr. p. 435. n. 295.
Habitat ad *sinum Hudsonis*.

O B S E R V A T I O N E S

1. Hæcce lepidissima gens jam veteribus nota fuit, inter
Græcos HERODOTUS, THEOPHRASTUS, ARISTOTELES,
ÆLIANUS de iis mentionem fecerunt, inter Romanos,
eam recenset PLINIUS; haud tamen esse *Saphan* sive
Sephanim serì codicis, uti credidit BOCHARTUS; docte
probavit cl. PALLAS, itaque nec cuniculum, ut ha-
bent versiones quædam, sed *Caviam capensem* (mirum
dictu!) credit ex cranio ejusden in rupin Sidonius re-
perto; sit tamen mihi venia dicendi, *Caviam capen-
sem*, rarissimam in ipsa Africa; dum *Geiboa* sive *Mus*
Sagitta in omni Mauritania ad Oran usque lœte vi-
geat & ut ipse testatur celeb. PALLAS circa Libanum
inter rupes latere animalculum *Tarboæ* simillimum,

præsertim longitudine crurum posteriorum, ut testatur SHAWIUS in *itin. Vol. II. edit. Belgicæ* p. 246. ubi, in annotationibus, perperam *Jird* esse *prosimiam* *Tarsier* suspicatus sum; & ibidem male clarissimus TYDEMANNUS credit animalculum, sub *Sylphio*, in nummō aureo *Haymii* expressum non esse *Gerboam*, sisus testimoniou magni WESLINGII in HERODOTUM annotatione. Magni WESLINGII semper veneror memoriam mihi charissimam, sed pace virorum tantorum dictum sit, tempore WESLINGII incomparabilis, historiam naturalem adhuc suisse in incunabulis; vera illa *Gerboa*, est cauda late pinnata. Vide nummum apud PENNANTUM *quadr. tab. 45. ad p. 429.* cui mecum assentit cl. PALL. nov. sp. glir. 281.

2. *Gerboam* *Ægyptiam* vivam vidi, apud cl. VOSMAERIUM principis *Aurie*, Musæi ditissimi directorem, cuius amicitia, mihi splendidi thesauri patent, ut omni cuique scientiam naturalem colenti; per quadriennium duos *Gerboas* aluit; marem & femellam, moresque sedulo observavit, horum descriptionem editurus, itaque nihil de iis anticipare volui.
 3. Caferi Iconem pulcherrimam dedit FORSTERUS Senior in actis *Holmienibus* cum plenaria descriptione vide *Schwedische Abhandel.* 1778. p. 103. tab: 3. cum specimine quod olim possedit amiciss. D. KLOCKNER contuli, quod idem cum illo, quod Museum Hagense possidet, siccatum ex liquore.
- Multa de Dipode notabilia videlicet apud PALLASSIUM nov. sp. glir.

XXI. SCIURUS. **CAPUT :** *rostrum* porrectum,
Dentes primores II. *Oculi*
magni vividi, *Aures* acumi-
natae, penicillatae.

CORPUS : muris, *Cauda* longa
 pilosissima.

Pedes : antici pentadactyli; pos-
 tici tetradactyli, subtus callo-
 si, *ungues* validi.

* *Vulgaris.* 1. *S. auriculis apice barbatis, cauda dorso con-*
colore. ERXLEB. p. 411. 1. LINN. 12. p. 86.
 1. *Ecureuil* BUFF. VII. tab. 32. *Common Squir-*
rel. PENN. *quadr.* p. 406. 266.

Habitat in *Europa, Asia.*

α. *Albus* Habitat in *Sibiria.*

β. *Niger ad lacum Backal.*

γ. *Luteo fuscus pedibus albis.* in *Ceylon.*

† *Ceilonensis.* 2. *S. cauda longitudine corporis, auribus pe-*
nicillatis, corpore nigro; genis, pedibus, abdq-
mine pallide slavis; cauda grisea. *Dandailane.*
Ceylon Squirrel. PENN. *quadr.* p. 408. 267.
Zool. Ind. tab. 1.

Habitat in *Ceylon.*

† *Abyssinicus.* 3. *S. corpore ferrugineo, cauda sesquipedali*
grisea. *Ecureuil geant.* *Abyssinian Squirrel,*
 PENN. *quadr.* p. 408. n. 268.

Habitat in *Abyssinia.*

† *Pericus.* 4. *S. corpore griseo, subtus flavescente, orbitis*
oculorum nigris, auribus nigricantibus, cruribus
pedibusque rubris. ZIMMERMAN *geogr. Zool.* II.
 p. 341. 240. GMELIN (jun.) *itin.* tab. 43. p.
 379. *Ecureuil Persan.* *The Persian Squirrel.*
 Habitat in *Persia.*

† *Bombayus.* 5. *S. auribus apice penicillatis, supra purpu-*
 rea

reus infra flavescens, caudæ extremitate au-
rantia. Ecureil pourpré. *Bombay Squirrel*,
PENN. quadr. p. 409. n. 270.

Habitat in *Bombay*.

† *Erythræus*. 6. *S. auriculis subbarbatis*, cauda tereti villo-
sa, corpore luteo fuscoque, lateribus subtus
sanguineo fulvis. PALL. nov. sp. *glir*. p. 377.
Ecureuil rouge. *Ruddy Squirrel*, PENNANT
quadr. p. 409. 271.

Habitat in *Indiis, Orientalibus*.

* *Cinereus*. 7. *S. auribus non penicillatis*, corpore cinereo,
subtus albo. LINN. 12. p. 86. *le petit Gris*. BUFF.
x. tab. 25. CATESB. *Carol.* II. tab. 74. *Grey
Squirrel*. PENN. quadr. p. 410. 272.

Habitat in *America boreali*.

† * *Niger*. 8. *S. auriculis non penicillatis*, corpore nigro.
Ecureuil noir. *The black Squirrel*. CATESB. *Ca-
rol.* II. 73. PENN. quadr. 411. 273. tab. 44. 2.
bona.

Habitat in *Afie & America borealibus*.

† *Hudsonius*. 9. *S. auribus non penicillatis*; linea dorsali fer-
ruginea cauda ferruginea, nigro annulata.
Ecureuil à Queue annulée. *Hudsonsbay
Squirrel*. PENN. quadr. 412. 274. tab. 43. I.
Habitat ad *Sinum Hudsonis & in Labrador*.

a. *Carolinensis*, Griseo ferrugineus, abdomine
albo, laterali linea ferruginea; cauda fusco
nigra. PENN. quadr. 412. 174. a.

Habitat in *Carolina*.

† *Variegatus*. 10. *S. auriculis non penicillatis*, corpore ni-
gro, albo fuscoque variegato. ERXLEB. syst.
p. 421. *Coquallin*. BUFF. XIII. tab. 13. *Va-
ried Squirrel*. PENN. quadr. p. 413. n. 275.
Habitat in *Mexico*.

Flavus. 11. *S. auriculis non penicillatis* subrotundis. cauda
non pinnata, corpore luteo, pedibus pentadacty-
lis.

lis. LINN. 12. p. 86. *Ecureuil blond. The fair Squirrel.* PENN. quadr. p. 413. 276.
Habitat in America.

Aestuans. 12. S. auriculis non penicillatis, subrotundis, cauda villoso albo nigroque fasciata, corpore griseo, subtus flavo. abdomine fascia alba. LINN. 12. p. 88. 9. *Ecureuil du Bresil. Brasilian Squirrel.* PENN. quadr. 114. n. 277.
Habitat Surinami, Brasil, Gujania.

† * *Mexicanus.* 13. S. auriculis non penicillatis, corpore murino, striis (septem maribus, quinque feminis) albidis longitudinalibus. *Ecureuil de la nouvelle Espagne. The Mexican Squirrel.* PENN. quadr. p. 114. n. 278. SEB. thes. 1. tab. 47. 2.
Habitat in Mexico.

* *Palmarum.* 14. S. auribus non penicillatis, corpore subgrifeo, striis tribus flavis; cauda albo nigroque lineata. LINN. 12. p. 86. n. 5. *le Palmiste.* BUFF. x. tab. 26. *Palm Squirrel.* PENN. quadr. p. 415. n. 279.
Habitat in Palma areca India.

* *Getulus.* 15. S. auriculis non penicillatis, cauda laté villosa nigra albo guttata; corpore fusco, striis quatuor albidis longitudinalibus. LINN. 12. p. 87. 6. *le Barbaresque.* BUFF. x. tab. 27. *The Barbary Squirrel.* PENN. quadr. 416. n. 280.
Habitat in Barbaria.

† *Notatus.* 16. S. auriculis penicillatis? corpore castaneo, stria laterali flava. *Ecureuil de la Tamarinde. The platane Squirrel.* PENN. quadr. 614. n. 281.
Habitat in Javæ Platano, Tamarindo.

(b) *Sciuri volantes.*

* *Velucella.* 17. S. auriculis non penicillatis, cute lateraliter dilatata, plicatili, corpore rufo luteo, subtus II 4 ni-

niveo; cauda lanceolata valde pilosa. LINN. 12. p. 88. n. 10. *Ecureuil volant. CATESB. Carolin. 76. EDW. birds. 191. Flying Squirrel. PENN. quadr. p. 418. n. 213.*

Habitat in America.

* Volans. 18. *S. auribus non penicillatis, oculis protuberantibus, cute dilatata plicatili, cauda pilosissima rotundata. LINN. 12. p. 88. 10. Polatouche. BUFF. x. tab. 22. SCHREB. Zaughth. tab. 223. European flying Squirrel. PENN. quadr. p. 420. n. 285.*

Habitat in *Finlandia, Lapponia.*

* Sagitta. 19. *S. auribus non penicillatis; hypocondriis prolixis volitans, cauda plano lanceolata, pinnata. LINN. 12. p. 88. 11. Ecureuil Dedale. Sailing Squirrel. PENN. quadr. p. 49. n. 281.*

Habitat in *Java.*

* Petaurista. 20. *S. auribus non penicillatis, cute lateraliter extensa, sub laevi, margino piloso, cauda pilosissima cylindrica. PALL. miscell. Zool. 54. tab. 6. VOSM. monograph. Taguan BUFFON suppl. vi. tab. 21. Sailing Squirrel. PENN. quadr. p. 417. n. 281.*

Habitat in *Moluccis.*

† * Virginianus. 21. *S. auribus subpenicillatis, capite membrana volitante, cucullato, quae perpedes extensa ad caudum producitur SEBA thes. 1. tab. 44. 3. le Rat volant. The hooded Squirrel. PENN. quadr. 419. tab. 284.*

Habitat in *Virginia?*

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus hoc inter Glires pulcerrimum, medium inter muribus, Dipodibusque iisque affine, characteres naturales in cauda, moribus monstrat; atque omnibus cæda longa pilosissima, in quibusdam compressa, striata;

pro-

procedunt saltando, agillimi, edunt clunibus sedentes, nidum faciunt, rotundum apertum, cœunt tempore venno.

2. Veteribus inter omnes nullus notus, quam *Sciurus Vulgaris*, ab ARISTOTELE, PLINIO, OPPIANO memoratus.
3. Ex Sciuri cinerei pelle magna *Americes Septentrionalis* mercatura, quamvis *Asiatica* nobilior censeatur.
4. Plerique & tantum non omnes, in arboribus degunt *Variegatus* tamen subterraneus. BRISSONIUS.
5. Unicum forte hocce genus volantia præbet specimina una cum saltantibus, nam quid sit *Prosimia volans* adhuc dubius hæreo, ut & *Mus volans* LINNEI; ambo hæc animalia anomala, rarissimaque vidi, sed quem locum in ordine naturali, vel artificiali occupare debent. pronuntiare non audeo; cum *Virginianum* probe contemplandi tempus & occasio deerant.
6. Tanto melius ceteras species volantes novi, & olim possedi; pulcerrime eos distinxit cl. PALLAS, sed minor cl. PENNANTUM confundisse *Petauristam*, & *Sagittam*.
7. Tres modo Petauristas Sciuros se in *Belgo* vidisse testatur cl. PALLAS; ego decem vidi, abhinc, tribus annis in variis museis, inter eos jam dum hæc scribo speciem nigram coram habeo, in museo pulcerrimo viri illustr. RAYE DE BREUKELERWAARD, varians itaque colore griseo, subluteo, qualis in *Leidensi* & nigro. Icon VOSMAERII haud bene colorata.

XXII. MYOXUS. CAPUT: *Aures nudæ rotundæ, oculi protuberantes.*

CORPUS: *sciuri, cauda longa pilosa teres.*

Pedes: *breves, palmis teträ-dactylis, plantis pentadactylis.*

Glis. 1. *cauda longa villosissima corpore cano subtus albo.*
PALL. nov. sp. *glir.* p. 88. 33. *Sciurus Glis.* LINN.
12. p. 87. 8. *Loir.* BUFF. VIII. tab. 24. *Fat dormouse.* PENN. *quadri.* 423.

Habitat in *Europa australi.*

* *Striatus.* 2. *M. flavus*, striis quinque fuscus longitudinalibus. LINN. 12. p. 87. 7. (*Sciurus*) SCHREB. Zaugth. tab. 219. *le Suisse.* BUFF. x. tab. 28. *Ground Squirrel* PENN. quadr.

Habitat in *America.*

†* *Chrysurus.* 3. *M. corpore fusco purpureo*, linea frontali mediaque cauda aurei coloris. ZIMMERM. *geog. Zool.* p. 352. *le Lerot à Queue dorée.* BUFF. *suppl.* iv. edit. *Amstel.* pl. 67. *the gold tailed Dormouse.*

Habitat *Surinami.*

O B S E R V A T I O N E S.

Praeūnte cl. ZIMMERMANNO, *Myoxi* genus constitui ex animalibus; a Zoologis inter *Sciuros* muresque intermedios; & ipsum genus; muribus proxime post posuisse, nisi *Dipodes*; magis adhuc illis accederent.

1. Glirem, quem cl. PALLAS murem dixerat, hic citavi cauda nec enīa murina; nec sciurea, labium fissum sciuri.
2. *Striatus*, quamvis primo adspectu *Sciurum* mentiatur, nihil minus, cauda, moresque vetant, illi enim teres pilis brevibus obsita, non scandit, sed muris instar subterraneus.

XXIII. SOREX. CAPUT: Oculi parvi; rostrum elongatum, gracile, acutum, maxilla superiore longiore. Dentes primores superiores duo; inferiores quatuor parvi, cauda varia.

CORPUS: longum; cauda brevifuscula.

Pedes: pentadactyli, breves.

* Araneus. 1. S. cauda mediocri, corpore griseo nigro, subtus albo. LINN. 12. p. 74. 5. *Mus araigne*, BUFF. VIII. trb. 10. f. 1. *fætid Shrew*. PENN. quadr.

Habitat in *Europa, Siberia*.

† Leucodon. 2. atrocinereus, subtus albidus, dentibus candidis, cauda tereti pilosiore. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 383. n. 311. *Mus araigne à dents blanches. The whit Theeth Shrew*.

Habitat in *Alsatia*.

‡ Tetragonurus. 3. S. atrocinereus, subtus pallidior, cauda subquadrata, incisoribus brunneis. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 383. 312. *Mus araigne à Queue quarree. square tail. PENN, quadr. p. 482. n. 346. The Shrew*.

Habitat in *Alsatia*.

† Constrictus 4. S. atrocinereus, unicolor caudæ basi constricta. ZIMMERM. geogr. Zool. p. n. 383. n. 313. *Mus araigne à Queue à rebours. The reversed tail*.

Habitat in *Alsatia*.

† d'Aubentonii. 5. S. atrocinereus, cauda mediocri subnuda mediocri, digitis ciliatis. ERXLEB. p. 124. 5. *la Mus araigne d'eau. BUFF. VIII. tab. II. 1. The weter Skrew*.

Habitat in *Europa ad fontes*.

† Ca-

SOREX.

† Carinatus. 6. *S. atrocinereus*, subtus albidus, incisoribus brunneis, macula retro oculos albida, cauda attenuata, subtus pilosa carinata. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 383. 31. *Mus araigne a Queue en carène*. The Carinated tail. PENN. quadr. 482. Habitat in *Anglia*, *Germania*, *Gallia*, *Borussia*.

Moschatus. 7. *S. pedibus palmatis*, cauda compressa lanceolata. LINN. 12. p. 97. 2. BUFF. quadr. x. tab. 2. *Musky Shrew*. PENN. quadr. p. 470. Habitat ad *Volganum*.

* Murinus. 8. *S. cauda mediocri*, corpore fusco, pedibus caudaque cinereis. LINN. 12. p. 74. 4. *Mus araigne souris*. The Murine Shrew. PENN. quadr. Habitat in *Java*.

† Pusillus. 9. *S. auriculis rotundatis*, cauda brevi, subdisticha. ERXLEB. syst. p. 122. 3. *S. G.* GMELIN itin. III. p. 499. tab. 75. 1. *Mus araigne de Perse*. The Persian Shrew. Habitat in *Perse desertis*.

Minutus. 10. *S. rostro longissimo cruda nulla*, corpore grisea subtus albido. LINN. 12. p. 73. 2. *la petite Musaraigne*. The minut Shrew. PENNANT quadr. 481. n. 353. Habitat in *Siberia*.

Aquaticus. 11. *S. rostro longissimo*, cauda brevi pedibus pentadactylis. LINN. 12. p. 74. 3. *Mus araigne de Virginie*. The brown Mole. PENN. quadr. p. 486. n. 353. Habitat in *Virginia*.

† Fodiens. 12. *S. rostro longiore auriculis brevissimis*, corpore supra nigro, subtus cinereo, pedibus albis. *Mus araigne d'eau*. BUFF. VIII. tab. 11. Water Shrew. PENN. quad. 480. n. 342. Habitat in *Europa*, *Sibiria*.

* Cristatus. 13. *S. naribus carunculatis*, cauda breviore, LINN.

LINN. 12. p. 73. 1. *le nez Rayonné*. *The radiated Mole*. PENN. quadr. p. 468. n. 311. tab. 48. 1.

Habitat in *America boreali*.

† Brasiliensis. 14. S. fuscus dorso 3 nigris. ERXLEB. p. 127.
8. *Musaraigne de Bresil*. BUFF. xv. *The Brazilian Shrew*. PENN. quadr.

Habitat in *Brasilia*.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Gens *soricina myoxis*, *muribusque* & *Talpis affinis*, se distinguit rostro porrecto, gracili, curculionum inter insecta proboscidi analogo, oculis minutis pilis obtectis, minima totius Quadrupedum agminis continet animalia.
2. *Sorex aquaticus* & magis ad hoc *cristatus*, *Talpam ita* mentiuntur ut nisi accurata inspectione dignosci queant. Caudam nodosam, sive pone quamque vertebram constrictam, ERXLEBENIO & PENNANTIO, qui eum tamen in museo ditissimo D. ASTHON LEVERS vidit, effugisse miror, in iconē PENNANTII tamen, quodammodo leviter appetet, singularis, nec in allo alio quadrupede conspicua.
3. *Soricis fodientis*, tabulam mihi aliisque Zoologis olim misit amiciss. PALLAS, absque descriptione, quam nuper dedit cl. PENNANT,
4. Omnes sub terra degunt, seminibus, quisquiliisque viētantes, inde quibusdam odor teterrimus, feli ipsi repugnans qui *soricem* necat, non devorat.

XXIV. TALPA. **CAPUT:** rotundum, auriculae brevissimæ, vel nullæ; oculi minutissimi, rostrum porrectum.

CORPUS: obesum, fere Cylindricum, cauda varia.

Pedes: breves; antici lati fosforii lateraliter extensi.

***Vulgaris.** 1. *T. cauda brevi, pedibus pentadactylis.* LINN. 12. p. 73. 1. *Taupe.* BUFF. VIII. tab. 12. *Mole.* PENN. quadr. p. 483. n. 349.

Habitat in *Europa.*

* $\alpha.$ *Maculata;* maculis albis. *Taupe tachetée.* *The spotted Mole.* EDW. glean. II. tab. 268.

* $\beta.$ *alba tota.* SEBA thes. I. Tab. 32. 1. *Taupe blanche flava tota.* *The withe Mole.* *Taupe blonde.* *The yellow Mole.* PENN. quadr. p. 484. $\beta.$

Habitat in *America boreali.*

$\gamma.$ *Grisea.* ZIMMERM. geogr. Zool. p. 390. $\delta.$ HUPSCHE Naturf. III. p. 38.

† **Longicauda.** 2. *T. cauda mediocri pedibus, pentadactylis, squamosis.* ERXLEB. syst. p. 118. 2. *Taupe à Queue longue.* *The longtailed Mole.* PENNANT quadr. p. 486. n. 352. tab. 48. 2.

Habitat in *America boreali.*

Rubra. 3. *T. cauda breviore, palmis tridactylis, plantis teradactylis.* ERXLEB. syst. p. 119. 3. *Tucan.* BUFF. XV. SEBA thes. I. tab. 32. 2. *The red Mole.* PENN. quadr. p. 487.

Habitat in *America.*

* **Asiatica.** 4. *T. ecaudata palmis tridactylis; versicolor.* LINN. 12. p. 73. 2. *Taupe dorée.* BUFF. XV. SEBA thes. I. tab. 32. p. 4. 5. *The Siberian Mole.* PENN. quadr. p. 485. n. 350.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

OB.

OBSERVATIONES.

1. Palmæ fossoræ generis diagnostin efficiunt; omnes Talpæ subterraneæ, insectis viuentibus, cuniculos agunt in damnum, hortorum, satis superque notos nec facile destruendos. Oculi iis adeo parvi atque minuti, ut vix videantur; *Vulgaris* genialibus gaudet maximis, olfactus ei acerrimus. Nidum ex muscis bryisque parat, quatuor edit pullos. Caro rubræ Americanis in deliciis.
2. Tertia nostra species, nec *Siberica* ut voluit SEBA quem secuti ceteri plerique nomenclatores, nec *Asiatica* dicenda, sed *Africæ* meridionalis incola ad Cap. bon Sp. habitat rara, tria enim velquatuor specimina, mihi obtulerunt, varia quæ perlustravi musea; color ei idem sed intensior ac latera *Aphrodites aculeatae*, ex viridi, porpureo pulcerimo nitore pro luce varia, variabilis.

XXV. HYSTRIX. CAPUT: rotundum, lateribus subcompressum, Aures rotundæ oculi fulgidi.. *Rostrum* breve labium superius fissum; *Dentes primores* II.
CORPUS: spinis longis, duris, rigidisque tectum cauda varia in variis.
Pedes: breves, pentadactyli.

***Cristatus.** 1. H. cauda brevi, capite spinis cristato; corporis spinis fusco alboque annulatis. LINN. p. 76. *Porc epic.* BUFF. XII. tab. 52. *The crested Porcupine.* PENN. quadr. p. 390. 352.
 Habitat in *India*, *Tataria*, *Persia*, *Palestina*.

***Prehensilis.** 2. H. pedibus tetradactylis, cauda elongata prehensili seminuda. LINN. 12. p. 76. 2. *Cendou.* BUFF. XII. tab. 54.
 Habitat in *India*.

* Dor-

HYSTRIX.

* Dorsata. 3. *H. palmis tetradactylis*, plantis pentadactylis; cauda longa, dorso solo spinoso. *Ursom. BUFF.* XII. tab. 55. *EDW. birds. I. tab. 52. Canadæ Porcupine. PENN. quadr. p. 344, n. 257.*
Habitat in *America boreali.*

* Macroura. 4. *H. pedibus pentadactylis*, cauda prælonga, aculeis medio crassioribus. *LINN. 12. p. 77. 4. Ursom. BUFF. I. c. The longtailed Porcupine. PENN. quadr. p. 391. p. 254. SCHREB. Zaugh. I. 170.*
Habitat in *India.*

* Brasiliensis. 5. *H. cauda longa prehensili apice nuda*, cor-
pore aculeis brevioribus. *Chat epineux. Bra-
silian Porcupine. PENN. quadr. p. 392. tab. 41. I.*
Habitat in *Brasilia.*

OBSERVATIONS.

1. Genus *Hystricum*; in ordine glirium eminent, corpore spinoso, dum cetera, tantum non omnia, animalia
huc pertinentia, vellere gaudent velutino quasi; gens
hæc armata innocua tamen; eam, aculeos in hostem
emittere insipida fabella; spinæ enim sive aculei satis
validæ cuti inhærent.

Cristati Indici calculus vesicæ maximi valoris olim &
adhuc (Vid *Ind. litterat.*)

2. Anne *Brasilienſis* idem sit cum prehensili vel ejus va-
rietas, valde dubito, vivum vidi, se fæpius in posti-
cos pedes erigentem.

XXVI. ERINACEUS. CAPUT: *rostrum* produc-tum, *Caput catheto* pla-teum.

CORPUS: *Hystrice longius;* spinis brevioribus tec-tum.

Pedes: pentadactyli, breves.

* Europaeus. 1. E. auriculis rotundis naribus crista-tis. LINN. p. 75. 1. *Herisson.* BUFF. VIII. tab. 6. KNORR tab. k. 3. f. 1. *Common Hedgehog.* PENN. quadr. p. 488. n. 355. tab. 48. 3.
Habitat in Europa.

† Auritus. 2. E. auriculis nullis, dorso spinoso spinis basi albo annulo notatis, abdomine albo velutino. PALL. *comm. petropol.* XIV. p. 519. tab. VI. GMELIN *ibid.* p. 573. tab. 21. 4. *Herisson a Oreilles.*

Habitat in desertis intra *Don & Oby.*

In auris. 3. auriculis nullis. LINN. 12. p. 75. 3. *Herisson sans Oreilles.* *Gujana Hedgehog.* PENN. quadr. p. 491. n. 358. SEBA *thes.* tab. 49. 3.
Habitat in *Gujania.*

† Acanthurus. 4. E. auribus brevibus, rostro longiore. aculeis corporis caudaeque albidis. *Tendrac.* BUFF. XII. tab. 57. *Asiatic Hedgehog.* PENN. quadr. p. 490. n. 357.
Habitat in *Madagascar.*

† Tanrec. 5. auriculis parvis, rostro longo, capite, collo, humerisque spinosis, spinis flavicantibus pedibus rufis. *Tanrec.* BUFF. XII. tab. 56. *supp.* III. tab. 57. SCHREB. *Zaugh.* III. tab. 165.
Habitat in *Madagascar.*

† Sibiricus. 6. E. auriculis brevibus planis; spinis rufis, apice aureis, pilis subtus cinereis deauratis.

ERXLEBEN p. 172. 2. *Herisson de la Siberie.*
The Siberian Hedgehog.
 Habitat in *Siberia.*

*Malaccensis. 7. *E. auriculis pendulis cauda brevi.* LINN.
 12. p. 25. 3. *Herisson de Malacca.* *The*
Malacca Hedgehog. SEBA thes. 1. tab. 51. 1.
 Habitat in *Java, Sumatra, Malacca.*

O B S E R V A T I O N E S

1. Genus hocce proximum ita antecedenti, ut facile in unum conjungi potuisset; sola constat differentia systematica in eo, quod *Hystrici* nulli sunt *Laniarii*; *Erinaceo* vero duo recumbentes, nam quoad pedum digitos, videmus in aliis generibus, eos in eodem genere maximè differre. Porro utriusque corpus spinis tectum, moribus convenient, mites noctu vagabundi, vinctus utriusque ex radicibus, aviculis, insectis, talis uterque incedit etc.
2. Europæus, claviculis, quibus plurima carent animalia, instructus; monogamus erectus coit; in globum, decussatis spinis, se volvit tactus, ita invulnerabilis.
3. *Auritus a Siberico* plane differt, ille enim à doctis Russicis itineratoribus ad flumen *Oby* primum visus, hic jam antea a BRIPSCNIO, KLEINIO, SEBA descriptus.
4. Collatis BUFFONI iconibus. *Tendrac & Tanrec* mihi unum idemque animal videntur, ætate vel sexu differens.
5. *Erinaceus Malaccensis*, verus est *Erinaceus* haud *hystrix*, tanto minus varietas *Hystricis cristatae* ut putavit cl. PENNANT, aliquando *Hystrix cristatus* dat calculum biliarium, sub nomine *Bezoar* pretiosum, multo tamen differt a *pedro del Porco* vel *pedro di Malacca*. *Erinacei malaccensis*, pretiosissimo, sudore fero, confortante. Magni adhuc apud Indos valoris, nec plane eum spernunt Europæi medici quidam.

Hocce animale explicit glirium ordo, defuit vero adhuc genus, *glires ruminantibus* connectens solus *Moschus* habitu lepotino, illis proximus sed quantum differt! fabrica interna ruminantis, externa figura *Antilopes*, den-

dentes primores superiores nulli inferiores 8. Pedes bisulci.

IV. RUMINANTIA.

XXVII. TRAGULUS. **CAPUT:** ecorne, cervinum, aures magnæ latæ. **Dentes** primores superiores nulli, inferiores octo, laniarii exserti, sinus lacrymalis nullus. **Collum** longum teres.

CORPUS: ut in cervis, cauda brevissima.

Pedes: longi, bisulcati.

II. Ungulata.

* **Moschus.** 1. folliculo umbilicali, corpore maculato, gula alba, pedibus nigris. PALL. *spicil. Zool.* XIII. tab. IV. LINN. 12. p. 91. 1. (moschus monferus) *Musc* BUFF. XII. p. 361. *Musk.* PENN. *quadr.* p. 112. 54. tab. 12. 1.

Habitat in *Sina*, *Tibeth*, *Tonkin* ad lacum *Baikal Jeneseiiam*.

† * **Meminna.** 2. T. supra cinereo olivaceus, subtus albus lateribus albo maculatis. ERXLEB. p. 322. 2. *Cheyrotain à peau marquée des taches blanches.* BUFF. XII. p. 315. *The Indian Musk.* PENNANT *quadr.* p. 115. 56. tab. 12. 2.
Habitat in *Java*, *Ceylon*.

* **Pygmæus.** 3. T. Pedibus humano digito angustioribus corpore castaneo subtus albo, unguis spuriis nullis. LINN. 12. p. 92. 3. *Cheyrotain des Indes Orientales.* BUFF. XII. tab. 42. tab. 43. 1. 3. 8. *The Guinea Musk.* PENN. *quadr.* p. 115. n. 57.

Habitat in *Guinea*.

†* Americanus. 4. *T. rufo fuscus ore nigro, gula alba;*
 ERXLEB. p. 324. 4. *Chevrotain de Surinam. The Brasilian Musk.* PENN. quadr.
 p. 114. 55.
Habitat Surinami.

OBSERVATIONS.

1. Ad Ruminantia, a gliribus transitum non sine saltu fieri, antea monstravi: habita itaque magnitudinis ratione. Traguli gliribus proximi, inde hocce genere *Ruminantium* Agmen incepi, quamvis hoc haud satis esse proba sciam.
2. Zoologi novissimi genus hoc, nomine *Moschi* a specie potentiore *Moschi* salut averunt. Ego vero cum ille solus *Moschi* nomen mereatur, ob unguentum folliculi umbilicalis, quo ceterae carent species *Tragulos*, dixi, quo generico nomine antea jam usi fuerant *KLEINIUS*, atque *BRISSONIUS*, genus certe proprium & naturale, ob defectum cornuum in utroque sexu, itaque nec ad *Cervos*, nec ad *Hircos*, nec ad *Antilopas* referendum, quamvis his omnibus affine.
3. In prima systematis editione plane omiserat *Moschum* LINNAEUS, dein ut animal sui generis in sexta decimaque editione enumeravit, in ultima tandem cum *Tragulis* conjunxit; omnesque dixit *Moschos*. *Tragulos* *KLEINIUS*, *Capras* inter & *Antilopas* disseminavit adjecta *antilope regia*.
4. Dentium laniariorum superiorum exsertio inter notas characteristicas ponunt Zoologi hodierni, sed cl. PALLAS (*Specil. Zool.* 13. p. 28.) adnotavit, id & cervis sene coribus præsertim *Cervo Elapho* accidere, quamvis non ad talem longitudinem; signum diagnosticum *Traguli* itaque est caput acorne, maxillæ superioris magnitudo & absentia sinuum lacrymalium.
4. *Moschi* Historiam plenariam atque anatomen dedit cl. PALLAS *Specil. Zool.* fasc. 13.

XXVIII. CAMELOPARDALIS. CAPUT: *cornua* solida, simplicia obtusa, erecta pilosa, penicillata. *Dentes* primores spathulati. *Collum* longum, jubatum.

CORPUS: dorso obliquo, *Cauda* longiuscula apice subcrinita.

Pedes: bisulci.

*Giraffa. I. C. corpore albido maculis magnis fuscis. LINN.
12. p. 92. I. Giraffe. BUFF. XIII. I. tab. I.
I.* I. 4. & tab. I. 3. (cornua) edit belg. 4^{to}
Giraffe. PENN. quadr. p. 58. n. 15.
Habitat ad Cap. bon. Sp.

O B S E R V A T I O N E S

Genus hoc proprium, nec *Cervus*, uti LINNÆUS, ERXLEBENIUS aliique voluerunt, distinxit tamen PENNANTUS quem secutus est ZIMMERMANNUS.

Multi Zoologi, de giraffa hallucinantur, paucissimis tamen eum videre, nec praeter PENNANTUM & ZIMMERMANNUM vix ulli datum fuit; ego vidi pullum, ex quo est. PENNANTUS descriptionem suam construxit, sceleton perfectum pulcerimum adulti, quod in Museo Principis Araustaci conservatur, ossa plurima alias adulti in museo Leidenſi, duasque adulti pelles: cum vero amicissimus VOSMAER giraffæ Hagensis monographiam in publicam dare sibi proposuerit & cuius jam vidi tabulas, non longus ero, ne descriptionem suam superfluam redderim: mensuras aliquas, quas in ossa sceleti Leidenſi cepi, hic tradam.

Caput a maxillæ superioris apice, ad occiput 2 p. *Cornua* 7 pall 5 lin. hæc basi rotunda, ossa frontis inherent, cylindrica sunt vel potius, teretia, colli longitudinem inveni 5 ped. 1 lin. Vertebra colli tertia 10 poll. & altra illa omnium maxima, sulco donatur, cui implantatur tendo, fortissimus, ab ea ventebra. usque ad decimam quartam dorsi, oblique descendens; hicce tendo, tamen iu nullo amborum sceletorum ap-

paret, sed ubi utrinque implantatur clarissime videri potest, *Os sterni bipedale*, scapula 2 ped. 2 poll. *os humeri*, tibia brachium, anterior simul mensurata 5. p. 9. poll. 8. & femoris, cruris itidem 5. 9. 4. itaque pedum longitudinem fere æqualem inveni, (de lineis pollicum tamen non certus sum) quæ mensura satis convenit cum illa quam dedit vir Doctiss. ONYMUS, ut qui invenit longitudinem pedis anterioris a planta pedis ad cubitum. 3. pd. 2', 3''. a cubitu ad scapulam 2p 7' 3'' itaque totam longitudinem 5p. 9'. 6''. Pedis posterioris longitudinem vidi a planta pedis ad genu 2p. 10. 3. & a genu ad cavitatem ossis Ilii 2. 11. 3. itaque & 5p. 9. 6. exacte æquales ergo pedum longitudines (Vid. BUFF. XIII. p. 22. vers. belg.) obliquitas dorsi ergo non a longitudine pedum dependet, sed ab obliquitate tendinis nomine ligamenti albi, qui ab vertebra 14. a dorsali, ad sextam cervicalem adscendit, sed hæc fusius & accuratius in VOSMAERII monographia apparebunt, cornua maris in tabula BUFFONII XIII. tab. 13. exacte, sed ea tabulæ f. 14. mala. Cutis in aliis profundius fuscæ maculæ.

Major ergo Camelœ, mediæ magnitudinis, quam altitudinem ei dederunt Doctiss. LESKE *ansänsgr. der Naturgesch.* I. p. 178. & ERXLEBEN p. 296. quamvis p. 297. eum 17. pedum antice & 9. postice altum perhibeat, color nec nigricans, maculis rufo fuscis ut dixit cl. LESKE, nec variegatus maculis fuscis ferrugineisque ut voluit cl. ERXLEBEN, cornua (feminæ?) aliquando minus crassa, ut vidi in pelle & in capite pelle obducto, quod pro sua humanitate solita monstravit celeb ALLAMAND olim præceptor, semper amicus æstumandus.

Hæcce obiter de *giraffa* conscribere consultum duxi, ut vera ejus adumbratio daretur; magis plenariam descriptionem vedes apud BUFFONIUM in supplementis & quæ jam carceres mordet cl. VOSMAERII monographia.

XXIX. CERVUS. CAPUT: *Cornua* solida, annua, rumosa, tenui corio hirto tecta, apice denudata, crescentia. *Oculi magni*, sinus lacrymales; *Aures magnæ latæ*. *Collum longum*, subcompresso, *Corpus*: cylindricum; *cauda brevis*. *Pedes*: ungulati, bisulci.

*Alce. 1. C. cornubus acaulibus palmatis caruncula gutturali. LINN. 12. I. p. 92. 2. *Elan*. BUFF. XII. tab. 7. 8. 9. fig. malis. *Elk*. PENN. quadr. p. 93. 42. tab. 9. I. *Femin*.

Habitat in borealibus *Europæ*, *Asiæ*, *Americæ*.

*Tarandus. 2. C. cornubus ramosis, recurvatis, teretibus summitatibus palmatis. LINN. 12. p. 93. 4, Renne. BUFF. XII. tab. 10. II. *cornua* 12. skeleton. Rein. PENN. quadr. p. 99. n. 43. tab. 10. I. mala. CAMPER *Natuurk. Verhand*. p. 193. tab. I.

Habitat in *Lapponia*.

*Elaphus. 3. C. cornibus teretibus ramosis, recurvatis LINN. 12. p. 93. *Cerf*. BUFF. VI. tab. 9. mas *Biche*. tab. 10. fem. *faon* (*pullus*) tab. 12. *The Stag*. PENN. quadr. p. 102. n. 45.

Habitat in *Europa*, *Africa boreali*.

α . *Hippelaphus*, pilis in collo longioribus quasi jubatus. *Cerf d' Ardenne*.

β . *Corficanus*, vulgari dimidio minor. *Cerf de Corse*. BUFF. VI. tab. II. *The Corsian Stag*.

γ . *Canadensis*, cornubus amplissimis. *The Stag of America*. CATESB. Carol. append. xxviii.

*Dama. 4. C. cornubus ramosis recurvatis compressis: summitate palmata. LINN. 12. p. 93. 5. le Daim, BUFF. vi. tab. 27. femina tab. 28. The fallow Deer. PENN. quadr. p. 101. n. 44.

Habitat in Europa.

† *Axis. 5. C. cornubus ramosis teretibus erectis, summitate bifida; corpore albo maculato. ERXLEB. p. 312. 6 Axis. BUFF. xi. tab. 28. 39. The Axis. PENN. quadr. p. 105. 47.

Habitat ad Gangem, Java, Ceylon.

‡ Virginianus. 6. C. cornubus multiramis antrorsum curvatis, corpore pallidé fusco cinereo. Daim de Virginie. The Virginian Fallowdeer. PENN, quadr. p. 104. n. 46. tab. 11. 2. (cornua) CATESB. append. 38.

Habitat in Virginia.

*Capreolus. 7. C. cornubus ramosis teretibus, erectis, summitate bifida. LINN. 12. pag. 94. 6. Chevreuil, BUFF. vi. tab. 32. 33. Roedeer. PENN, quadr. p. 108. n. 51.

Habitat in Europa usque ad Norvegiam.

¶ a. Cariaeou. BUFF. xii. tab. 44.

Habitat in Gujania, Brasilia.

‡ Porcinus. 8. C. cornubus reclinatis trifariis; corpore crassiore. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 131. n. 46. Cerf Cochon. BUFF. suppl. vi. tab. 18. Porcine Deer. PENN. quadr. p. 147. 49. tab. 10. 2.

Habitat ad Cap. bon. Sp.

‡ Muntjak. 9. C. cornubus trifariis uncinatis corpore crassiore, facie sulcata. ZIMMERM. geogr. Zool. ii, p. 131. 47. Rib faced Deer. PENN. quadr. p. 107. 105. Cerfa faces striée.

Habitat in Java, Ceilon.

† *Vaginalis. 10. C. cornubus uniramosis parvis vaginis duabus convexis pilosis, ad os nasi coeuntibus, implantatis, sinibus lacrymalibus maximis,

mis. Chreveuil des Indes. BUFF. *Suppl. vi.*
tab. 26. The little Indian Roe.

Habitat in India.

Bezoardicus. 11. *C. cornubus ramosis*, teretibus erectis,
 ramis tribus. LINN. *syst. 10.* p. 67. 6. *Che-*
vreuil de Mexique. *Mexican Deer.* PENN.
quadr. p. 110. n. 32. tab. 11. 3.

Habitat in Mexico.

† *Pygargus.* 12. *Cornubus trifarii*, cauda nulla. ERXLEB.
syst. p. 317. n. 8. *Cerf Pygargue.* *The tail-*
less Deer. PENN. *quadr. p. 109.* n. 51. A.

Habitat in Russia, Sibiria.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus *cervinum* naturale est, *cornubus ramosis* ab omni alio separatum; dividi potest in duas Phalanges, scilicet in cervis *cornubus palmatis*, & in cervibus *cornibus rotundis*, ut fecit PENNANTUS, tumque *Cervus Terandus* inter binos mediis,
2. *Cervus Alce* nunc modo *Hyperboreus*, olim eum in *Germania* vixisse, credunt plurimi Zoologi; & Galliam olim in habitasse, credit BUFFONIUS, ex loco J. CÆSARIS de *bello gallico*. Lib. vi. §. 25. Cæsarem non *Tarandum vel Alcen* voluisse sed *Bovem Bison* PLINII, perperam credit CLUVERIUS, *Alcem Cæsaris Tarandum esse afferit comes de Buffon*. *Alce* animal est stupendæ velocitatis ut quod 50. *milliaria* de die percurrit.
3. An varietas *α.* *Elaphi* sit *ιππελαφος* ARISTOTELIS & *τρχγελαφος* PLINII, est quod dubito. *Cervus, Alce, Elaphus, Dama* sub nomine *πλατυκεφως*, & *ευρυκεφως* *Axis, Capreolus* veteribus noti fuere ut ex PLINIO abunde patet, *Damam* PLINII tamen non *Ceryum* sed Antilopen fuisse infra videbimus.
4. *Cervus Porcinus*, minimus hujus gentis, sceleton vidi capitis, sceleto leporis haud multo majus, quod forsitan Leporis cornuti fabulae ansam præbuit.
5. *Cervi vaginati* cornuum basis, magnitudoque sinuum, lacrymalium notabilis. *Vagina cornuum* exacte V la-

tinum exprimit, quodque cornu vagina, cum altera coit ad finem ossis Nasii, pilosa est, convexa, ita ut (si bene memini) 4 lineis fere supra planum ossium frontalia emineat, color, ut totius animalis fuscus, cornua ipsa inaequalia, ad exortum ex basi, ramulum dant acutum parvum, dein oblique surgunt, parum imo vix curva in apicem acutum desinentia, albidio flava: animaleculum pulcherrimum tenellum, magnitudinis & habitus *Antilopes grimmiae*. Sinus lacrymales magni lati, satis profundi, an tamen Animal iis lingua alingere possit dubito? modo infaretum vidi.

XXX. ANTILOPE. **CAPUT:** cervinum, cornua simplicia, erecta annulata; nec decidua, sinus lacrymalis nullus.

CORPUS: *Pedesque cervi*, sed *Scopi* pilosi ad genua anteriora.

(a) *Cornubus erectis, recurvis.*

† * Gnou. 1. A. cornubus laevigatis horizontaliter procurrentibus basi fronti incumbentibus, postea recurvis, rectis uncinatis, collo jubato, cauda equina. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 102. BUFF. suppl. XI. p. 156. tab. VIII. IX. Gnou. PENN. quadr. p. 62. 16. VOSM. monogr.

Habitat ad Cap. bon. Sp.

(b) *Cornubus rectis Uncinatis.*

Rupicapra. 2. A. cornubus erectis teretibus laevigatis, apice retrorsum uncinatis. PALL. spicil. 12. n. 3. neue Nord. Beytr. IV. tab. 3, LINN. 12. p. 95. 4. (capra) le Chamois. BUFF. XII. tab. 16. mediocris, melius RIDINGER Thierb. n. 25. Chamois. PENN. quadr. p. 64.

Habitat in Alpibus Gallicis, Helveticis, Italicis.

(c)

(c). *Cornubus arcuatis.*

† Leucophæa. 3. A. cornubus arcuatis teretiusculis, annulatis, corpore cœrulecente. PALL. *spicil.* XII. I. *Bouc chamois. Blue Antelope.* PENN. *quadr.* p. 66. 18. tab. ad p. 91. n. 18. caput.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

* Oryx. 4. A. cornubus subrectis longissimis, subulatis annulis minimis, corpore gryseo, striga dorsali, maculisque capitum nigris. PALL. *spicil.* XII. 16. *Pasan.* BUFF. XII. tab. 33. f. 3. (*cornua*) *suppl.* XI. pl. 17. edit. 12°. *Ægyptian Antelope.* PENN. *quadr.* p. 67. 19. *Capra Gazella.* LINN. 12. 96. Habitat in *Ægypto, Levante, Arabia, India.*

† Leucoryx. 5. A. cornubus subrectis convexe annulatis; corpore lacteo? PALL. *spicil.* XII. 16. *Leucoryx.* PENN. *quadr.* p. 68. tab. 6.

Habitat in *Arabia.*

†* Oreas. 6. A. cornubus, subulatis rectis, carinato contortis, corpore griseo. PALL. *spicil.* XII. 17. 17. *Canna.* VOSM. *monogr.* fig. bona. BUFF. *suppl.* XI. p. 207. tab. 12. *Indian Antelope.* PENNANT *quadr.* p. 70. 22.

Habitat in *Africa.*

†* Grisea. 7. A. cornubus arcuatis, ad sesquipartem longitudinis annulatis, ad apicem lœvibus, corpore nigricante cinereo, fascia laterali capitum alba. *Pygargus.* PALL. *spicil. Zool.* I. p. 10. XII, p. 15. *Tzeiran.* BUFFON *suppl.* XI. p. 304. tab. 20. edit. 12°. *White faced Antelope.* PENN. *quadr.* p. 82. n. 34.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

† Lervia. 8. A. cornubus recurvis, rugosis: corpore rufescente, nucha barbata. PALL. *spicil.* XII. p. 12. n. 2. *Kob,* BUFF. XII. tab. 32. I. (*cornu.*) *The Gambian Antelope.* PENN. *quadr.* p. 91. 42.

Ha-

Habitat in *Gambia*.

* *Gazella*. 9. A. cornubus subulatis, subarcuatis, rugosis.
PALL. *spicil.* XII. p. 17. n. 15. *Algazel.* BUFF.
XII. tab. 33. f. 1. 2. LINN. *syft.* 12. p. 96. 9.
Capra Bezoartica. *Algazel.* PENN. *quadr.* p. 69.
Habitat in *Lybia*, *Egyptia*, *Bengale*.

† *Scripta*. 10. A. cornubus subulatis, rectis, contortis, cor-
poris strigis albis decussatis. PALL. *spicil.* XII. p.
18. n. 18. *Guib.* BUFF. XII. tab. 40. 41. fig.
1. *Harnassed Antelope.* PENN. *quadr.* p. 71.
n. 23.
Habitat in *Senegal* ad *Cap. bon. Sp.*

* *Grimmia*. 11. A. cornibus conicis compressis rectissimis ru-
goso striatis, hinc detritis, fossa suboculari
atra. LINN. 12. p. 92. 2. PALL. *miscell. Zool.*
tab. 1. *spicil.* 1. p. 38. tab. 3. PALL. *spicil.*
XII. p. 18. 19. *la Grimme.* BUFF. XII. & *suppl.*
III. p. 100. tab. 14. *Bouc damoiseau.* VOSM.
monogr. The Guinea Antelope. PENN. *quadr.*
p. 72. 24.
Habitat in *Guinea*, *Cap. bon. Sp.*

* *Regia*. 12. A. cornibus conicis, brevibus convexis basi
rugosis. PALL. XII. pag. 18. n. 20. (*pygmæa*)
LINN. *syft.* 10. pag. 69. 6. *Chevrotain du Sene-
gal.* BUFF. XII. tab. 43. 2. (*cornu*). *The Royal
Antelope.* PENN. *quadr.* p. 73. 25.
Habitat in *Senegal*.

(d) *Cornubus in frontem redundis.*

Tragocamelus. 13. A. cornibus antrorsum incurvis, cervice
jubata, dorso gibbo, cauda longa floccosa.
PALL. *spicil.* XII. n. 13. n. 6. PARSON *Phi-
losoph. transact.* XLIII. p. 465. ubi figura.
Antelope boſſu. *The Indostan Antelope.* PENN.
quadr. p. 73. n. 26.
Habitat in *Indostan*.

† Pic.

† *Picta*. 14. A. cornubus antrorsum incurvis, cervice, colloque jubatis, cauda longa, floccosa, pedibus albo, nigroque annulatis. PALL. *spicil.* XII. p. 14. 7. *le Nylgau*. BUFF. *suppl.* XI. p. 181. tab. 10. II. edit. 12°. *The white footed Antelope*. PENN. *quadr.* p. 74. n. 27. tab. 7. mas & femina.

Habitat in *B. ngala*.

† * *Dama*. 13. A. cornubus antrorsum incurvis, corpore albo, dorso, fasciaque oculari fulvis. PALLAS *spicil.* XII. p. 13. n. 4. *le Nanguer*. BUFF. XII. p. 213. tab. 34. *Swift Antelope*. PENN. *quadr.* p. 76. n. 28.

Habitat in *Senegal*.

† *Redunca*. 16. A. cornubus apice antrorsum incurvis, corpore rufescente subhirto. PALL. *spicil.* XII. p. 13. n. 5. *Nagor*. BUFF. XII. tab. 46. *The red Antelope*. PENN. *quadr.* p. 76. n. 39.

Habitat in *Senegal*.

† * *Saltatrix*. 17. A. cornubus teretibus rectissimis apice sub-incurvis parvis, corpore griseo lutescente. SPARM. *itin.* *Sauteur de roche*. VOSMAER monogr. BUFFON *suppl.* XI. p. 332. tab. 22. edit. 12. *Springer*. PENNANT *quadr.* p. 82. 35.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

† *Arundinum*. 18. A. cornubus laevibus, antrorsum incurvis, corpore griseo cinereo subtus pedibusque albis linea laterali ferruginea. *Ritbok* (Rietbok) BUFF. *suppl.* XI. p. 340. tab. 23. 24.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

† * *Sylvatica*. 19. A. cornubus antrorsum incurvis, contortis, corpore profunde castaneo, subtus albo; clunibus femoribusque posticis albo guttatis. SPARM. *itin.* *Boschbok*. BUFF. *suppl.* XI. p. 350. tab. 25.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

ANTILOPE.

(c) *Cornubus Spiralibus.*

† * *Strepsiceros*. 20. A. cornubus spiralibus, carinatis, subrugosis, corpore striis transversis & spinali albis. PALL. *spicil.* XII. p. 19. n. 21. & 69. *Condoma*. BUFF. XII. tab. 39. *suppl.* XI. trb. 22. p. 222. *Coudou*. VOSMAER *monogr.*

Habitat ad *Cap. bon Sp.*

† * *Cervicapra*. 21. A. cornubus spiralibus, teretibus annulatis, corpore fulvescente adumbrato. PALL. *spicil.* XII. p. 19. *spicil.* I. tab. I. *Capra Cervicapra*. LINN. 12. p. 96. 8. *Antelope*. BUFF. *suppl.* XI. p. 296. n. 18. 19. *Common Antelope*. PENN. *quadr.* p. 78. n. 31. tab. 7. (*mediocris*).

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

(f) *Cornubus Lyratis.*

† * *Saccata*. 22. A. cornubus lyratis, corpore luteo, pectore, abdomine, pedibus albis, stria in dorso posteriore ad caudae basin alba in maculam albam explicabilis. *Gazelle Sautante*. BUFF. *suppl.* XI. p. 312. tab. 21.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

* *Dorcas*. 23. A. cornubus lyratis, corpore fulvo, subtus albo, fascia laterali fusca. PALL. *spicil.* XII. p. 15. *Gazelle*. BUFF. XII. tab. 23. *Capra Dorcas*. LINN. 12. p. 96. sp. 10. *Barbary Antelope*. PENN. *quadr.* p. 81. n. 32. fig. capititis in titulo *Libri*.

Habitat in *Arabia. Syria*.

Kevella. 24. A. cornubus lyratis, majusculis, compressis tergore fulvescente strigis pallidis fascia laterali nigrescente. PALL. *spicil.* XII. p. 16. 12. *le Kwel*. BUFF. XII. tab. 26. *The flat horned Antelope*. PENN. *quadr.*

Habitat in *Senegal*.

Corinna. 25. *A. corunbus* sublyratis, rectiusculis, tenuibus lævigatis, corpore fulvescente, subtus albo, fascia capitis laterali alba. PALL. *spicil.* XII. p. 15. *Corinne.* BUFF. XII. tab. 27. & 31. f. 3. 4. *The spotted Antelope.* PENN. *quadr.* p. 89. 38.
Habitat in *Africa, Syria, Persia.*

Bubalis. 25. *A. cornubus* crassis lyrato contortis, rugosis, apice directis, capite caudaque elongatis. PALL. *spicil.* XII. p. 240. tab. II. *The Cervine Antelope.* PENN. *quadr.* p. 90. 39.
Habitat in *Barbaria, & Africa australi.*

† Pygarga. 27. *A. cornubus* lyratis, collo sanguineo, tergo-re fusco lutescente, fascia laterali saturata clune alba. PALL. *spicil.* XII. p. 15. 10. *Koba.* BUFF. XII. tab. 32. 2. (*cranium cornutum*) *The white Antelope.* PENN. *quadr.*
Habitat in *Syria, Africa.*

† Gutturosa. 28. *A. cornubus* lyratis, corpore rufescente scopis genuum nullis. PALL. *spicil.* XII. p. 1. & p. 46. tab. 2. 3. *la Goitrée.* *The Chinese Antelope.* PENN. *quadr.* p. 84. 36.
Habitat in *Dauria, Mongolia, Thibet, China.*

† Saiga. 28. *A. cornubus* distantibus lyratis, pallido diaphanis, naso cartilagineo, ventricoso. PALL. *spicil.* XII. p. 14. 4. p. 21. tab. I. *The Scythian Antelope.* PENN. *quadr.* p. 86. 37.
Habitat in desertis a *Danubio* ad *Inceperum* pl.

O B S E R V A T I O N E S.

- I. Genus hoc naturale, cervos, Hircis conjungens a LINNÆO inter utrosque dispersum, celeb PALLAS segregavit, quem omnes secuti Zoologi nomenclatores. Habitus plane cervi, sed cornua simplicia, nec tamen hircina, annulata, sinus lacrymales nulli, cauda quibusdam brevis, longa aliis, soli Gnou equina, sexus sequior aliquando cornuta, plerisque & non tantum omnibus, scopi pilosi ad genua anteriores.

2. Quamvis hisce signis diagnosticis primo intuitu pateat genus, nihilominus, species, difficilius dignoscuntur, antequam cl. PALLAS in XII^o. fasciculo spicilegiorum eos signis satis certis distinxerat, viginti duo species, quibus ego sex addidi, quos doctiss. ALLAMAND descripsit, in editione Amstelodamensi operis BUFFONII, quosque dein celeb. comes DE BUFFON in supplementis suis, unacum FORSTERI observationibus de iis animalibus transtulit; celeb. PENNANTUS, aliquibus novas observations addidit in doctiss. opere *History of Quadrupeds* 4to Lond. 1782.
3. Quoad species, pauca en PALLASSIO, BUFFONIO, PENNANTO currente calamo addam, *Antilope gnou* animal singulare *Bovem* inter & *Cervum*; vidi vivum & infarctum: icon quam dedit BUFFONIUS melior ea, quam dedit celeb. ALLAMAND nec tamen accurata. Pulcerrimam mihi monstravit amicissimus VOSMAER, qui jam monographiam huius animalis molitur —
2. *Antilope Leucophæa*, non est cœrulea, (hicce color nulli quadrupedi datur, nec ullus color primarius), sed plumbeo cœrulescens; error est KOLBI, qui & multos habet alios, 4. *Oryx* sive *Pasan*. *Oryx* eponyme PLINIO, COLUMELLÆ, MARTALI, MACROBIO nota. Vidi Pellem & cornua hujus animalis, pulcerrimi, rubro fuscum albo nigroque eleganter maculatam & striatam in capite & pedibus. — *Leucorycem* non vidi, icon PENNANTII, haud accuratam tamen ex eo suspicor, quod cornua, non annulata & quadrangula depicta sint. — *Oreas*, icon BUFFONII & VOSMAERII ambæ bonæ, skeleton animalis in museo Principis arausiaci. — *Antilope grisea*, Zoologorum ingenia magnoperé torsit, nec *Gutturosa* est nec *Bezoartica* nec *Tsheren*, sed propria species, ex *Capite bonæ Spei* ante paucos annos adlata, definitionem speciei ad ipsum animal construxi olim; apud *Amicissimum KLOKNERUM* cum id pro museo D. VAN LENNEP paraverat, nunc in Museo *Societatis Harlemensis*; ipse doctiss. PALLAS id non vidit nec descripsit; graphice descriptum a BUFFONIO suppl. l. c. — *Agazel* animal Persis, Arabibusque notissimum, gregarium; nomen *Bezoarticae* quod LINNÆUS illi indidit secundum KÆMPHÆRUM potius *Orygi* sive *Pasan* conveniret, si solum illud animal pretioso isto lapillo donatum fuisset.

set. — *Grimmiam* hujus gentis pulcerissimam graphicè descripserunt cl. VOSMAER & PALLAS. — *Antilope regia* minima hujus generis, *moschum* Pygmeum crederes, sed cornuta & color dilute ocreaceus (couleur Isabelle). — *Picta*. Hanc non cl. PENNANT primus notam fecit, ut dixit unicus PALLASSIUS sed HUNTERUS eam antea descripserat in LXIº. volumine *Philosoph. transact.* 170. tab. v. teste ipse PENNANTIO hist. of quadr. p. 74. in nota. — Dama probe distinguenda a *Cervo Dama*, huic cornua palmata ramosa. dum Damis redundis ut ait PLINIUS. — *Saltatrix*, *Arundinacea Sylvatica* plane nova, nuper modo a doct. ALLAMAND descripta, animalia; *capensis* & nuperrime à celeb. SPARMANN. in itin. cap. vid tab. 6. 8. in museo Leidenſi & Principis Arausiaci, quantum scio sola conspicienda. — *Strepsiceros* magnitudine *Equi*, vel *Bovis*, pulcerissimum animal, variat colore, atque maculis genarum, omnibus tamen angulus albus frontalis, litteram V. referens; exstat in museo Harlemensi; icon VOSMAERII *Cornua* non satis longa habet & nimis perspectivè delineata. — *Saccata* striga alba dorsalis, in maculam circularem expanditur, ubi animal velocissimo cursu, fugit. — *Dorcas antiquitus* nota, est *Tzebi* Biblica, quæ tamen in bibl. *Vulg.* caprea audit, ut & in Syriaca versione quam versionem secutus est BOCHART in *Hierozoicis*, recte SHAWIUS Dorcadem *Antilopen* dixit (vid itin. II. p. 277. edit Belg. Ultr. 1773. & notam cl. TYDEMANNI meamsque.) — *Bubalis* graphicè a BUFFONIO descriptum animal, veteribus notissimum, ut ex ARISTOTELE, PLINIO, OPPIANO videre eum *Zachmūr* Biblicum esse demonstravit SHAWIUS itin. p. 28. — *Gutturosan* atque *Saigam* differte & eleganter descripsit doctiss. PALL. spicil. Zool. XII. Multo plura adhuc adderim notabilia, sed nimis inde excrescere observationes vereor.

XXXI. HIRCUS. CAPUT: oblongum *cornubus*, compressis, carinatis sursum versis, scabris, mentum maris arunco longo dependente ornatum.

CORPUS: pilosum, cauda brevis.

† *Ægagrus*. 1. *H. cornubus* arcuatis carinatis, rugosis basi approximatis apice divergentibus, capitē anticē nigro, arunco gulaque castaneis. PALLAS *spicil.* XI. p. 45. tab. 5. f. 1. 2. (cranium) *le Bouc Sauvage*. *The Caucasian Ibex*. PENN. *quadr.* p. 51. n. 14.

Habitat in *Caucaſo*, *Tauro* in montibus *Khorazan*, *Persiae*.

* *Ibex*. 2. *H. cornubus lunatis*, rotundis, supra nodosis in dorsum reclinati. PALL. *spicil.* XI. p. 31. tab. 3. tab. 5. fig. 4. *cornu*. LINN. 12. p. 95. 2. *Bouc étaïn*. BUFF. XII. tab. 13. *Ibex*. PENN. *quadr.* p. 49. 13.

Habitat in montibus *Corpathicis*, *Pyrlnaïcis*.

* *Hircus*. 3. *H. cornubus carinatis arcuatis*. LINN. 12. p. 94. 1. *Bouc*. BUFF. V. tab. 8. *Chevre*. tab. 9. *The goat*. PENN. *quadr.* p. 53. α.

Habitat in *Europa* usque ad *Norvegiam*.

β. *Hercus angorensis* *cornubus magis spiralibus pedibus brevioribus*, pilo longiore fere ad pedes descendente. *Bouc d'Angora*. BUFF. V. tab. 10. 11. *Angora goat*. PENN. *quadr.* p. 55. β.

Habitat in *Angora*.

Mambricus. 4. *H. cornubus reclinatis*, auribus pendulis, gula barbata. LINN. 12. 95. *Chevre du Levant*. BUFF. XII. *The Syrian Goat*. PENN. *quadr.* p. 56. γ. tab. 5.

Habitat in *Syria*.

Depressus. 5. *H. cornubus depressis incurvis minimis cranio in*

incumbentibus. LINN. 12. p. 95. 5. *Bouc d'Afrique*. BUFF. XII. 18. 19. PENNANT quadr. p. 57. 17.

Habitat in *Africa*.

Reversus. 6. *H. cornubus* erectis apice recurvis. LINN. 12. p. 95. 6. *Bouc de Juda*. BUFF. XII. tab. 20. 21. *The widow Goat*. PENN. quadr. 57. 8.

Habitat in *Africa*.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Proximus *Antilope* Hircus, ita ut Ibex facile pro illo sumi posset, differt tamen arunco, cornibus carinatis rugosis.
2. Hircos domesticos ex Ibice ortos posuit illust. BUFFONIUS, ex alio quem *Aegragum* dixit, docte demonstravit PALLAS.
3. Species citatas modo pro varietatibus habet PENNANTUS, idem suspicatus ERXLEBENIUS, de iis dubius haereo.
- Cl. PALLAS Hircos cum ovibus conjungi debere genere jubet ubi ait: *Argali seu Musimon Asiaticus cum Ibice & Capris conjugendus genere*; qua de re dubito, ut in observationibus ad *ovinum* genus perpendam.

XXXII. OVIS. CAPUT: *Cornua concava, intorta, rugosa aures penduli, frons subnuda glabra.*

CORPUS: *lanatum, cauda longiuscula.*

Argali. 1. *O. cornubus* arcuatis, semicircularibus subtus planiusculis, palearibus laxis. LINN. *syst.* XII. p. 97. 12. (*capra ammon*) *Mouflon*. BUFF. XI. tab. 29. *Argali*. PALL. *spicil.* XI. tab. 1. 2. *The wild Sheep*. PENN. quadr. p. 38.

Habitat in *Asia boreali, Sardinia, Corsica*.

***Aries.** 2. *O. cornibus compressis lunatis, corpore lanato*. LINN. 12. p. 97. 1. *le Belier*. BUFF. quadr. v. K 2 tab.

tab. 1. la Brebis ibid. tab. 2. the Sheep. PENN.
quadr.
Hospitatur ubique.

* $\alpha.$ *polyceros tricornis.* BUFF. XI. tab. 31. *Belier de Islande.* PENN. *quadr.* p. 34. tab. 3. n. 3. fem.
quadricornis. BUFF. XI. tab. 32.
Habitat in Islandia.

$\beta.$ *Quadrincornis. cornubus quatuor: duobus rectis erec-*
tis, duobus incurvis lateralibus, collo piloso
corpo lanoso. PENN. *quadr.* pag. 34. tab. 3.
 n. 2.

Habitat — — —

$\gamma.$ *Cretensis. O. cornubus erectis spiralibus carina-*
*tis. O. *Strepficeros.* LINN. p. 98. Belier de Wal-*
lachie. BUFF. *suppl.* v. tab. 7. 8. edit. 12^o. *The*
cretan Sheep. PENN. *quadr.* p. 33. B. tab. 3. 1.
(caput).

$\delta.$ *Steatopyga.* Capite anterius incurvo, auriculis
 magnis pendulis, carunculae gutturales ad collum,
 pulvinar adiposum ad basin caudæ brevis. PALL.
spicil. XI. p. 80. tab. 4.

Habitat in Kergisia.

$\varepsilon.$ *Laticauda.* Cauda longissima adiposa. *Le Mou-*
ton de Barbarie. BUFF. XI. tab. 33. LINN. 12.
 p. 97. *The broad tailed Sheep.* PENN. *quadr.* p.
 35. G.

Habitat in Arabia, Barbaria, Syria, Podolia,
Ukrania.

$\zeta.$ *Adimain, auribus pendulis, palearibus laxis,*
pilosis, occipite prominute. — Ovis Guineen-
sis. LINN. 12. p. 98. 2. *Belier des Indes.* BUFF.
 XI. tab. 34. 35. 36.

Habitat in India.

$\theta.$ *Capensis cornubus minimis incumbentibus, capite*
crassiore, auribus pendulis, clune adiposa, cauda brevi
sive

sive nulla? lana pilosa. PENN. *quadr. tab. iv.*

Cape Sheep.

Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

OBSERVATIONES.

- I. Genus ovinum caprino arête junctum, credit clariss. PALLAS ego sententiae tanti viri, lubens accederem, si non aliqua (forsan levioris momenti) obstantem: videamus; cuique animalium domesticorum generi, patrem ferum competere concedo; nec ullus rei Zoologicæ gnarus inficias ibit; videmus canem ex *Lupo*, *Chacal* & *Hyæna* ortum. *Hircum* ex *Ægagro* natum. & forsan *Ibice*, palam est, *Musimonem* oves dedisse ex veterum testimonio patet (sic VARRO ait) de *Theriotrophio* *FULVII LUPINI*, etiam præter alia animalia continere *Oves feras*. — In *Sardinia*, *Corfica*, (ubi adhuc lète viget *Musimon* sive *Argali*) nasci *Arietes*, qui pro Lana pilum habent dixit STRABO lib. v. — *Sylvestres* ac feros Argales; ovibus domesticis admissos hirtos agnos edidisse paterni coloris, & hos Tarentinas oves ineuntes prolem dedisse avito colore, sed materna mollitie, tradidit COLUMELLA Lib. vii. ex Experimento patrui. *Musimon* ergo pater ovium, hoc patet. — *Musimon* ille, habitat in *Asie* montibus *Tauri*, *Caucasi*, in montibus *Mongolicis*, *Tongusicis*, *China*, *Kamtschatka*, ubi ab *Ibice* non distinguitur; inhabitat in *Africa* & in *America*. Animal agile, astu venatores decipiens. Hæc de *Musimone*. Videamus iam *Ægagrum*, capite caprino aruncato, loro longitudinali atro, *olla* cranii magis porrecta, dein in excelfioribus *Caucasi*, *Taurique* jugis, & *Europeis* *Alpibus* vivit, dum *Argalis* sive *Musimon* regiones *Alpestres* inferiores apricasque collit, præterea *Argali* & annosissimo nuncquam *Arunicus* qui *Hircis* pro diagnosis, huic & sinus lacrymales insignes, quo plane parent oves, nec *Hirco* antra *Inguinalia*; dein an *Ægagrus*, *Musimonis*, adulterino coitu speciem hybridam reddat, nescio, dubito; saltem hircos domesticos oves non inire scio; fateor lubenter servitutem domesticam, feras temporis spatio, yehementer mutare, clima, solum, vietus incredibilis

efficere mutationes, docet hoc quotidiana abunde experientia, sed quamvis mutentur figuræ, pelles, magnitudines, mores; nuncquam tamen hocce modo partes diagnosticas adimit vel addit natura, nuncquam, aruncus in doméstico statu crescat ovi, nec eo carebit Hircus, sinus lacrymalis, antrum inguinale manebunt generi *Ovino* propria, ut de vietu, moribusque ovium alienis ab Hircorum vivendi methodo sileam, solum modo loquor de cæuda ovina, plerisque longa, adiposâ crassa, Hircis brevissima, solis vertebris, paucissimis musculis sed crassiore pilo constructa; ex his & aliis ego itaque concludo, *Ovis* si non genere (quod tamen mea sententia) saltem familia differre ab hircis, quorum pater *Egagrus*, dum ex *Argali* oves nati; ceterum hac de re legi merentur quæ scripserunt Ill. comes BUFFONIUS amicissimique viri PALLAS & ZIMERMANNUS ne amplius de Lana caprina disputem.

2. *Ovis communis*, maximi usus, præsertim Lana, optima est quæ mittit *Hispania*, cedit illa tamen Lanæ Caremanie, magnatibus, sacerdotibusque dicata, inde rarissime eam videt Europæorum mercatura, *Lana Hispanica* quam primam vocant, succedit quam *Britannia* mittit. — Rarissime in *Hollandia* *aries Cornutus*. — *Laticauda* in *Syria*, *Barbaria*, communis, cauda iis adeo longa & ponderosa, ut Pastores eas curriculo quodam imponere cogantur, ne solo asperiore læsa minores evadant pretii, in epulis enim maxime desiderantur, ob saporem, adipis & medullæ intermedium, talis aliquando cauda ponderis L librarum. Lana horum optima ut supra dixi, vestis enim ex tali Lana Thibetiana 150 roupæs constat. veteribus, *Iudæis Græcis*, *Romanis* hæcce ovis cognita. — In *Ore Steatopyge* clunes hæmisphærii nudi, toti, quanti adiposi, & talis magnitudinis ut si ovis ipsa ponderat 200 libras, ejus clunes 40 sint librarum; Tanta eorum copia nutrit *Tataria* ut quoque anno 150,000 Orenborgi tributi instar solvantur.

XXXIII. BOS. CAPUT: cornua concava, luna-ta lævia, frons pilosa ro-strum obtusum, sub quadra-tum.

CORPUS: torosum, cauda medi-ocris apice fetosa; toto.

Pedes: crassí torosi bisulci.

Urus. I. B. cornubus crassis brevibus, sursum flexis, fron-te crispa.

Ex eo.

α. Bos europaeus cornubus teretibus, extrorsum curvatis palearibus laxis. LINN. 12. p. 98. I. Taureau. BUFF. IV. tab. 14. Bull Ox. PENN. quadr. p. 15. 6.

†β. Bos indicus, cornubus brevioribus, topho dor-fali. Grand Bœuf des Indes. Great Indian Ox. PENN. quadr. p. 16. A. tab. I. sig. in-ferior.

Habitat in Indiis.

γ. Zebu, cornubus brevioribus erectis, topho dor-fali. LINN. 12. p. 99. 6. Zebu. BUFF. XI. tab. 42. The little Buffalo. EDW. birds IV. tab. 200. The little Indian Ox. PENN. quadr. p. 17. tab. I. sig. super.

Habitat in Indiis.

δ. Inermis, cornubus soli vellere adnatis. PENN. quadr. p. 17. C.

Habitat in Abyssinia.

ε. Tinianus, albus auribus atris. PENN. quadr. p. 17. E.

†η. Adelensis, auribus pendulis, dorso tophoso. PENN. quadr. p. 17. D.

θ. Bison cornubus surium reflexis, dorso gibbosio, capite pilis longissimis obsito. LINN. 12. p. 99.

3. *le Bison*. BUFF. *suppl.* III. *tab.* v. VOSMAER
monogr. *The Mexican Bul.* PENN. *quadr.* p.
 19. H.

Habitat in *America*.

†* *Moschatus*. 2. B. cornubus magnis, juxta basi, pro-
 pemodum junctis, juba longissima moschum
 redolens. *Naturf.* xix. 92. *tab.* 5. *Bœuf*
Musque. BUFF. *suppl.* VI. *tab.* v. *Caput.*
The Musk Ox. PENN. *quadr.* p. 27. 9. *tab.*
 2. *fig.* 2.

Habitat in *nova Mexico*.

†* *Caffer*. 3. B. cornubus basi crassissimis, subcomplanatis,
 rugosis fronti incumbentibus, attenuatis deor-
 sum inclinatis, sursum resurgentibus apice acuto.
ZIMMERM. geogr. Zool. p. 90. *le Bœuf Caffre.*
SPARM. Schwedisch. Abh. 1779. p. 79. *tab.* 3.
itin. *tab.* 7. *infer.* *Cafer*. PENN. *quadr.*

Habitat in *Africa* anteriore.

Bubalis. 4. B. cornubus compressis, resupinatis, sursum
 reflexis, fronte crista. *ZIMMERM. geogr. Zool.* p.
 90. 8. *le Buffle*. *BUFFON tom. XI tab. 25. Buffa-*
lo. PENN. *quadr.* p. 24. 8. *LINN. syst. 12.* p. 99.
 Habitat in *Africa*.

† *Nanus*, 5. B. cornubus basi distantibus, apicibus approxi-
 matis, cauda subequina pedibus brevioribus.
Dwerf Ox. PENN. *quadr.* 31. *tab.* 2. n. 3. *Cor-*
nua. Bœuf nain.

Habitat in *Morocco*.

Grunniens. 6. cornubus teretibus introrsum curvatis, cauda
 equina. ERXLEB. p. 237. Linn. 12. p. 99. 4.
Sarloc nov. comment. Petrepol v. p. 339. *tab.*
 7. *Bos Tangutanus*. PALL. *neue Nordische Beytr.*
 II. *The horsetail Ox.*

Habitat in *Asia boreali*.

O B S E R V A T I O N E S .

I. Omne animal domesticum, a fero, nec hominis imperio subdito ortum duxisse, quis ignorat? vidimus hoc in Cane, Hirco, Ove, Videbimus & in Equo, & asino, Utilissima itaque Bovum familia ex Bove fero nata, etiam adhuc dum, quamvis domestica, servitutis jugo, subdita, avitos mores, pro parte conservans, a fero indomitoque patre natam satis superque monstrat, imo multo magis ad originem accedit figura & moribus, quam lanigera imbellisqne timida gens *Ovium*.

Pater ille & gentis Bovinæ conditor *Urus Cæsari* in *Germania* bella gerenti visus, hodie rarus, *Uri* enim olim per omnes Europeæ sylvas dispersi, jam nunc hodie pene extinti, cum homo loca illa sylvosa in usus suos convertit; nostris diebus itaque *Urus* in sylvis vastissimis Lithuaniae in celsis Caucasi jugis oberrat, haud tamen borealior *Europa* Bovum proavum continet, nec eum alunt regiones boreales *Aſie*.

Et ille inter Nepotes numerat Bifontem Americanum climate ac vietu a paterna figura mutatum. Solidis argumentis suspicatur clarissimus PALLAS *Urum* Americam patriam agnoscere; (*neue Nord. Beytr.* 1. p. 1.) & cum *America* borealis, *Aſie* tam Septentrionali adeo prope adjecta sit, ut ambas istas mundi partes olim cohæsissile non mihi alienum atque Paradoxon videatur. (Vide chartam geograph. Zoologicam doctiss. ZIMMERMANNI edit germ. chartam ultimi itineris celeb. COOKII etc.) *Urus* ex *America* in *Europa* migrans, molle vellus, Americanæ imbecillitatis signum, in Europeum vigorem mutavit; & ita quidem ut *Urus* in bifonte vix inveniatur, si Icones fideles REDINGERI ubi *Urus*; cum illa VOSMAERII exacta (vidi enim bifontem) comparantur. — *Urus* sub nomine *Aurochs*, cuique notus, maximus est ruminantium, nec *Rhinoceroti* multum cedit qui 10' 3'' longus, & altitud dorsi 6'.

BUBALIS vero ferus adhuc dum ignotus, ferus enim ille de quo memorat KOLBE atque eum luteo fuscum ait, est *Bos Caffer*, cuius caput, nostri bovis capite duplo majus, vidi, quemque doctiss. SPARMANN nuper de-

scripsit in act. Holm. 1779. *Africanus* ille, dum *Bubalis Asiaticus* ex elevatiore Thybethi regione atque Indiae borealibus, ortum duxit, & inde, mansuetus, *Chinenibus, Indiæ incolis*, servus domesticus evasit. *Bos grunniens* sive *Equinus* aliam familiam dedit ex Thybetano regno oriundam; hujus historiam, docte & eleganter dedit celeb. PALLAS.

Ex Bisonte natas topo dorsali gibbosas varietates mihi verosimile.

2. Inter obscuras species, videtur *d'ante*, de quo *Leo Africanus, Marmol* aliquique itineratores loquuntur & ex iis Doct. PENNANT *quadr. 17.* albus, pedibus teretibus, tantæ celeritatis, ut equum arabicum prævaleat, si vero equus celerior bove, mille aureorum centesimis; sive centum Camelorum; hanc Bekker & Wash esse perperam tradidit ERXLEBEN, nec etiam pro bove nano PENNANTII haberri potest.

Inter Europeos boves domesticos primum locum occupant, quos mittit *Holsteinia & Jutlandia*, hos a latere premunt *Podolienses, Ucranienses, Germanis* nomine *blauwe ochsen* noti. Annuatim 80, vel 90, 000 *Koningsbergæ, Berlinique* mittuntur, optimi 100 nummis argenteis (*Ryksdaalders*) sive 20 £ sterl. constant inde regiones illæ quotannis 6, 300, 000 Ryksdaalders accipiunt.

Veteribus pro poculis, *Uri cornua* in amplissimis epulis ut ait CÆSAR.

Bos nudus & Anoa species haud satis cognitæ.

XXXIV. CAMELUS. CAPUT : longum, labium superius propendens, aures breves *cornua* nulla.
 CORPUS : collum longum teres, dorsum, vel pectus tophosum; cauda brevis, corpus sublantum.
Pedes : longi, subdidactyli.

*Bactrianus. 1. C. tophis dorsi duobus. LINN. 12. pag. 90.
 2. *le Chameau*. BUFF. XI. tab. 22. *The bactrian Camel*. PENN. quadr. 120. n. 158. β.
 Habitat in desertis *Aſie* intra *Chinam & Indianam*.

*Dromedarius. 2. C. topho dorsi unico. LINN. 12. p. 90.
 1. *le Dromadaire*. BUFF. XI. tab. 9. *One bunched Camel*. PENN. quadr. p. 117. 58.
 Habitat in *Arabia*.

Llama. 3. C. dorso lævi topho pectorali. LINN. 12. p. 91.
 3. *Le Lama*. BUFF. suppl. XI. tab. 27. edit 12°.
Llama. PENN. quadr. 121. 59.
 Habitat in *America*.

Paco. 4. tophis nullis, corpore lana molli, tecto. LINN. 12.
 p. 91. 4. *Vigogne*. BUFF. suppl. XI. p. 378. tab.
 28. edit. 12°. *Pacos*. PENN. quadr. p. 124. n. 60.
 Habitat in *Peru*.

O B S E R V A T I O N E S

1. Inter animilia domestica Camelus solus, sibi similis mansit, aut si mavis nuncquam ferus fuit, omnium enim animalium domesticorum primævæ originis vestigia restant. Cameli nulla, adeo adhuc *Urus*, *Lapus*, chacal sive *Lupus aureus*, *Argali*, *Ægagrus*, sed Camelini generis pater aut deletus, aut nuncquam extitit.

- exstlit; Camelus enim in statu naturali in planis *Tataria*, *chinaeque* confinia degens, ab omni parte, domestico similis, solum celeritate atque fortitudine illum superans, hi feri Cameli omnes duplici instruuntur topho dorſali, an itaque *Dromedarius* generis auctor sit, videtur tanto magis, quum cum Bactriana femina felici successu copuletur.
2. Ingentia pondera ferre par est, dantur qui 1500 lib ferunt, minoribus 600 satis. Patria *Asia* est a gradu 60° latitudinis, (nec fortiori frigori pares.) Inde descendunt, atque Tatariam *Crimmiam*, *Circassiam*, *Natoliam* visitant; & ad *Palestinam*, *Arabiam* progrediuntur, a calido illo climate descendut in *India*, *Malabar*, *Ceilon*, *Siam*, *Pegu*; & eos ait *Africa* Septentrionalis tot animalium ferax. *Europa australior*, solum modo quatenus *Tarcarum* se extendit imperium, Camelum possidet, res est miranda, quod dum Europee australioris ferre valeat aëris temperaturam Camelum non magis ad officia colatur domestica. Ceterum de Camelio vide *BUFFONIUM* tom. xi. *PENNANTUM* l. c.

Aequo ac Orientalibus pretiosissimus Camelus qui iis inter thesauros jure censetur, sic Americanis *Llama* animal in *Europa* nuper modo advectum, ante Hispanorum in America infelicem adventum, *Llama* solum atque unicum animal oneriferum, Edulis caro ovem sapit. Mulorum instar raro vel nuncquam titubant, celsissimaque *Andarum* atque semitas angustissimas certo stabiliisque pede, metallis Peruvianis onerati transeunt.

Lanam non habent sed pilos, Peruvianis expeditos qui eos Lanæ conjungentes inde vestimenta ordiuntur.

Pacos ejusdem naturæ ac *Llama*, frigoris saevitiam magis induat, Lana ei pulcherrima nomine Lanæ vigoniae per totam *Europam* celebris; coloris rubri imo rosei dixerunt aliqui Zoologi, perperam tamen, nec ruber color datur alicui quadrupedi, excepto simiæ *Miconi* teste *CONDAMINE*, colorem esse rosarum siccaram dixit cl. *PENNANT*; id vero similius, cum hæ ad ochraceum pallidum (couleur d'Isabelle) tendunt, secundum *BUFFONIUM* autoptam sunt rubro fusci ad vinaceum tendentes pro maxima corporis parte, ceterum Isabellæ coloris.

Llaman *alpaca* nondium satis cognita.

Ceterum de *Llama* & *Paco* vid. BUFFON l. c.

UNGULATA non ruminantia.

XXXV. SUS. **CAPUT**: *rostrum* productum, *conicum* truncatum, mobile; *aures* penduli, *oculi* parvi.

CORPUS: *collum* fere nullum, *corpus* pilosum, *pilis* fetisque *obsitum*. *Cauda* longiuscula vel nulla.

Pedes: breves.

*Tajassu. 1. S. dorso cystifero, cauda nulla. LINN. p. 103.

3. *Pecari ou Tajaçu*. BUFF. x. tab. 3. *Mexican Hog*. PENN. quadr. p. 133. 64.

Habitat in *America*.

*Setofus. 2. S. dorso antice setoso, cauda pilosa. LINN. 12. 102. 1.

α. *Aper* Sanglier. BUFF. v. 14. *Wild Hog*. PENN. quadr. p. 126. niger.

Habitat in *Europa australi*.

β. *Domesticus*. *Cochon Verrat*. BUFF. v. tab. 16. *Tam Hog*. PENN. l. c.

γ. *Chinenensis*, ventre ad terram usque (fere) pendente, cauda pilosa. BRISS. *Cochon de Siam*. BUFF. v. p. 15. *The Chineesche Hog*. PENN. quadr. p. 128. 2.

Habitat in *India, Gilolo, Nova Guinea*.

*Baberoussa. 3. S. dentibus caninis frontem versus reclinatis. LINN. 12. p. 104. n. 5. *Babirousa*. BUFF. XII. tab. 48. *suppl.* III. tab. 12. *Cranium. The Indian Hog*. PENN. quadr. p. 134. n. 65. tab. 14. 1.

Habitat in Moluccis.

*Angalla. 4. S. rostro longiore, latissimoque, glandulis facculoque sub oculos. ERXLEBEN p. 187. *Sau-glier d'Afrique*. VOSM. monogr. *Aper Ethiopiopicus*. PALL. miscell. 16. tab. 2. spicil. II. tab. 1. LINN. 12. tom. III. p. 213. *African Hog*. PENN. quadr. p. 130. 62.

Habitat in Africa.

Guineensis. 5. S. dorso posticé setoso, cauda longitudine pedum, umbilico cystifero. LINN. 12. p. 103.
2. *Cochon de Guinée*. BUFF. XI. *The Guinea Hog*. PENN. quadr. p. 108. 2.

Habitat in Guinea.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Transitus a ruminantibus ad non ruminantia fieri operis suis Tajassu sive Pecari, docet Anatome, qua patet stomachum unicum quamvis, figura tamen exterius, atque structura interiore, ruminantium & non ruminantium esse intermedium, (vid. BUFF. x. tab. 7. S. 9.) dein & sues monunguli in *Suecia* dari dixit LINNÆUS. — Suem *Pecari*, quidem cicurari sed non noscere hominem, qui eum curat, contraria mihi docuit *autopsia*, Marchio de St. Simon per aliquot tempus ipsa aluit Tajassu, qui virum illustrem canis instar sequebatur, dum per prædium ambulabat.
2. Quamvis ex Apro stemmatis porcini primo ortus, itaque sui domestico congener sit, tamen non cum eo, nec alio Porco copula jungitur.
3. Ubique dispersus *Sus*, si modo frigori intentiori haud exponitur, in calidis *Americes* vehementer multiplicatus. Apro carere *Angliam* scribit PENNANT. in *Ceilona*, *Celebes*, *Java*, magna eorum copia, in *Americes* australioris sylvis multi sues antea domestici jam nunc ad statum primævum delapsi crotalum horridum devorant absque noxâ. — Vulva Porcina Romenis in deñiciis.
4. Suem Babyroussa, veteribus notum fuisse patet ex nomine quo apud ATHENAEUM exstat, qui eam $\tau\epsilon\tau\rho\chi\eta\pi\eta\omega\gamma$ dixit & reverâ laniarii insolitæ magnitudinis, curvati,

in frontem reduuci, primo adspicu cornua mentiuntur, unde etiam germanis *Hirsch Eber* (aper cervus) & Belgis *Hoornvarken* (*Sus cornutus*).

5. De *Engalla* nihil dicam; graphicè ab amiciss. PALLAS & VOSMAER descriptus.

XXXVI. EQUUS. CAPUT; propendens, longum, *collum* jubatum, compressum.

CORPUS: subcylindricum, dorso subdepresso. **Cauda** crinita.

Pedes: monunguli.

† *Ferus*. 1. E. auribus longioribus, juba crispa brevi, corpore nigro griseo (murino) cauda breviore. PALL. comment. petropol. nov. p. 394. tab. 7. GMELIN Jun. itin. 1. p. 45. *Cheval Sauvage*. *The wild Horse*. PENN. quadr. p. 2.

Habitat in *Arabia*, *Tataria* in *Xensi*, *Chinæ*, in *Woronesk*, *Russia*.

* a. *Domesticus*, auribus brevioribus, colore varians, nuncquam murino. LINN. 12. p. 190. 1. *Cheval*. BUFF. IV. tab. 1. *The Horse*. PENN. quadr. 1. ex hocce.

(a) *Equus arabs* sive *barbaricus*. MART. ad BUFF. I. tab. 1

* (b) *Hispanus* *ibid. tab. 2.*

* (c) *Anglicus* *ibid. tab. 3.*

(d) *Neapolitanus* *ibid. tab. 3.*

* (e) *Frisicus* *ibid. tab. 5.*

† *Hemionos*. 2. E. capite magno, labiis crassis, auribus longis, collo tereti, juba erecta, corpore pallide luteo, pectore subcarinato, cauda bovitia. *Dshiggetai*. PALL. neue Nord. Beitr. II. p. 1. tab. 1. *le Dshiggetai*. *The Dshikketei*. PENN. quadr. 4. 2.

Habitat in *Mongolicis* regionibus.

Onager. 3. E. capite magno arcuato, auribus longissimis capitatis, colli juba brevis erecta; colore stramineo, stria, subtus, pedibus albis. PALL. neue Nord. Beitr. II. p. 22. tab. 2. *Ane Sauvage. Wild Ass or Koulan.* PENN. quadr. p. 8. n. 3. Habitat in desertis Argunis.

**Afinus.* 4. E. cauda extremo setosa, humeris cruce nigra. LINN. 12. p. 100. 2. *l'Asne.* BUFF. IV. tab. 11. *The tam Ass.* PENN. quadr. 1. c.
Habitat ubique exceptis borealibus.
Ex Afino & Equo.

* α . *Mulus*, figura atque habitu Eq. *Hemioni Mule.* BUFF. suppl. III. tab. 1.
 β . *Hinnus* ex *Afina* & *Equo.* LINN. 12. p. 101. 7.

**Zebra.* 5. E. corpore albido rufescente fasciis transversis, fuscis. LINN. 12. p. 102. 3. *Zebre.* BUFF. XII. tab. 1. 2. *Zebra.* PENN. quadr. p. 13. 4. EDW. glean. tab. 222. KNORR delic. Select. II. tab. K. 8.
Habitat ad *Cap. bon. Sp.*

\dagger *Quagga.* 6. E. capite caudaque fasciis corpore fuscis, subtus albo. *Kwagga.* BUFF. suppl. XI. p. 150. tab. 7. *The Zebra female.* EDW. glean. 223. *Quacha.* PENN. quadr. p. 14. 5.
Habitat in *Caffrorum* regione.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus *Equi* ut supra dixi insulatum (*isole*) nec alii ad fine; patrem stirpis adgnoscere Equum ferum, demonstravit Doct. PALLAS; ejus copula cum *Onagro* dedit *Hemionum* sive *Equum asininum* pulcherrimum animal; *Onager* itaque auribus, cauda, capite asinum loquitur; veteribus ille jam notus uti ex *Varrone de re rust.* Lib. II. c. 6. PLIN. Lib. 8. c. 15. & 44. OPPIANO *Cyneget.* III. vs. 185. satis & abunde patet,

an.

ante PALLASSIUM vix notus. *Calmuccis Kulan.* Persis *Kuhrhan.* Pellis ejus non ex se granulosa ut voluerunt BUFFONIUS & alii, sed arte fit non modo *magni* sed & Equi tergore impressione feminis Chenopodii cuiusdam, post impressionem raditur pellis, lixivio maceratur, siccatur, turgescunt maceratione semina, sicque fit illud corium granulosum. Turcis nomine *Sagri* in pretio, nobis segrin vel sagrin dictum; verum satis rarum nobis Hollandis; inde aliud fabrefacit Anglorum & Batavorum ucripeta industria, sed quomo-
do nescio. Pulcerimam lectu dignissimam Onagri His-
toriam dedit cl. PALLAS *neue Nord. Beitr.* II. p. 22.
tab. 2.

3. Zebram cum Afina coire felici successu, vidit *ela-*
riss. CLEVE; nec tamen successisset experimentum nisi
Afina coloribus *Zebræ* picta fuisset.
4. Kwagga feminam *Zebræ* esse credidit EDWARDSIUS ut
& cl. ERXLEBENIUS; distinctam esse speciem docet cl.
SPARRMANNUS in *Act. Holm.* 1780. (ni fallor.)

XXXVII. HYDROCHÆRUS. CAPUT: auricu-
lis, erectis subrotundis, majus-
culis, *Oculi* parvi; nasus supe-
rius propendens, quasi proboscis,
tenuis, extensilis, apicibus maxil-
larum acuminatis.

CORPUS: *collum* breve, equinum fe-
re; *dorsum* arcuatum; *cauda* nuda
brevissima.

Pedes: *ungulæ* anticæ quatuor, pos-
ticæ tres.

* *Tapir.* 1. H. *naso* elongato in proboscidem brevem exten-
silem, collo jubato. — Linn. *syst.* 10. p. 74.
2. *Hippopotamus terrestris.* *Tapirou Anta.* BUFF.
xi: tab. 43. KNORR *del. nat.* II. tab. K. 13. figu-
ra bona. *The longnosed Tapir.* PENN. *quadr.* p.
148. 69.

Habitat in sylvis fluminibusque *Americæ australis* ab
Isthmo Dariensi, usque ad fl. *Amazonum.*

OBSERVATIONS.

1. Genus *Hydrochæri* hocce animal, nec aliud continet, quamvis LINNÆUS in edit. x. ei Caviam cabiai adso- ciaverit; toto cœlo a Tapiro distantem in editione XII. hocce animal plana præterit, quod tanto magis miror, cum vir celeb litteris mihi semper charis, petierit ut accuratam ejus animalis descriptionem mitterem, atque icones, quas celeb ALLAMAND pro editione AMSTE- LODAMENSI operis BUFFONII ad vivum confici curave- rat, miserim, una cum descriptione animalis infarcti, quod in museo Principis Arausiaci composueram.
2. Maximopere affine *Hippopotamo*, sed nocturnum animal dedie in sylvarum imis dormiens, viq̄itat gramine facchari culmis, fructibus, tearitus aquam petite egregie natat vel & fundum petit; animal mite clunibus se- dens canum more; hostiliter aggressum heroicē resistit.

XXXVIII. RHINOCEROS. CAPUT: oblongum, nasus cornutus labium superius, propendens, mobile.
 CORPUS: cute durissima, plicata tec- tum, cauda brevis apice pilosa.
 Pedes: triangulati.

*Unicornu. 1. R. cornu nasale unico. LINN. 12. p. 104.
 1. III. p. 227. *Rhinoceros*. BUFF. XI. tab. 7.
 KNORR. delic. nat. tab. K. 10. EDW. glean.
 1. tab. 221. f. 2. One horned *Rhinoceros*.
 PENN. quadr. 138. 67.

Habitat in Bengale, Siam, China, Java, Su- tra.

*Bicornis. 2. R. cornubus dabus altero in naso, altero ante frontem. LINN. 12. p. 104. 1. β. Rhinoceros a deux cornes. BUFF. XI. 186. Two hor- ned *Rhinoceros*. PENN. quadr. p. 136. n. 66. tab. 15. SPARMANN *Schwed. Abhand.* 1778. tab. 10. fig. inter.
 Habitat ad Cap. bon. Sp.

OBSERVATIONES.

1. Genus hoc, *Hydrochæro* sive *Tapiro proximum naso propendente*, & caput *Tapiri Rhinocerotis* haud plane dissimile, sed *Rhinoceros* cute plicata, & magnitudine *Tapirum* longe superat, ille enim haad maior magno vitulo, unicorntum vivum vidi bis, cornu conicum, paulo curvatum, numerus dentium primorum variat ut & molarium, Cl. SANDER loco molarium in vivo Rhinocerote os continuum, vidit, & loco laniorum tale vidit os, laniario dente longius. Anne hoc lusus Naturæ, qualis aliquando & in homine contingit ut ipse vidi. Linguam lævem glabramque viderunt SCHREBERUS, SANDERUS & ipse antea comes BUFFONIUS, qui tamen postea in supplementis III. p. 298. dixit ex autopsia: *Lingua ei dura rufisque, ita ut lambendo cutem diffrahat.* Animal iracundum rbi se læsum putat, admoto tamen gramine mox tranquillum, Ille qui in *Theriotrophio regis Gallæ servatur*, plerumque se sub aquis mergit, ita ut nasus rostrumque tantum emineant, etiam ad *Cap. bon. Sp.* in verini dixit celeb. ALLAMAND eum tamen ibi adlatum nec indigenam creditum ZIMMERMANNO.
2. De *bicorni*, dubitaverunt quidam, quamvis ille jam, una cum præcedenti veteribus notus; ut ex Pausaniae lib. IX. beneficiorum refert Doctiss. ZIMMERMAN. Nummum Domitiani imperatoris monstrat cl. PENNANT (tab. 15.) l. c. ubi *Rhinoceros bicornis* graphicè expressus, idemque bicornis existat in Lithostrotio Pränestino in utroque nummo & figura in lithostrotio cornu anterius majus posteriori, proxime adstante; & versiculi Martialis.

Namque gravem gemino cornu sic extulit ursum,
Jactat ut inpositas, Taurus ad astra pilas.

Bicornis tamen non varietas prioris, sed alia species, figura, cute stricta, pedibus, geminoque cornu distinctus. Tantæ est magnitudinis, ut necante SPARRMANNO) Hottentotæ adultus in vertrem neperet, ad Pectoris interanea, eximenda. Ceterum de hisce duabus speciebus videsis doct. SANDERI dissertationem *Naturforsch.*

forsch. XVIII. BUFF. I. c. PENNANT quadr. SPARRM. act. Holm. 1778. cum haec species hodie in calidis Asia atque Africæ habitent, mirum eorum reliquias in Siberia reperiri, quod tamen Doct. PALLAS contigit, qui totum animal in Siberia vidi & præter id cranium ossaque alias ejusdem generis, vid. nov. Comment. Petropolit. XVII. tab. 151. (caput fossile.) 2. 3. Pedes. tab. 16. Cranii, unde haec ex calido climate huc devenint, nunc non inquiram, ne nimis longus sim vid. PALL. Comment. Petrop. nov. I. c. & ejus. Origine des montagnes, ZIMMERMAN geogr. Zooi. III etc.

XXXIX. ELEPHAS. CAPUT: magnum, Aures quadratae, nasus proboscis elongatus flexilis, apice mobili terminatus. Dentes laniarii superiores exserti sursum curvati, maximimi.

CORPUS: læve maximum, obesum; cauda longiuscula, apice crinita.

Pedes: crassi torosi, in diversa, lobati lobis quinque, unguibus tecti.

*Maximus. I. E. proboscide longo, flexili, prehensili. LINN. 12. p. 48. I. Elephant. BUFF. XI. I. suppl. p. 40. tab. 2. edit. 12^o. EDW. glean. 221. Elephant. PENN. quadr. 150. n. 70. Habitat in India, Cochin, China, Africa.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus hocce singulare, nulli alii ad fine itaque insulatum æque ac *Equi*, *Leonis* (quamvis ille feles inter perperau nominetur.)
2. Toties recollectam historiam Elephantis hic non offeram,

solum modo quædam annotabo. *Embryones Elephantum rarissimi* in museis; ille qui olim SEBA habuit, vide *Thes. rer. nat. I. tab. ult.* & quod vidi, jam nunc in museo regis *Succiae*. Alterum in *museo Brunsvicensi*, tertius in museo Principis de *Conty*. Quartus tandem in museo Principis *Aurasiaci* inter ea, Brunsvicensis & Gallicus *Embryo* maculati; ita rarissimi inter raros, prioris descriptionem accuratissimum edidit amiciss^m, ZIMMERMAN.

II. AQUATILIA.

A. UNGULATA.

XL. HIPPOPOTHAMUS. **CAPUT:** grande; *Aures* parvæ, rotundæ, *oculi* parvi. *Dentes* incisores IV. in utraque maxilla. *Laniarii* inferiores exserti, magni, obliqué truncati, *Labia* crassa, tumida, pilosa. **CORPUS:** crassum, obesum, cauda apice pilosa. **Pedes:** quadrifusculci.

* *Amphibius*. I. H. pedibus quadrilobis. LINN. *syst.* 12. p. 101. *Hippopotame*. BUFF. XII. tab. 6. (cranium) *suppl.* III. p. . tab. 28. fig. satis bona. *Suppl.* VI. tab. 4. maris tab. 5. fœm. *Hippopotame*. PENN. *quadr.* p. 142. SPARRMANN *act. Holm.* 1778. tab. 10.
Habitat ad Cap. bon. Sp.

OBSERVATIONES.

- Genus hoc nuper modo rite cognitum; quamvis animal veteribus jam notum atque in Ludis theatrisque Romanis ostensum fuerat. Icon quam dedit BUFFONIUS aut potius cl. ALLAMAND in *Suppl.* III. collata cum

ea quæ in *suppl. vi.* invenitur minime similes inter se, atramen satis cum prototypis, primo *Hagensi* altero *Leidensi* convenient, an hoc ex meliori vel minus bona infarctione accedit, an re vera discrepant dubius hæreo, ambo enim specimina vidi. — Rictus in *Hagensi* Hippopotamo adeo magnus, ut duabus pugnis sibi impositis nondum labium superius attingerem, mensurandi non mihi erat occasio.

Animal amphibium, fluminibus in habitans; non in Mare, Phytopagum; præsertim radice *Stapeliae* vescens, haud Piscivorum. an *Behemoth* sacri codicis? sic videtur.

B. *Unguiculata.*

XLI. CASTOR. CAPUT: subrotundum, *auriculae* parvæ, rotundæ.

CORPUS: longum, obesum, cauda lata, ovalis, depressa, squamata.

PEDES: antici fissi, unguibus obtusis; digitis 5. postici palmati.

*Fiber. 1. C. cauda depressa, ovata. LINN. 12. p. 78. *I. le Castor.* BUFF. VIII. tab. 36. *The Castor.* PENN. quadr. p. 383.

Habitat in Borealisbus *Asie*, *Europæ*. *Americæ*.

Zibethicus. 2. C. cauda longa compressio lanceolata. LINN. 12. p. 79. I. BUFF. X. tab. I. *The Musk Beaver.* PENN. quadr. p. 383. SCHREB. Zaughth. IV. tab. 175. & 166. Cranium.

Habitat in *America*, boreali.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Dentes primores duo, quibus rodunt arbores, vita gregaria. Habitus corporis, magnitudo, color, omnia *Castorem glirem* esse clamant; nisi methodus SCOPOLII quam

quam ductui naturæ in multis respondere vidi, me aliter cœgisset. Muribus ope *Piloridis* qui Zibethico affine est accedit.

2. *Pellis amborum specierum mercatoribus expetita.*
3. *Ondatra S. Zibethicus per æstatem, Calamo Aromatico nutritus, odorem gratissimum spargit; qui Hyeme evanescit.*
4. *Ex Castore, medicamentum illud celebre *Castoreum antihystericum*, antispasmodicum *cephalicum*, *Castoreum Russicum*, Americano multo melius, illius 40 schellings Anglicos constat, cum Americanum 8 sch. solvatur.*

XLI. LUTRA. CAPUT: rotundum: oculi magni.

Aures rotundæ parvæ. Dentes ut in Mustelis.

CORPUS: longum, *cauda pilosa.*

Pedes: pentadactyli, palmati crura crassa brevia.

* **Lutra.** 1. *L. plantis nudis, cauda corpore dimidio breviore.*

LINN. 12. p. 66. 2. *la Loutre.* BUFF. VII. tab. 11. SCHREB. *Zaugth.* tab. 126. A. B. *The Otter,* (greater) PENN. *quadr.*

Habitat in borealibus *Europæ, Asie, Americæ*, aquis dulcibus, fluviis, stagnis & in mari.

Minor. 2. *L. plantis hirsutis digitis æqualibus ore albo.*

LINN. 12. p. 66. 3. *Petite Lautre. Lesser Otter.* PENN. *quadr.* p. 354. 228. tab. 38. Optime. SCHREB. *Zaugth.* III. tab. 127.

Habitat in *Europa, Siberia, America.*

* **Marina.** 3. *L. plantis subtus pilosis, cauda corpore quadruplo breviore.* LINN. 12. p. 66. 1. *la Saricovienne.* BUFF. XIII. SCHREB. *Zaugth.* tab. 128. *The sea Otter.* PENN. *quadr.*

Habitat ——————

† **Brasilensis.** 4. *L. gutturis macula flava, corpore atro.*

Guachi. ZIMMERMAN geogr. Zool. p. 316.
214. *la Saricovienne.*
Habitat in Brasilia, Guajana & fluminibus in
Orenoquo affluentibus.

† Menima. 5. L. maculata, cauda attenuata nuda. Plantis
palmatis. ZIMMERM. geogr. Zool. p. 13. 17.
Petite Loutre de la Guyane. BUFF. suppl. III.
tab. 22.
Habitat in Gujania.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Lutras una cum *Phocis* ad ordinem naturalem Ferarum
pertinere, jam veterum fuisse sententiam notavit cl.
PALLAS, & docent, Dentium structura, mores; folliculus
ad anum olidum humorem plorans, eas & ad
Viverras amandat, idque eum *Castore* & mustela
commune habent.
2. *Aquatile* animal dicitur cum saepius & semper fere
Aquas dulces percurrat, & urinetur, tamen in solis
aquis detenta Lutra cito periret, & suffocaretur, haud
enim cordi foramen ovale, Omni mere aquatico so-
lemne; Lutram domesticam, aquas timentem & iis
injectam cito sicca petentem vidit *Marchio DE CON-*
DORÇET Academiæ scientiarum a secretis.
3. Lutra vulgaris Ichtyophaga, nec nisi fame coacta cor-
tices rodens.
4. Brasiliensem confundunt omnes Zoologi (excepto ZIM-
MERMANNO quem fecutus PENNANTUS) cum *marina*.
Haec pretiosa ob tergoris pilos longos, aterrimos ni-
tentes, haecce vellera adeo caro emit *Chinenis Luxuria*
ut 200 florenos singulatim solvat. Haec solummodo in-
cisores IV. infra.

- XLIII. ROSMARUS.** **CAPUT:** auriculæ nullæ;
Labium superius setosum;
Laniarii superiores exer-
ti, recurvi.
CORPUS: longum, teres,
cutis rugosa, *cauda* bre-
vis.
Pedes: crura brevia; pos-
tici lati, retrorsum di-
recti.

* **Morsus.** 1. R. dentibus laniariis exsertis, longioribus. LINN.
12. p. 49. 1. *Morse.* BUFF. XIII tab. 54. *The arctic Walrus.* PENN. quadr. p. 514. 373.
Habitat ad *Spitzbergam*, *Groenlandiam*. *Nova Zembla.*

Indicus. 2. dentibus laniariis exsertis brevioribus. ERXLEB.
p. 599. *Dugan.* BUFF. XIII. tab. 56. (*cranium*)
Indian Walrus. PENN. quadr. 517.
Habitat in *mare Indico*.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus hoc magis Nantibus accedere incipit; corpus anteius tantum, gracilescens posterius Piscibus analogum. Pedes posteriores horisontaliter directi, divisi tamen, caudam Piscium furcata in mentiuntur; sic sensim ad Nantia procedit animalium quadrupedum series.
 2. *Morsum* insolitæ magnitudinis, ad longitudinem pedum duo de vigenti vident *SELLERUS*; dentes laniarii aliquando 20 ff. ponderant id tamen raro; plerumque 10. 8. 6 ff. Tanta copia adsunt, ut Anno 1706. Angli ad Insulam Chery 700 & ultra necaverint tempore 6 horarum & 1708. (vitio calami vel Typographi 1608. PENNANT.) 900 infra septem horas. Strenue se defendunt, & uno trucidato ceteri mortem socii vindicare conantur.
- Species *Dugonis* vel *Indica* obscura,

XLIV. PHOCA. **CAPUT**: rotundum, os vibrissa-
fatum, Dentes tecti. Auriculæ
qnibusdam.

CORPUS: gracilescens posticé;
breve.

Pedes: antici pentadactyli; bre-
ves, incurvi, mutici, Pin-
næformes postici distincti,
retrorsum versi, horizonta-
les.

a. *Auribus nullis.*

Leonina. 1. P. naso carunculato rugoso, corpore fusco. LINN.
12. p. 55. 2. *Phoque a museau nide.* BUFF. *suppl.*
xi. p. 136. edit. 12°. *Bottle nose Seal.* PENN.
quadr. p. 531. n. 388. SCHREB. *Zaugth.* tab. 132.
Habitat ubique in Borealibus.

† * **Albiventer.** 2. P. inauris. fusca, ventre albo. LINN. 12.
p. 56. 3. *Phoque a ventre blanc.* BUFF.
suppl. XII. p. 149. tab. 44. *Longnecked*
Seal. PARSONS *Philos. trans.* Vol. XLVII.
tab. 6. PENN. *quadr.* 521. 377.
Habitat in mare Adriatico.

α. **Utjuk.** *Grand Phoque.* BUFF. XIII. 345.
Sea Calf. PARSONS *Philosoph. transact.* XI.
tab. 5. *Great Seal.* PENN. *quadr.* p. 524.
382. ERXLEB. p. 590. 8.

† **Cucullata.** 3. P. fronte cute densa, pilosa testa, corpore
pilis nigris, sub quibus lana nivea. ERXLEB.
590. 7. *Phoque a Capuchon.* BUFF. *suppl.* XI.
162. edit. 12°. *Hooded Seal.* PENN. *quadr.*
p. 525. 384.
Habitat in *Groenlandia* ubi Neither Soak. audit.

† **Semilunaris.** 4. P. capite acutiore, corpore crasso griseo,
maculis lunaribus atris in lateribus. ERXLEB.

p. 588. *Phoque a croissant*. BUFF. *Suppl.* XII. p. 164. edit. 12°. LEPECHIN *act. Acad. Petropol.* I. tab. 6. 7. (*Phoca Oceanica*) *Herpscal.* PENN. *quadr.* p. 525. 385.
Habitat in *Groenlandia*, *Islandia*, in *Mare alto*.

† *Hispida*. 5. P. capite lœvi in auriculato corpore pallido fusco, pilis surrectis hispido. ERXLEB. p. 589. *Phoque Neftsoak*. BUFF. *Suppl.* XII. p. 169. ed. 12°. *Roug Seal*. PENN. *quadr.* p. 524. 383.
Habitat ap *Groenlandiam*.

† *Barbata*. 6. P. capite lœvi, corpore nigrescente. ERXLEB. 591. *Laktak*. BUFF. *Suppl.* XII. p. 170. *Great Seal*. PENN. *quadr.* 524. 382.
Habitat ultra 56°. latit, boreal.

† *Maculata*. 7. P. inauriculata albo nigroque varia. *Gassigiak*. BUFF. *Suppl.* XII. p. 171. ed. 12°. Haud Migrat.
Habitat ad *Balsriver*.

* *Vitulina*. g. P. capite lœvi inauriculato, corpore fusco. LINN. 12. p. 56. 3. *Phoque Commun.* BUFF. XIII. tab. 45. SCHREB. *Zaugth.* tab. 84. *The Common Seal*. PENN. *quadr.* p. 519. 375.
Habitat ad utremque Polum.

a. corpore supra ex nigro albido striato; subtus albo. BUFF. *Suppl.* XII. tab. 47. ed. 12°.

(b) *Capite Auriculato*.

Ursina. 9. P. auribus acutis grisea. LINN. 12. p. 55. I. *Ours Marin*. BUFF. *Suppl.* XII. p. 182. tab. 47. *Ursine Seal*. PENN. *quadr.* p. 526. 387. SCHREB. *Zaugt*. CXXXII. STELLER *nov. Comment. Petropol.* II. tab. 15.
Habitat ad *Asiam*, *Orientalem & Americam occidentalem*.

† *Scont.*

PHOCA.

† Scont. 10. P. auriculis brevibus naso simo, corpore luteo maris collo jubato. ERXLEB. p. 582. 3. *Lion Marin.* BUFF. *Suppl.* XII. p. 216. tab. 48. *Leonine Seal.* PENN. *quadr.* p. 524. 389. PERNETTI *voyag.* tab. 16.

Habitat ad *Insulas Falklandias.*

† Parva. 11. auribus brevissimis, dentibus incisoribus superioribus trifurcatis, membrana ultra ungues extensa. ERXLEB. p. 51. *Petit Phoque.* BUFF. XIII. tab. 53. *little Seal.* PENN. *quadr.* p. 526. 386. SCHREB. *Zaught.* 135.

Habitat in *Mare Mediterraneo.*

† Leporina. 12. P. capite corpore albido pilis mollioribus tecto. *Lepechin act. Acad. Petrop.* I. tab. VIII. IX. *Lievre marin.* *The Leporine Seal.* PENN. *quadr.* p. 523. 380.

Habitat in *Mare Albo.*

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus Phocarum, ad feras pertinere dixit cl. PALLAS.
2. Omnes in mare habitant incessu in terram reptabundo, difficillimo ob brevitatem & directionem pedum praesertim posteriorum. Omnes fere insolitae magnitudinis.
3. *Phocæ vitulinae*, cum plurimis Poli utriusque incolis ingenti copia maria tranant celerrime, navis maxime mirantur. Edules, oleum ex adipe mercatura, ut & Pelles.
4. *Phocæ lunaris* oleum & tergus omnium optima censentur; ex pelle vestimenta aliaque. Quoad mores, vivendique Methodum multarum Phocarum; omnes fere Zoologi, luculenter hancce materiem tractaverunt sicco pede itaque ego haec transibo.

- XLV. MANATI.** **CAPUT:** auriculæ nullæ, dentes Laniarii tecti, *Labia tumida*, *collum breve capite crassius*,
CORPUS: antice obesum, postici gracilescens.
Pedes: antici pinniformes, postici connati in caudam horizontalem.

* *Trichecus.* 1. M. dentibus laniariis inclusis, capite subquadrato, ore setoso. LINN. 12. p. 49. 2. *Lamantin.* BUFF. XIII. tab. 57. SCHREB. Zaugh. tab. 80. *The roard tailed Manati.* PENN. quadr. p. 540. 390.
 Habitat in mari Americano, Asiatico.

† *Balaenurus.* 2. M. pedibus anticis pinniformibus, cauda horizontali digitis vix eminentibus. *Lamantin Poisson.* *Whale tailed Manati.* PENN. quadr. p. 536. n. 390.
 Habitat in ultimis arcticis terminis ad Insulas alienicas.

O B S E R V A T I O N E S.

1. Genus Manati corporis figura, caudaque ad Balænas, adeo prope & affine, ut Manati *Balaenurus* magis cete quam quadrupes, imo vel bipes censendus sit itaque hic sicut quadrupedum ordo; atque Piscium incipit numerosa Phalanx.
- Balaenas atque totam ceteram gentem ad Mammalia vocavit LINNÆUS cum viviparas feminas, pullos lactantes intine amplectantur Mares; eas tamen ad Pisces pertinere Chondropterygios, docet & Anatome, mores aliaque.
- Si calidis quadrupedibus, frigidos Pisces conjungere incongruum esse, non dixisset natura & rerum ordo, si sistema vasculosum, nutrititium, respiratorium, aliaque inter-

ternæ fabricæ, toto cœlo a quadrupedibus differen-
tia haud impedit, certe cetæ, & ex iis piscium
Phalanx, quadrupedibus ope Manati conjungerentur,
sed cum jam ea in avibus, magis ad finia, magisque
similia cernuntur ad eas transire jubent naturalis otio,
& sapientum in arte placita.







THIS SIDE OF CARD IS FOR ADDRESS ONLY



Dr. C. W. Richardson
Division of Birds
U. S. National Museum
Washington D. C.

Our (M.C.Z.) Bird account to 1785. I
showed it at late date to Mr. H. C. Cooper
but they have not got one. No other
Leuc-abouts. All bibliographies never
before 1785 as date of appearance
you evidently have a rarity.

Thomas, W. B. [or how?]

Oswald Weigel, Antiquariat und Auktions-Institut, Leipzig
Königstrasse 1.

Drucksache.

Uffz. M. Richmond, Leipzig
American Institution

Mathematical & C.
G. L.







SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01506 5535

