

L H Moon
& Son
Bookbinders



**NATIONAL HERBARIUM
LIBRARY
ROYAL BOTANIC GARDENS
STH. YARRA, 3141, VIC.**

27 OCT 1975

p1 29986
581.9941 GAR
Copy 3

578.29.

Supplements to the "Journal of Agriculture," March and June, 1930.

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE
OCCIDENTALIS.

Auctore

CHARLES A. GARDNER.

Parts I. & II.

PTERIDOPHYTA, GYMNOSPERMAE AND
ANGIOSPERMAE (Typhaceae-Papilionaceae).

Published July, 1930.

x 27/30.

581.9941
GAR

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE
OCCIDENTALIS.

A Systematic Census of the Plants
occurring in Western Australia.

CHARLES A. GARDNER,
Government Botanist.

MCMXXX.

PREFACE.

Western Australia is to-day the only State of the Australian Commonwealth which does not possess a text book dealing with its own flora. The official standard work is still Bentham's "*Flora Australiensis*," published between 1863 and 1878. All subsequent work dealing with the plants of the country has been published either in small papers printed by various societies within Australia, or included in monographs published abroad. For many years past there has been an increasing demand for a Flora of Western Australia, or failing this a list of the species which have been described with references to the publications in which they may be found. Although Bentham's "*Flora Australiensis*" deals with about seventy-five per cent. of our indigenous species, the additions are important as representing in many cases common inland plants, and in addition the nomenclature has been much altered with the advancement of our knowledge, not to mention the changes which have been necessitated by the International Rules governing Nomenclature, so that Bentham's Flora, from the point of view of nomenclature, is now obsolete.

With the exception of a list of plants prepared by Dr. A. Morrison for the Western Australian Year Book for 1901, no sequential list of the plants indigenous to this State has hitherto been published, and it is hoped that this Census may supply a long felt want.

The arrangement of the families and genera in this work is taken from Engler's Classification as given in *Die Natürlichen Pflanzenfamilien*, the only exception being the division of the family *Leguminosae* into the three families as suggested by J. Hutchinson in his "Families of Flowering Plants" (1926). The Rules governing nomenclature have been faithfully observed, and in consequence many well-known species are given new names. The want of a good reference library has made portions of the work extremely difficult, and for the older species, specially those of Linnæus, I have been compelled to quote from more recent works concerning the name and date of the species in question.

The introduced naturalised flora has been dealt with, all the recorded species being included. These are given in italics, and instead of the name and date of the publication in which they were described, I have given the country of origin as shown in the "Index Kewensis."

It was originally intended to include geographical references, and also references to the "*Flora Australiensis*," but it was found that this would either necessitate making this work inconvenient in size, or interfering with its compactness, and thus no references to Bentham's work are given, but wherever the name of a species differs from that given in the "*Flora Australiensis*," the synonym as quoted in Bentham's work is given in italics following the original reference.

To Mr. H. G. Elliott, Assistant Plant Pathologist of the Department of Agriculture, I am indebted for assistance in tracing references, and to Mr. G. R. Meady for assistance in making the Index, and correcting proofs.

CHARLES A. GARDNER.

State Herbarium,
Department of Agriculture,
Perth, W.A.

SYSTEMA FAMILIARUM.

Secundum Engler.

EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA.

PTERIDOPHYTA.

I. FILICALES.

- a. Leptosporangiatæ.
 - i. *Eufilicineæ*.
 - 1. Polypodiaceæ.
 - 2. Parkeriaceæ.
 - 3. Gleicheniaceæ.
 - 4. Schizaceæ.
 - ii. *Hydropteridineæ*.
 - 5. Salviniaceæ.
 - 6. Marsileaceæ.
- b. Ophioglossales.
 - 7. Ophioglossaceæ.

II. LYCOPODIALES.

- a. Eligulatae.
 - 1. Lycopodiaceæ.
- b. Ligulatae.
 - 2. Selaginellaceæ.

III. PSILOTALES.

- 1. Psilotaceæ.

IV. ISOETALES.

- 1. Isoetaceæ.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

GYMNOSPERMÆ.

- a. Cycadales.
 - 1. Cycadaceæ.
- b. Coniferae.
 - 1. Podocarpaceæ.
 - 2. Cupressaceæ.

ANGIOSPERMÆ.

I. MONOCOTYLEDONEÆ.

- a. Pandanales.
 - 1. Typhaceæ.
 - 2. Pandanaceæ.
- b. Heliobiac.
 - 1. Potamogetonaceæ.
 - 2. Naiadaceæ.
 - 3. Aponogetonaceæ.
 - 4. Scheuchzeriaceæ.
 - 5. Alismaceæ.
 - 6. Hydrocharitaceæ.
- c. Glumifloræ.
 - 1. Gramineæ.
 - 2. Cyperaceæ.
- d. Principes.
 - 1. Palmae.
- e. Spathifloræ.
 - 1. Araceæ.
 - 2. Lemnaceæ.
- f. Farinosæ.
 - 1. Flagellariaceæ.
 - 2. Restionaceæ.
 - 3. Centrolepidaceæ.
 - 4. Xyridaceæ.
 - 5. Eriocaulaceæ.
 - 6. Commelinaceæ.
 - 7. Pontederiaceæ.
 - 8. Philydraceæ.
- g. Liliifloræ.
 - 1. Juncaceæ.
 - 2. Liliaceæ.
 - 3. Haemodoraceæ.
 - 4. Amaryllidaceæ.
 - 5. Taccaceæ.
 - 6. Dioscoreaceæ.
 - 7. Iridaceæ.
- h. Microspermae.
 - 1. Burmanniaceæ.
 - 2. Orchidaceæ.

II. DICOTYLEDONEÆ.

- A. Archichlamydeæ.
 - a. Verticillatae.
 - 1. Casuarinaceæ.
 - b. Urticales.
 - 1. Ulmaceæ.
 - 2. Moraceæ.
 - 3. Urticaceæ.
 - c. Proteales.
 - 1. Proteaceæ.
 - d. Santalales.
 - 1. Santalaceæ.
 - 2. Opiliaceæ.
 - 3. Olacaceæ.
 - 4. Loranthaceæ.
 - e. Polygonales.
 - 1. Polygonaceæ.
 - f. Centrospermae.
 - 1. Chenopodiaceæ.
 - 2. Amarantaceæ.
 - 3. Nyctaginaceæ.
 - 4. Phytolaccaceæ.
 - 5. Aizoaceæ.
 - 6. Portulacaceæ.
 - 7. Caryophyllaceæ.
 - g. Ranales.
 - 1. Nymphaeaceæ.
 - 2. Ranunculaceæ.
 - 3. Menispermaceæ.
 - 4. Myristicaceæ.
 - 5. Lauraceæ.
 - 6. Hernandiaceæ.
 - h. Rhoeadales.
 - 1. Papaveraceæ.
 - 2. Fumariaceæ.
 - 3. Capparidaceæ.
 - 4. Cruciferae.
 - 5. Resedaceæ.
 - i. Sarraceniales.
 - 1. Droseraceæ.

- k. Rosales.
1. Crassulaceae.
 2. Cephalotaceae.
 3. Saxifragaceae.
 4. Pittosporaceae.
 5. Byblidaceae.
 6. Cunoniaceae.
 7. Rosaceae.
 7. Myrtaceae.
 8. Melastomaceae.
 9. Onagraceae.
 10. Halorrhagaceae.
- s. Umbelliflorae.
1. Araliaceae.
 2. Umbelliferae.
- l. Leguminales.
1. Mimosaceae.
 2. Caesalpiniaceae.
 3. Papilionaceae.
- m. Geraniales.
1. Geraniaceae.
 2. Oxalidaceae.
 3. Linaceae.
 4. Zygophyllaceae.
 5. Rutaceae.
 6. Burseraceae.
 7. Meliaceae.
 8. Tremandraceae.
 9. Polygalaceae.
 10. Euphorbiaceae.
 11. Callitrichaceae.
- n. Sapindales.
1. Anacardiaceae.
 2. Celastraceae.
 3. Stackhousiaceae.
 4. Sapindaceae.
- o. Rhamnales.
1. Rhamnaceae.
 2. Vitaceae.
- p. Malvales.
1. Tiliaceae.
 2. Malvaceae.
 3. Bombacaceae.
 4. Sterculiaceae.
- q. Parietales.
1. Dilleniaceae.
 2. Guttiferae.
 3. Elatinaceae.
 4. Frankeniaceae.
 5. Cochlospermaceae.
 6. Violaceae.
 7. Passifloraceae.
- r. Myrtiflorae.
1. Thymelaeaceae.
 2. Lythraceae.
 3. Sonneratiaceae.
 4. Lecythidaceae.
 5. Rhizophoraceae.
 6. Combretaceae.
- B. *Sympetalae*.
- a. Ericales.
1. Epacridaceae.
- b. Primulales.
1. Myrsinaceae.
 2. Primulaceae.
- c. Plumbaginales.
1. Plumbaginaceae.
- d. Ebenales.
1. Sapotaceae.
 2. Ebenaceae.
- e. Contortae.
1. Oleaceae.
 2. Loganiaceae.
 3. Gentianaceae.
 4. Apocynaceae.
 5. Asclepiadaceae.
- f. Tubiflorae.
1. Convolvulaceae.
 2. Hydrophyllaceae.
 3. Boraginaceae.
 4. Verbenaceae.
 5. Labiatae.
 6. Solanaceae.
 7. Scrophulariaceae.
 8. Bignoniaceae.
 9. Pedaliaceae.
 10. Orobanchaceae.
 11. Lentibulariaceae.
 12. Acanthaceae.
 13. Myoporaceae.
- g. Plantaginales.
1. Plantaginaceae.
- h. Rubiales.
1. Rubiaceae.
- i. Cucurbitales.
1. Cucurbitaceae.
- k. Campanulatae.
1. Campanulaceae.
 2. Lobeliaceae.
 3. Goodeniaceae.
 4. Brunoniaceae.
 5. Stylidiaceae.
 6. Compositae.
-

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS.

Auctore

C. A. GARDNER.

PTERIDOPHYTA.

FILICALES.

Polypodiaceae.

1. *DRYOPTERIS*, Adans, Fam. des. Pl. ii. 20 (1763).
D. gongylodes, (Schkuhr.) O. Kuntze Rev. Gen. ii. 81, 811 (1891) (*Aspidium unitum*, Swartz.)
2. *NEPHROLEPIS*, Schott, Jen. fil. t. 3 (1834).
N. exaltata, (Linn.) Schott. Jen. fil. t. 3 (1834).
3. *MICROLEPIA*,
M. speluncae, (Linn.) Moore, Ind. xciii. (1857) (*Davallia speluncae*, (L) Bak.)
4. *SCHIZOLOMA*, Gaud.
S. ensifolium, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 414 (1841) (*Lindsaya ensifolia*, Sw.)
5. *LINDSAYA*, (Dryand) J. Sm. Mem. Acad. Turin. v. 413 (1793).
L. linearis, Swartz. Schrad. Journ. 1800 78 (1801).
6. *ASPLENIUM*, Linn. Gen. Pl. 783 (1737).
A. flabellifolium Cav. Deser. 257 (1802).
A. praemorsum, Swartz. Prodr. 130 (1788). (*A. furcatum*, Thunb.)
A. bulbiferum, Forst. Prodr. 80 (1786).
7. *PLEUROSORUS*, Fee. Gen. Fil. 179 (1850-52).
P. rutifolius, (R.Br.) Fee. Gen. Fil. 180 (1852) (*Grammitis rutaefolia* R.Br.)
8. *BLECHNUM*, Linn. Sp. Pl. ii. 1077 (1753).
B. orientale, Linn. Sp. ed. ii. 1535 (1763).
9. *STENOCHLAENA*, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 401 (1841).
S. palustris, (Burm.) Bedd. Fern. Br. Ind. suppl. 26 (1876). (*Acrostichum scandens*, Hook.)
10. *GYMNOPTERIS*, Bernh.
G. Reynoldsii, (F. v. M.) C. Christens, Ind. Fil. 341 (1906) (*Anogramma Reynoldsii*. F. v. M.)
11. *PITYROGRAMMA*, (Link.) Domin de la Fact. Sci. l'Univ. Charles, Prague. 88,3 (1928).
P. leptophylla, (Linn.) Domin de la Fac. Sci. Univ. Charles, Prague. 88,9 (1928).
12. *CHEILANTHES*, Swartz. Syn. Fil. 5 126 (1806).
C. Brownii, (Desv.) Domin Biblio Bot. 85 133 (1913).
C. distans, (R.Br.) Mett. Cheil. 25 n. 19 (1859).
C. tenuifolia, (Burm.) Swartz. Syn. Fil. 129. 332 (1806).
13. *ADIANTUM*, Linn. Gen. Pl. 782 (1737).
A. lunulatum, Burm. Fl. Ind. 235 (1768).
A. aethiopicum, Linn. Syst. Nat. ed. x. ii. 1329 (1759).
14. *PTERIS*, Linn. Hort. Cliff. 443 (1737).
P. longifolia, Linn. Sp. Pl. ii. 1074 (1753).
15. *PTERIDIUM*, Gled. Scop. Fl. Carn. 169 (1760).
P. aquilinum, (Linn.) Kuhn. v. Deck. Reisen. iii. 3; bot. 11 (1879). (*Pteris aquilina*).
16. *POLYPODIUM*, Linn. Gen. Pl. 784 (1753).
P. phymatodes, Linn. Mant. 306 (1771).
17. *ACROSTICHUM*, Linn. Gen. Pl. 785 (1753).
A. aureum, Linn. Sp. Pl. ii. 1069 (1753).

Parkeriaceae.

1. *CERATOPTERIS*, Brong. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).
C. thalictroides, Brongn. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).

Gleicheniaceae.

1. *GLEICHENIA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin. v. 419 (1793).
G. linearis, (Burm.) Clarke in Trans. Linn. Soc. ii. bot. i. 428 (1880) (*G. dichotoma*, Hook).
G. microphylla, (R.Br.) Christ, Frankr. d. Erd. 339 (1897) (*Platycolea microphylla*, R.Br.)

Schizaeaceae.

1. *SCHIZAEA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin v. 419 (1793).
S. fistulosa, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 103 (1906).
2. *LYGODIUM*, Swartz, Schrad. Journ. 1800. 106 (1801).
L. scandens, (Linn.) Swartz, in Schrad. Journ. 1800, 106 (1801).

Salviniaceae.

1. *AZOLLA*, Lam. Encycl. Meth. i. 343 (1783).
A. filiculoides, Lam. Encyc. Meth. i. 343, var. rubra, Diels.

Marsileaceae.

1. *MARSILEA*, Linn. Gen. Pl. 799 (1753).
M. Brownii, A. Braun, Monatsbr. Acad. Berol. 418 (1863) (*M. quadrifolia*, Benth.)
M. angustifolia, R.Br. Prodr. 167 (1810).
M. hirsuta, R.Br. l. c. 167.
M. Drummondii, A. Braun, in Linnæa xxv. 721 (1852).
2. *PILULARIA*, Linn. Sp. Pl. ii. 1100 (1753).
P. Novae-Hollandiae, A. Br. Monatsber Akad. Berol. 435 (1863) (*P. globifera*, Benth.). *globulifera*

OPHIOGLOSSALES.

Ophioglossaceae.

1. *OPHIOGLOSSUM*, Linn. Gen. Pl. 503 (1753).
O. coriaceum, A. Cunn. in Hook Comp. Bot. Mag. ii. 361 (1836) (*O. vulgatum*, Benth.).

LYCOPODIALES.

Lycopodiaceae.

1. *PHYLLOGLOSSUM*, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).
P. Drummondii, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).
2. *LYCOPODIUM*, (Rupp.) Linn. Gen. Pl. 503 (1753).
L. Drummondii, Spring. Monogr. Lycop. ii. 35 (1849).
L. cernuum, Linn. Sp. Pl. ed. 2. ii. 1566 (1763).

Psilotaceae.

1. *PSILOTUM*, Swartz, in Schrad. Journ. in ii. 109 (1800).
P. nudum (Linn.) Griseb. in Veget. d. Karabien 130 (1857) (*P. triquetrum*, Sw.).

Selaginellaceae.

1. *SELAGINELLA*, Beauv. Prodr. des. Fam. de L'Aeth. 101 (1805).
S. Preissiana, Spring. Monogr. Lycop. ii. 61 (1849).
S. uliginosa, Spring. l. c. 60.
S. proniflora, (Lam.) Baker in Journ. Bot. xiv. 156 (1885). (*S. Belangeri* Spring.).

Isoetaceae.

1. *ISOETES*, Linn. Skanska Resa 420 (1751).
I. Drummondii, A.Br. in Berol. Monatsber 593 (1863).

GYMNOSPERMAE.

CYCADALES.

Cycadaceae.

1. *CYCAS*, Linn. Hort. Cliff. 482 (1737).
C. Lane-Poolci, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 30 (1923).
C. furfuracea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 108 (1918).
C. angulata, R.Br. Prodr. 348 (1810) (*C. media*, Benth.).
C. basaltica, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 31 (1923).
2. *MACROZAMIA*, Miq. Monogr. Cycad. 36 (1841).
M. Reidlei (Gaud.) Gardner. comb. nov. (*M. Fraseri*, Miq.)
M. Dyeri, (F.v.M.) Gardner. comb. nov. (*Encephalartos Dyeri*, F.v.M.)

CONIFERAE.

Podocarpaceae.

1. *PODOCARPUS*, L' Herit. Pers. Syn. Pl. ii. 580 (1807).
P. Drouyniana, F. v. M. Fragm. iv. 86. t. 31 (1864).

Cupressaceae.

1. *ACTINOSTROBUS*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).
A. pyramidalis, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).
A. acuminatus, Parlat. Ind. Sem. Hort. Florent. 25 (1862).
2. *CALLITRIS*, Vent. Decas Gen. Nov. 10 (1808). (*Frenela*, Mirb. p. p.).
C. Roei, (Endl.) F. v. M. Census 109 (1882).
C. Drummondii, (Parlat) F. v. M. Census 109 (1882).
C. Morrisoni, R. T. Baker in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxi. 717 (1907).
C. robusta, (R.Br.) Mirb. in Mem. Mus. Par. xiii. 74 (1825).
C. verrucosa, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.
C. glauca, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.
C. intratropica. (F. v. M.) R. T. Baker, Pines of Australia, 172 (1910).

ANGIOSPERMAE.

MONOCOTYLEDONEAE.

PANDANALES.

Typhaceae.

1. *TYPHA* (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
T. angustifolia, Linn. Sp. Pl. 971 (1753).

Pandanaaceae.

1. *PANDANUS*, (Rumph.) Linn. fil. Suppl. 64 (1781).
P. odoratissimus, Linn. fil. Suppl. 424 (1781).
P. aquaticus, F. v. M. Fragm. v. 40 (1856).

HELIOBIAE.

Potamogetonaceae.

1. *POSIDONIA*, Koenig. Ann. of Bot. ii. 95 (1805).
P. australis, Hook, fil. Fl. Tasm. ii. 43 (1860).
2. *POTAMOGETON*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
P. triearinatus, F. v. M. et A. Benn. in Brit. Journ. Bot. xxx. 229 (1892).
(*P. natans*, Bth.).
P. javonicus, Hassk. in Verbn. Natur. K. Ver. Nedrl. Ind. i. 26 (1856).
P. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vii. 171 (1878).
P. orchreatus, Raoul Ann. Soc. Nat. Ser. iii. 117 (1844). (*P. obtusifolius*,
Mert.).
P. pectinatus, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
3. *RUPPIA*, Linn. Syst. Nat. 9 (1735).
R. maritima, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
4. *CYMODOCEA*, Koenig. in Kon. & Sims Ann. Bot. ii. (1806).
C. angustata, Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. no. 6, 19 (1916).
C. isoetifolia, Aschers, Sitzber. Geo. Nat. Freunde Berlin 3 (1867).
C. antarctica, (Labill.) Endl. Gen. Pl. 230 (1836).
5. *DIPLANTHERA*, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806).
D. uninervis, (Forsk.) Aschers in Engl. et Prant. Naturpflanz. 37 (1897).
6. *ALTHENIA*, Petit. in Ann. Soc. Obs. i. (1829). (*Lepilaena*, J. Drumm.)
A. australis, (Drum.) Aschers. in Engl. et Prantl. Natpflanz. ii. 1. (1887).
A. Preissii, (Lehm.) Aschers et Graebn. in Engler's Pflanzenreich, Potamog.
160 (1907).

Naiadaceae.

1. *NAIAS*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753).
N. marina, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753) (*N. major*, All.).
N. tenuifolia, R.Br. Prodr. 345 (1810).

Aponogetonaceae.

1. *APONOGETON*, Linn. fil. Suppl. Pl. 32 (1781).
A. elongatus, (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 188 (1878).

Scheuchzeriaceae.

1. *TRIGLOCHIN*, (Riv.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
T. striata, Ruiz et Pav. Fl. Peruv. iii. 72 (1802).
T. mucronata, R.Br. Prodr. 343 (1810).
T. calcitrapa, Hook. Ic. Pl. viii. t. 731 (1845).

- T. Stowardi, N. E. Brown in Kew Bull. Misc. 189 (1914).
 T. turrifera, Ewart in Viet. Nat. xxiii. 43 (1906).
 T. centrocarpa, Hook. Icon. Pl. viii. t. 728 (1845).
 T. minutissima, F. v. M. Fragm. vi. 82 (1867).
 T. trichophora, Nees et Essenchbach in Lehm. Pl. Preiss. ii. 54 (1846).
 T. Muelleri, Buchenau in Engl. Pflanzenreich iv. 15, 12 (1903).
 T. procera, R.Br. Prodr. 343 (1810).
 T. pterocarpa, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 110 (1918).

Alismaceae.

1. *ALISMA*, Linn. Gen. ed. I. 108 (1737).
A. oligococum, F. v. M. Fragm. i. 23 (1858).
2. *DAMASONIUM*, Mill. Gard. Diet. ed. vi. (1752).
D. minor, (R.Br.) Buchenau, Ind. Crit. in Abh. Nat. Ver. Brem, ii. 20, 39 (1868). (*D. australe*, Salisb.)

Hydrocharitaceae.

1. *OTTELLIA*, Pers. Syn. Plant. i. 400 (1805).
O. ovalifolia, (R.Br.) L. C. Rieh, in Mem. Inst. Fr. ii. 78 (1811).
2. *MAIDENIA*, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).
M. rubra, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).
3. *VALLISNERIA*, (Mich.) Linn. Gen. ed. i. 300 (1737).
V. spiralis, Linn. Sp. Pl. 1015 (1753).
4. *HALOPHILA*, Thou. Gen. Nov. Madag. n. 6 (1806).
H. ovalis, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. 45 (1860).
H. spinulosa, (R.Br.) Aschers. in Nuemayer. Anleit. Wissan. Beob. 368 (1875).

GLUMIFLORAE.

Gramineae.

1. *CHIONACHNE*, R.Br. in Beauv. Pl. Jav. Rar. 15 (1838).
C. cyathopoda, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 516 (1878).
2. *DIMERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 204 (1810).
D. ornithopoda, Trin. Fund. Agrost. 167 (1820). (*D. tenera*, Trin.).
3. *IMPERATA*, Cyrillo, Pl. Rar. Ic. ii. 26. t. 11 (1792).
I. cylindrica, (Linn.) Beauv. Agrost. 165 (1812) (*I. arundinacea*, Cyrillo).
4. *POLLINIA*, Trin. in Mem. Acad. Petersb. ser. vi. ii. 304 (1833).
P. fulva, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 526 (1878).
5. *ROTTBOELLIA*, Linn. fil. Nov. Gram. Gen. in Amoen Acad x. 22 (1779)
 p.p.
R. rottboellioides, (R.Br.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles. 1916, 644 (1917). (*R. ophiuroides*, Benth.)
R. compressa, Linn. f. Suppl. 114 (1781). (*Hemarthria compressa*, R.Br.)
6. *ISCHAEMUM*, Linn. Gen. ed. ii. 525 (1742).
I. nervosum (Rottb.) Gardner n. comb. (*I. laxum*, R.Br.)
7. *ANDROPOGON*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1045 (1753).
A. intermedius, R.Br. Prodr. 202 (1810).
A. ischaemum, Linn. Sp. Pl. 1047 (1753).
A. sericeus, R.Br. Prodr. 201 (1810).
A. affinis, R.Br. Prodr. 201 (1810).
A. annulatus, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 173 (1775).
A. procerus, R.Br. Prodr. 202 (1810).
A. exaltatus, R.Br. l. c. 202.
A. bombycinus, R.Br. l. c. 202.
A. brevifolius, Swartz. Fl. Ind. oce. i. 209 (1797) (*A. fragilis*, R.Br.).
A. axilis, Hochst. in Flora xxvii. 241 (1844).
A. Gryllus, Linn. Cent. Pl. ii. 33 (1759). (*Chrysopogon Gryllus*, Trin.)
 **A. halepensis* (Linn.) Sibth. et. Sm. Reg. calid.
A. australis, Spreng. Syst. i. 287 (1825). (*Holcus plumosus*, R.Br.)
A. stipoides, (Ewart) Gardner n. comb. (*Sarga stipoidea*, Ewart & White.)
A. intrans, F.v.M. Cens. Austr. Pl. 132 (1882).
8. *HETEROPOGON*, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807).
H. hirtus, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807). (*H. contortus*, Roem. et Schultz.)
H. insignis, Thw. Enum. Pl. Ceyl. 437 (*Andropogon triticeus*, R.Br.).

9. *THEMEDA*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*Anthistiria*, Linn. f.)
T. triandra, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*A. imberbis*, Retz. & *A. ciliata*, Benth.)
T. avenacea, (F.v.M.) Maiden et Beteche, Cens. Pl. N.S.W. 15 (1916). (*A. avenacea*, F.v.M.)
10. *ISEILEMA*, Anderss. in Nov. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*Anthistiria*, Linn. f.)
I. membranacea, (Lindl.) Anderss. in Nov. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*A. membranacea*, Ldl.)
11. *TRAGUS*, Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768).
T. racemosus, (Linn.) Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768). (*Lappago racemosa*, Willd.)
12. *NEURACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
N. alopecuroides, R.Br. Prodr. 196 (1810).
N. Muelleri, Hack in Oest. Bot. Zeit. xlv. 329 (1895).
N. Mitchelliana, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 410 (1843).
N. multiculmis, R. Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 68 (1904).
13. *PEROTIS*, Ait. Hort. Kew ed. I. i. 85 (1789).
P. rara, R.Br. Prodr. 172 (1810). (*P. latifolia*, Ait.)
14. *ARUNDINELLA*, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. 1. (1823).
A. brasiliensis, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. i. Fig. 3 (1823). (*A. nepalensis*, Trin.)
15. *PASPALUM*, Linn. Syst. ed. x. 855 (1759).
P. serobiculatum, Linn. Mant. i. 29 (1767).
**P. distichum*, Linn. Syst. Nat. ed. x. 855 (1759).
**P. ditatatum*, Poir (Bras.).
16. *ERIOCHLOA*, Humb. in H.B. et. K. Nov. Gen. et sp. i. 94. t. 30 & 31 (1815).
E. punctata, (Linn.) Hamilt. Prodr. Pl. Ind. occ. 5 (?).
17. *ISACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
I. australis, R.Br. Prodr. 196 (1810).
18. *DIGITARIA*, Hall. Hist. Stirp. ii. 244 (1768). (*Panicum*, Benth. p.p.)
D. etenantha, (F.v.M.) Hughes, Kew Bull. Misc. 310 (1923). (*P. etenan-
thum*, F.v.M.)
D. longiflora, (Retz.) Pers. Syn. i. 85 (1805). (*Paspalum longiflorum*, Retz.)
D. marginata, Link. Hort. Berol. i. 229 (1827). (*Panicum sanguinate*, Benth. p.p.)
D. sanguinalis (Linn.) Scop. Fl. Carn. ed. ii. i. 52 (1772). (*P. sanguinalis*, Linn. p.p.)
D. Brownii, (Roem et Schultz) Hughes, Kew Bull. Misc. 313 (1923). (*P. leucophleum*, Benth.)
D. ammophila, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. divaricatissimum*, var.)
D. coenicola, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. coenicolum*, F.v.M.)
19. *BRACHIARIA*, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 469 (1853). (*Panicum*, Benth. p.p.)
B. holsericea, (R.Br.) Hughes, in Kew Bull. Misc. 315 (1923). (*P. holsericeum*, R.Br.)
B. piligera, (F.v.M.) Hughes, l. c. 315.
B. distachya (Linn.) A. Camus. Fl. Indo-China vii. 437 (1922). (*P. distachyum*, Linn.)
20. *PASPALIDIUM*, Stapf. in Prain. Fl. Trop. Afr. ix. 582 (1920). (*Panicum*, Benth. p.p.)
P. jubiflorum, (Trin.) Hughes, Kew Bull. Misc. 317 (1923). (*P. flavidum* & *P. gracile*, p.p.)
P. basieladum, Hughes, l. c. 318.
P. gracile, (R.Br.) Hughes, l. c. 318. (*Panicum gracile*, R.Br.)
**ECHINOCHLOA*, Beauv. Agrost. 53. ii. f. 2 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
**E. colona*, (Linn.) Link. Reg. calid. (*Panicum colonum*, Linn.)
**E. Crus-Galli*, (Linn.) Beauv. Reg. calid. (*P. Crus-Galli*, Linn.)
21. *PARACTAENUM*, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
P. Novae-Hollandiae, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812). (*Panicum reversum*, F.v.M.)

22. *PANICUM*, Linn. Sp. Pl. 55 (1753).
P. cymbiforme, Hughes, in Kew Bull. Misc. 323 (1923). (*P. antidotale*, Benth. p.p.)
P. capillipes, Benth. Fl. Austr. vii. 484 (1878).
P. Queenslandicum, Domin in Fedde. Repert. x. 59 (1911).
P. decompositum, R.Br. Prodr. 191 (1810).
P. effusum, R.Br. Prodr. 191 (1810).
23. *ICHNANTHUS*, Beauv. Agrost. 56. t. xii. f. 1 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
I. australiensis, (Domin) Hughes, Kew Bull. Misc. 329 (1923). (*P. australiense*, Domin.)
I. Muelleri, Hughes, l. c. 329.
24. *SACCIOLEPIS*, Nash. in Britton. Man. Bot. 89 (1901). (*Panicum*, Benth. p.p.)
S. myosuroides, (R.Br.) Hughes in Kew Bull. Misc. 330 (1923). (*P. myosuroides*, R.Br.)
25. *SETARIA*, Beauv. Fl. Owar. ii. 80 (1807). (*Chaetochloa*, Scribn. (1897).)
S. glauca, (Linn.) Beauv. Agrost. 51 (1812).
S. verticillata, (Linn.) Beauv. l. c. 51.
S. viridis, (Linn.) Beauv. l. c. 51.
S. Buchananii, A. S. Hitchc. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. lii. (ii.) 185 (1927).
S. Carnei, H. S. Hitchc. l. c. 185.
S. macrostachya, H.B. et K. Nov. Gen. et Sp. i. 110 (1815).
26. *CENCHRUS*, Linn. Coroll. Gen. 20 (1737).
**C. tribuloides*, Linn. Am. bor.
C. elymoides, F.v.M. Fragm. viii. 107 (1874).
27. *PSEUDOCHEAETOCHELOA*, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).
P. australiensis, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).
28. *PENNISETUM*, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).
P. villosum, R.Br. in Salt. Abyss. App. 62 (1818).
P. Basedowii, Summerhayes & Hubbard, Kew. Bull. Misc. 440 (1926).
P. cenchroides, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).
P. arnhemicum, F. v. M. Fragm. viii. 109 (1873).
29. *LAGIOSETUM*, Benth. in Hook. Ic. Pl. xiii. 33 (1877).
P. refractum, (F.v.M.) Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1242 (1877).
30. *CHAMAERAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 193 (1810).
C. spinescens, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 189 (1817).
31. *XEROCHLOA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
X. imberbis, R.Br. Prodr. 197 (1810).
X. barbata, R.Br. l. c. 197.
X. laniflora, (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 502 (1878).
**STENOTAPHRUM*, Trin. Fund. Agrost. 175 (1820).
**S. dimidiatum*, (Linn.) Brongn. (Trop. et. Sub. Trop. Reg.).
32. *SPINIFEX*, Linn. Mant. ii. 163 (1771).
S. hirsutus, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 81. t. 230 (1806).
S. longifolius, R.Br. Prodr. 198 (1810).
33. *ORYZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
O. sativa, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).
EHRLHARTA, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 216 t. 8 (1779).
**E. longiflora*, Sm. (Africa aust.).
**E. brevifolia*, Schrad. (Africa aust.).
**E. calycina*, Sm. (Africa aust.).
34. *MICROLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 210 (1810).
M. stipoides, (Labill.) R.Br. Prodr. 210 (1810).
35. *TETARRHENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 209 (1810).
T. laevis, R.Br. Prodr. 210 (1810).
**PHALARIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. minor*, Retz. Reg. Medit.
**P. canariensis*, Linn. Reg. Medit.
ANTHONANTHUS, Linn. Gen. ed. I. 18 (1837).
**A. odoratum*, Linn. Europ. As. bor. Afr. bor.

36. *AMPHIPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 175 (1810).
A. debilis, R.Br. Prodr. 175 (1810).
A. strictus, R.Br. l. c. 175.
A. laguroides, R.Br. l. c. 175.
A. cygnorum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 100 (1846).
A. turbinatus, R.Br. Prodr. 175 (1810).
A. restionaceus, R. Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).
37. *ARISTIDA*, Linn. Sp. Pl. I. 82 (1753).
A. hygrometrica, R.Br. Prodr. 174 (1810).
A. stipoides, R.Br. l. c. 174.
A. Browniana, Henr.
A. arenaria, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 407 (1826).
A. calycina, R.Br. Prodr. 173 (1810).
38. *STIPA*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 78 (1753).
S. elegantissima, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 24 t. 29 (1804).
S. juncifolia, Hughes, in Kew Bull. Misc. 11 (1921).
S. eriopus, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).
S. tenuifolia, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).
S. leptophylla, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).
S. trichophylla, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).
S. falcata, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).
S. arachnopus, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).
S. variabilis, Hughes, in Kew Bull. Misc. 15 (1921).
S. Drummondii, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).
S. incurva, Hughes, in Kew Bull. Misc. 16 (1926).
S. platychaeta, Hughes, in l. c. 16.
S. scabra, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 31 (1848).
S. pycnostachya, Benth. Fl. Austr. vii. 568 (1878).
S. hemipogon, Benth. l. c. 569.
S. nobilis, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).
S. semibarbata, R.Br. Prodr. 174 (1810).
S. cremophila, Reader, in Vict. Nat. xvii. 154 (1901).
S. hirsuta, Hughes, in Kew Bull. Misc. 22 (1921).
S. tenuiglumis, Hughes, l. c. 22.
S. elatior, Hughes, l. c. 24.
S. puberula, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1848).
S. crinita, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 407 (1826).
S. compressa, R.Br. Prodr. 174 (1810).
S. Mc Alpinei, Reader, in Vict. Nat. xv. 143 (1899).
**ORYZOPSIS*, Mich. Fl. Bor. Am. i. 51. t. 9 (1803).
**O. miliacea*, (Linn.) Aschers. et Schweinf. (Reg. Medit.)
39. *ECHINOPOGON*, Beauv. Agrost. 42 t. 9. f. 5 (1812).
E. ovatus, (Forst.) Beauv. Agrost. 42. t. 9. f. 5 (1812).
**PHLEUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. pratense*, Linn. (Reg. bor. temp.)
40. *ALOPECURUS*, Linn. Syst. ed. i. 8 (1735).
A. geniculatus, Linn. Sp. Pl. 60 (1753).
41. *SPOROBOLUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 169 (1810).
S. virginicus, (Linn.) Kunth. Rev. Gram. i. 68 (1832).
S. indicus, R.Br. Prodr. 170 (1810).
S. pulchellus, R.Br. l. c. 170.
S. Lindleyi, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 623 (1878).
S. actinocladius, F.v.M. Fragm. viii. 140 (1874).
42. *POLYPOGON*, Desf. Fl. Atlant. i., 66 (1798).
P. monspeliensis, Desf. Fl. Atlant. i. 66 (1798).
P. fugax, Nees in Steud. Syn. Glum. i. 184 (1855).
P. tenellus, R.Br. Prodr. 173 (1810).
**AGROSTIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. alba*, Linn. (Europ.)
**A. venusta*, Trin. (Reg. Medit.)
43. *CALAMAGROSTIS*, Adans. Fam. ii. 31 (1763).
C. aemula, Steud. Nom. ed. ii. i. 249 (1821). (*Deyeuxia Forsteri*, Kunth.)
C. quadriseta, (Labill.) Spreng. Syst. i. 253 (1825). (*Deyeuxia cylindrica*, R.Br.)

44. *DICHELACHNE*, Endl. Prodr. Fl. Norf. 20 (1838).
D. erinita, (Linn. f.) Hook. f. Fl. New Zeal. i. 293 (1853).
D. sciurea, (R.Br.) Hook. f. l. c. 294.
 **AMMOPHILA*, Host. Gram Austr. iv. t. 41 (1809).
 **A. arenaria*, (Linn.) Link. (Europ.: Amer. bor.).
45. *DIPLOPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 176 (1810).
D. setaceus, R.Br. Prodr. 176 (1810).
46. *PENTAPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 173 (1810).
P. quadrifidus, (Labill.) Baill. Hist. des pl. xii. 280 (1894). (*P. Billardieri*, R.Br.)
 **LAGURUS*, Linn. Gen. ed. i. 353 (1737).
 **L. ovatus*, Linn. (Europ.).
47. *ERIACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 183 (1810).
E. squarrosa, R.Br. Prodr. 183 (1810).
E. pauciflora, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 115 (1918).
E. glauca, R.Br. Prodr. 183 (1810).
E. ciliata, R.Br. l. c. 184.
E. aristidea, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).
E. festucacea, F.v.M. l. c. 205.
E. ovata, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 416 (1843).
E. meliacea, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).
E. nana, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).
E. pallida, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 631 (1878).
E. seleranthoides, F.v.M. Fragm. viii. 233 (1874).
E. inermis, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).
E. obtusa, R.Br. Prodr. 184 (1810).
 **AIRA*, Linn. Fl. Lapp. 27 (1737).
 **A. caryophyllea*, Linn. (Europ. Oriens.).
 **A. minuta*, Linn. (Europ. Oriens.).
48. *DESCHAMPSIA*, Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).
D. caespitosa, (Linn.) Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).
 **AVENA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **A. sativa*, Linn. (Terr. temp.)
 **A. fatua*, Linn. (Europ. Oriens. As. bor.).
 **A. barbata*, Brotero. (Reg. Mediterr. As. Min, Arab.).
HOLCUS, Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **H. lanatus*, Linn. (Europ.).
49. *AMPHIBROMUS*, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 420 (1843).
A. nervosus, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. pl. clxiii. (1860).
50. *DANTHONIA*, D. C. Fl. Franc. iii. 32 (1805).
D. bipartita, F.v.M. Fragm. i. 160 (1859).
D. penicillata, (Labill.) F.v.M. Fragm. viii. 135 (1873).
 **PENTASCHISTIS*, Stapf. in Dyer Fl. Cap. vii. 480 (1899).
 **P. Thunbergii*, (Kunth.) Stapf. (Afr. aust.).
51. *PAPPOPHORUM*, Schreb. Gen. Pl. ii. 787 (1791).
P. nigricans, R.Br. Prodr. 185 (1810).
52. *TRIRAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).
T. mollis, R.Br. Prodr. 185 (1810).
T. pungens, R.Br. l. c. 185.
T. bromoides, F.v.M. Fragm. viii. 108 (1874).
T. rigidissima, Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).
T. danthonioides, F.v.M. Fragm. viii. 125 (1874).
53. *ELYTROPHORUS*, Beauv. Agrost. 67 (1812).
E. articulatus, Beauv. Agrost. 67 (1812).
54. *TRIODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 182 (1810).
T. Mitchelli, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).
T. pungens, R.Br. Prodr. 182 (1810).
T. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).
T. irritans, R.Br. Prodr. 182 (1810).
T. procera, R.Br. l. c. 182.
T. microstaehya, R.Br. l. c. 182.
55. *DIPLACHNE*, Beauv. Agrost. 9 (1812).
D. loliiformis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 618 (1878).
D. fusca, (Linn.) Beauv. Agrost. 163 (1812).
D. parviflora, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 620 (1878).

56. *PHRAGMITES*, Trin. Fund. Agrost. 134 (1820).
P. vulgaris, (Lam.) Druce, List. Brit. Pl. 81 (1908). (*P. phragmites*
(Linn.) Karst); (*P. communis*, Trin.)
**LAMARCKIA*, Moench. Meth. 201 (1794).
**L. aurea*, (Linn.) Moench. (Reg. Mediterr.)
**CYNOSURUS*, Linn. Gen. ed. i. 13 (1737).
**C. echinatus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
**KOELERIA*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).
**K. phleoides*, Pers. (Reg. Mediterr.)
**AVELLINIA*, Parlât. Pl. Nov. 59 (1842).
**A. Michellii* (Savi.) Parlât. (Italia.)
**TRisetum*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).
**T. pumilum*, Kunth. (Af. austr.).
**BRIZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**B. maxima*, Linn. (Reg. Mediterr.; Af. austr.)
**B. minor*, Linn. (Europ. Oriens; As. bor.)
**DACTYLIS*, Linn. Gen. ed. II. 29 (1742).
**D. glomerata*, Linn. (Europ.; As. bor.)
57. *ERAGROSTIS*, Beauv. Agrost. 70 (1812).
E. tenella, (Linn.) Roem et Schultz. Syst. Veg. ii. 576 (1817).
E. leptocarpa, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).
E. pilosa, (Linn.) Beauv. Agrost. 71 (1812).
E. trichophylla, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).
E. diandra, Steud. Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).
E. Brownii, Nees in Steud. Nomencl. Bot. i. 562 (1841).
E. speciosa, Steud. in Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).
E. eriopoda, Benth. Fl. Austr. vii. 648 (1878).
E. setifolia, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 419 (1843).
E. falcata, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 408. t. 25 (1826).
E. Dielsii, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 76 (1904).
58. *ECTROSLA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).
E. Schultzii, Benth. Fl. Austr. vii. 633 (1878).
E. leporina, R.Br. Prodr. 186 (1810).
SCHISMUS, Beauv. Agrost. 73. t. 15. f. 4 (1812).
**S. calycinus*, (Linn.) Coss. et Dur. (Reg. Mediterr.; Afr. austr.).
59. *POA*, Linn. Gen. Pl. 20 (1737).
P. caespitosa, Forst. Prodr. 89 (1786).
P. Maxwellii, Benth. Fl. Austr. vii. 653 (1878).
P. Drummondiana, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 418 (1843). (*P.*
nodosa, Nees.)
**P. bulbosa*, Linn. (Europ.)
**P. annua*, Linn. (Cosmop.)
60. *GLYCERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 179 (1810).
G. fluitans, (Linn.) R.Br. Prodr. 179 (1810).
G. strieta, Hook. fil. Fl. Nov. Zeal. i. 304 (1855).
G. ramigera, F.v.M. Fragm. viii. 131 (1874).
G. australasica, Steud. Syn. Glum. i. 286 (1855).
61. *FESTUCA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).
F. scirpoidea, F.v.M. Fragm. viii. 129 (1874). (*Schedonorus scirpoideus*,
Benth.)
F. littoralis, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 22. t. 27 (1804). (*S. littoralis*, Beauv.)
**F. elatior*, Linn. (Europ.; As. bor.)
**F. Myuros*, Linn. (Europ.; Am. et. As. bor.)
**F. bromoides*, Linn. (Reg. temp.)
**F. rigida*, (Linn.) Kunth. (Europ. Austr.; Afr. bor.)
62. *BROMUS*, Linn. Syst. Nat. 8 (1735).
**B. maximus*, Desf. (Europ.; Reg. Mediterr. et Caucas.)
**B. Madritensis*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
**B. unioloides*, H.B. et K. (Am. calid.)
B. arenarius, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 23. t. 28 (1804).
**B. mollis*, Linn. (Europ.; Afr. et As. bor.)
BRACHYPODIUM, Beauv. Agrost. 100 (1812).
**B. distachyum*, Roem et Schultz. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
63. *CYNODON*, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85 (1805).
C. Dactylon, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85 (1805).
C. tenellus, R.Br. Prodr. 187 (1810).
C. convergens, F.v.M. Fragm. viii. 113 (1874).

64. *CHLORIS*, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Plant. 25 (1788).
C. pectinata, Benth. Fl. Austr. vii. 612 (1878).
C. variegata, R.Br. Prodr. 186 (1810).
C. acicularis, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 33 (1848).
C. truncata, R.Br. Prodr. 186 (1810).
C. barbata, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Pl. 25 (1788).
C. scariosa, F.v.M. Fragm. vi. 85 (1868).
C. pallida, Hack. in Engler's Botan. Jahrb. vi. 244 (1885).
65. *ASTREBLA*, (F.v.M.) Benth. Flora Australiensis, vii. 602 (1878).
A. pectinata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).
A. clymoides, Bail et F.v.M. Illustr. Queensland Grasses (1878).
A. triticoides, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).
66. *DACTYLOCTENIUM*, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 (1809).
D. australiense, Scribn. (*D. aegyptium*, (L.) Willd.)
67. *ELEUSINE*, Gaertn. Fruct. i. 7 (1788).
E. racemosa, Heyne, in Roth. Nov. Sp. Pl. 80 (1817). (*E. verticillata*, Roxb.)
68. *LEPTOCLOA*, Beauv. Agrost. 71. t. 15 (1812).
L. digitata, (R.Br.) Domin, in Biblioth. Bot. lxxxv. 379 (1915). (*L. subdigitata*, Trin.)
- **LOLIUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **L. temulentum*, Linn. (Europ.; As. bor.).
 **L. perenne*, Linn. (Europ.; As. temp.).
 **L. rigidum*, Gaud. (Europ.).
69. *LEPTURUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 207 (1810).
L. cylindricus, Trin. Fund. Agrost. 123 (1820).
70. *AGROPYRON*, Gaertn. in Nov. Comm. Petrop. xiv. I. 539 (1770), (*Agropyrum*, (Beauv.).
A. scabrum, (Labill.) Beauv. Agrost. 102 (1812).
 **A. repens*, (Linn.) Beauv. (Reg. temp.).
 **HORDEUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **H. murinum*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.).
 **H. maritimum*, With. (Europ. Afr. bor.; Oriens.).

Cyperaceae.

1. *LIPOCARPILA*, R.Br. in Tuekey's Narrative of an Exped. to Congo 459 (1818).
L. microcephala, (R.Br.) Kunth. Enum. ii. 268 (1837).
2. *CARPHA*, Banks et Soland. in R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 230 (1810).
C. gracilipes, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 81 (1904).
3. *CYPERUS*, (Mich.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 Subgenus *i. Pycreus*.
C. flavescens, Linn. Sp. Pl. 46 (1753). (*Pycreus flavescens*, (Linn.) Nees.)
C. polystachyus, Rottb. descr. et Icon. pl. 39 (1773). (*P. polystachyus* (R.Br.) Beauv.)
C. Hochstetteri, Nees, in Regensb. Fl. 755 (1845). (*P. albomarginatus*, Nees.)
- Subgenus *ii. Juncellus*.
C. pygmaeus, Rottb. descr. et Icon. pl. 20 (1773). (*Juncellus pygmaeus*, (Rottb.) C. B. Clarke.)
C. laevigatus, Linn. Mant. 179 (1771). (*J. laevigatus*, (Linn.) C. B. Clarke.)
- Subgenus *iii. Eucyperus*.
C. trinervis, R.Br. Prodr. 213 (1810).
C. tenellus, Linn. f. Suppl. 103 (1781).
C. difformis, Linn. Amoen. Acad. iv. 302 (1759).
C. Haspan, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).
C. leucecephalus, Retz. observ. v. 11 (1788).
C. vaginatus, R.Br. Prodr. 213 (1810).
C. Iria, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).
C. aristatus, Rottb. Deser. et Ic. Pl. 23. t. 6. f. i. (1773) (*C. squarrosus*, Benth.)
C. distans, Linn. fil. Suppl. 103 (1781).
C. subulatus, R.Br. Prodr. 217 (1810).
C. sporobolus, R.Br. l. c. 215.
C. stenostachyus, Benth. Fl. Austr. vii. 280 (1878).
C. rotundus, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).

Subgenus iv. Mariscus.

- C. pennatus*, Lam. Illustr. Gen. i. 144 (1799). (*Mariscus albescens*, Gaud.)
- C. conicus*, (R.Br.) Boeckl. in Schlecht. Linnæa. xxxviii. 371 (1874). (*M. cornicus*, R.Br.)
- C. alterniflorus*, R.Br. Prodr. 216 (1810). (*M. alterniflorus*, C. B. Clarke.)
- C. lucidus*, R.Br. l. c. 218. (*M. lucidus*, C. B. Clarke.)
- C. Cunninghamii*, (C. B. Clarke) Gardner, n. comb. (*M. Cunninghamii*, C. B. Clarke.)
- C. fulvus*, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. fulvus*, C. B. Clarke.)
- C. Holoschoenus*, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. Holoschoenus*, C. B. Clarke.)
- C. carinatus*, R.Br. l. c. 216. (*M. carinatus*, C. B. Clarke.)
4. *FUIRENA*, Rottb. Deser. et Icon. 70 (1773).
F. glomerata, Lam. Illustr. Gen. i. 150 (1791).
F. umbellata, Rottb. Deser. et Icon. Pl. 70. t. 19. f. 3 (1773).
5. *SCIRPUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
S. fluitans, Linn. Sp Pl. 48 (1753).
S. cernuus, Vahl. Enum. ii. 245 (1806). (*S. riparius*, Benth.)
S. Isdellensis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 123 (1918).
S. antarcticus, Linn. Mant. ii. 181 (1771). (*S. cartilagineus*, Poir.)
S. arenarius, Benth. Fl. Austr. vii. 325 (1878).
S. multicaulis, (F.v.M.) C. B. Clarke, Kew Bull. Misc. Add. ser. vii. 25 (1908).
S. setaceus, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).
S. nodosus, Rottb. deser. et Icon. Pl. 52. t. 8 (1773).
S. supinus, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).
S. erectus, Poir. Encycl. vi. 761.
S. articulatus, Linn. Sp. Pl. 47 (1753).
S. mucronatus, Linn. l. c. 50.
S. americanus, Pers. Syn. Pl. i. 68 (1805).
S. lacustris, Linn. Sp. Pl. 51 (1753).
S. maritimus, Linn. l. c. 51.
S. littoralis, Schrad. Fl. Germ. i. 142 (1806).
S. Kochii, Maiden et Betche, in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxiii. 318 (1908).
6. *CROSSLANDIA*, W. V. Fitzgerald, in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).
C. setifolia, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).
7. *ELEOCHARIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 224 (1810).
E. compacta, R.Br. Prodr. 224 (1810).
E. atropurpurea, Kunth. Enum. ii. 151 (1837).
E. Dietrichiana, (Boeckel) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 105 (1908).
E. gracilis, R.Br. Prodr. 224 (1810).
E. acuta, R. Br. Prodr. 224 (1810).
8. *FIMBRISTYLIS*, Vahl. Enum. ii. 285 (1806).
F. tetragona, R.Br. Prodr. 226 (1810).
F. pilifera, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 118 (1918).
F. pterygosperma, R.Br. Prodr. 226 (1810).
F. pauciflora, R.Br. l. c. 225.
F. semilevis, (F.v.M.) C. B. Clarke. Kew. Bull. Misc. Add ser. viii. 24 (1908).
F. cardiocarpa, F.v.M. Fragm. i. 194 (1859).
F. denudata, R.Br. Prodr. 227 (1810).
F. caespitosa, R.Br. l. c. 228.
F. diphylla Vahl. Enum. ii. 289 (1806).
F. aestivalis, Vahl. l. c. ii. 289.
F. ferruginea, Vahl. l. c. ii. 291.
F. subaristata, Benth. Fl. Austr. vii. 314 (1878).
F. solidifolia, F.v.M. Fragm. i. 198 (1859).
F. miliacea, Vahl. Enum. ii. 287 (1806).
F. quinquangularis, Kunth. Enum. ii. 229 (1837).
F. rara, R.Br. Prodr. 227 (1810).
F. capitata, R.Br. l. c. 228.
F. Schultzii, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 391 (1874).
F. oligocephala, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).

- F. barbata*, (Rottb.) Benth. Fl. Austr. vii. 321 (1878).
F. capillaris, (Linn.) A. Gray Man. of Bot. N.U.S. ed. 5. 567 (1867).
F. arthrostyloides, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).
- 9. *SCHOENUS***, Linn. Corroll. Gen. 2 (1737).
S. cruentus, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 357 (1878).
S. Benthami, F.v.M. Syst. Cens. Austr. pl. 127 (1882). (*S. compressus*, Benth.)
S. lanatus, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 19. t. 20 (1806).
S. flavus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 278 (1874).
S. barbatus, Boeckl. in l. c. 277.
S. curvifolius, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 358 (1878).
S. capitatus, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 58 (1875). (*S. subbulbosus*, Benth.)
S. aphyllus, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 279 (1874).
S. sesquispiculus, C. B. Clarke Kew Bull. Misc. Add. Ser. viii. 43 (1908).
S. Drummondii, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 359 (1878). (*S. microstachyus*, Nees).
S. nitens, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).
S. cygneus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 (1846).
S. unispiculatus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 365 (1878).
S. breviculmis, Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).
S. pleiostomoneus, F.v.M. Fragm. ix. 52 (1875).
S. trachycarpus, F.v.M. l. c. 33.
S. nanus, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).
S. Rodwayanus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1903).
S. minutulus, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).
S. obtusifolius, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 281 (1874).
S. grammatophyllus, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).
S. asperocarpus, F.v.M. l. c. 29.
S. grandiflorus, (Nees) F.v.M. l. c. 30.
S. calostachyus, (R.Br.) Poir. Encyc. Meth. Suppl. ii. 251 (1811).
S. foliatus, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).
S. multiglumis, Benth. Fl. Austr. vii. 368 (1878).
S. acuminatus, R.Br. Prodr. 231 (1810).
S. falcatus, R.Br. l. c. 232.
S. laevigatus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 111 (1904).
S. caespititius, W. V. Fitzg. l. c. 110.
S. punctatus, R.Br. Prodr. 232 (1810).
S. bifidus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 282 (1874).
S. laxus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales xxviii. 111 (1904).
S. Jamiesonianus, W. V. Fitzg. l. c. xxvii. 245 (1903).
S. brevifolius, R.Br. Prodr. 231 (1810).
S. pedicellatus, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 369 (1878).
S. fascicularis, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. vi. 48 (1842).
S. indutus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 372 (1878).
S. odontocarpus, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).
S. sculptus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 286 (1874).
S. humilis, Benth. Fl. Austr. vii. 374 (1878).
S. axillaris, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).
S. natus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 375 (1878).
- 10. *GYMNOSCHOENUS***, Nees in Ann. Hist. Ser. i. vi. 47 (1841).
G. anceps, (R.Br.) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 92 (1908).
- 11. *MESOMELAENA***, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 88 (1846).
M. stygia, (R.Br.) Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 89 (1846).
M. Preissii, Nees in l. c. 88.
M. ucinata, (Nees) C. B. Clarke in Kew Bull. Add. ser. viii. 48 (1908).
M. tetragona, (R.Br.) F.v.M. Fragm. ix. 36 (1875).
- 12. *LEPIDOSPERMA***, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 14 (1804).
L. gladiatum, Labill. Nov. Holl. Pl. j. 15. t. 12 (1804).
L. effusum, Benth. Fl. Austr. vii. 387 (1878).
L. rupestre, Benth. l. c. 388.
L. tetraquetrum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).
L. longitudinale, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 16. t. 13 (1804).
L. exaltatum, R.Br. Prodr. 234 (1810).
L. angustatum, R.Br. l. c. 235.
P. resinum (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 392 (1878).

- L. viscidum*, R.Br. Prodr. 234 (1810).
L. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vii. 391 (1878).
L. tuberculatum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).
L. Brunonianum, Nees. l. c. 92.
L. costale, Nees. l. c. 92.
L. aphyllum, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. Benthamianum, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).
L. pubisquamum, Steud. Syn. Glum. ii. 158 (1855).
L. scabrum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 92 (1846).
L. gracile, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. tenue, Benth. Fl. Austr. vii. 397 (1878).
L. leptostachyum, Benth. l. c. 397.
L. leptophyllum, Benth. l. c. 398.
L. striatum, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. Exsul, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 47 (1908).
L. carphoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 400 (1878).
13. *TRICOSTULARIA*, Nees in Lehm. Pugill. viii. 50 (1844).
T. compressa, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83 (1846).
T. Neesii, Lehm. in l. c. 83.
14. *REEDIA*, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).
R. spathacea, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).
15. *CLADIUM*, P. Br. Hist. Jamaic. 114 (1756).
C. Drummondii, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).
C. Preissii, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 405 (1878).
C. laxum, (Nees) Benth. l. c. 405.
C. riparium, (Nees) Benth. l. c. 405.
C. schoenoides, R.Br. Prodr. 237 (1810).
C. arthrophyllum, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 14 (1875).
C. glomeratum, R.Br. Prodr. 237 (1810).
C. elynanthoides, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).
C. vaginale, Benth. Fl. Austr. vii. 408 (1878).
C. junceum, R.Br. Prodr. 237 (1810).
16. *RHYNCHOSPORA*, Vahl. Enum. ii. 229 (1806).
R. affinis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 124 (1918).
R. tenuifolia, Benth. Fl. Austr. vii. 350 (1878).
17. *CYATHOCHAETE*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 86 (1846).
C. clandestina, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 351 (1878).
C. australis, (Steud.) Gardner n. comb.
C. teretifolia, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 109 (1904).
18. *TETRARIA*, P. Beauv. in Mem. Inst. Fr. (Acad. Sc. Par) 1812 ii. 54 (1816).
T. australiensis, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 80 (1904).
19. *TETRARIOPSIS*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 45 (1908).
T. octandra, (Nees) C. B. Clarke in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 81 (1904).
20. *GAHNIA*, R et G Forst. Char. Gen. 51 (1776).
G. trifida, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 89. t. 116 (1804).
G. polyphylla, Benth. Fl. Austr. vii. 415 (1878).
G. deusta, (R.Br.) Benth. l. c. 416.
G. aristata, (F.v.M.) Benth. l. c. 416.
G. lanigera, (R.Br.) Benth. l. c. 415.
21. *CAUSTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).
C. pentandra, R.Br. Prodr. 240 (1810).
C. dioica, R. Br. l. c. 239.
C. squamellata, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 48 (1908).
22. *ELANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).
E. aristata, R.Br. Prodr. 239 (1810).
E. pauciflora, R.Br. l. c. 239.
23. *CHRYSITHRIX*, Linn. Mant. ii. 165 (1771).
C. distigmatosa, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 32 (1904).
24. *CHORISANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 221 (1810).
C. enodis, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 73 (1846).
C. multiarticulata, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. iv. 48.
C. cymbaria, R.Br. Prodr. 221 (1810).

25. *CAREX*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. inversa, R.Br. Prodr. 242 (1810).
C. paniculata, Linn.
C. appressa, R.Br. Prodr. 242 (1810).
C. tereticaulis, F.v.M. Fragm. viii. 256 (1874).
C. Preissii, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 94 (1846).
C. pseudocyperus, Linn. Sp. Pl. 978 (1753).
SCHOENUS Andrewsii, W. V. Fitzg. This species, if a valid Schoenus, is not sufficiently described to place it in the sequential list given for that genus.

PRINCIPES.

Palmae.

1. *LIVISTONA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 267 (1810).
L. Alfredi, F.v.M. in Vict. Nat. ix. 112 (1892).
L. Eastoni, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 36 (1923).
L. inermis, R.Br. Prodr. 268 (1810).

SPATHIFLORAE.

Araceae.

1. *COLOCASIA*, Schott, Meletem. i. 18 (1832).
C. antiquorum, Schott, Meletem. bot. 18 (1832).
ZANTEDESCHIA, Spreng. Syst. iii. 765. (1826). (*Richardia*, Kunth.)
**Z. aethiopica*, Spreng. l. c. (Afr. austr.). (*R. africana*, Kunth.)
2. *TYPHONIUM*, Schott, in Wiener Zeitschr. iii. 72 (1829).
T. angustilobium, F.v.M. Fragm. x. 66 (1876).

Lemnaceae.

1. *LEMNA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
L. trisulca, Linn. Sp. Pl. 970 (1753).
L. minor, Linn. l. c. 970.
L. gibba, Linn. l. c. 970.
L. disperma, Hegelm. in Engler's Botan. Jahrb. xxi. 290 (1895).

FARINOSAE.

Flagellariaceae.

1. *FLAGELLARIA*, Linn. Amoen. Acad. 396 (1747).
F. indica, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).

Restionaceae.

1. *LYGINIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).
L. tenax, (Labill) Gardner n. comb. (*L. barbata*, R.Br.)
2. *ECDEIOCOLEA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. viii. 236 (1874).
E. monostachya, F.v.M. Fragm. viii. 236 (1874).
3. *ANARTHRIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).
A. scabra, R.Br. Prodr. 249 (1810).
A. laevis, R.Br. l. c. 249.
A. gracilis, R.Br. l. c. 249.
A. prolifera, R.Br. l. c. 249.
A. polyphylla, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 63 (1846).
4. *LEPYRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 247 (1810).
L. hermaphrodita, R.Br. Prodr. 248 (1810).
L. monoica, F.v.M. Fragm. viii. 76 (1873).
L. Muirii, F.v.M. l. c. 78.
L. helcocharoides, Gilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 87 (1904).
L. stricta, R.Br. Prodr. 248 (1810).
L. maera, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 60 (1846).
L. Drummondiana, Steud. Syn. Glum. ii. 248 (1855).
L. glauca, (Nees) F.v.M. Fragm. viii. 77 (1873).
L. anaetocolea, F.v.M. Fragm. viii. 78 (1873).

5. *RESTIO*, Linn. Syst. Nat. ed. 12. ii. 735 (1767).
R. megalotheca, F.v.M. Fragm. viii. 99 (1873).
R. applanatus, Spreng. Syst. i. 185 (1825).
R. confertospicatus, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).
R. sphacelatus, R.Br. Prodr. 246 (1810).
R. deformis, R.Br. l. c. 245.
R. stenostachyus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).
R. crispatus, R.Br. Prodr. 246 (1810).
R. nitens, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 59 (1846).
R. gracilior, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 226 (1878).
R. chaunocoleus, F.v.M. Fragm. viii. 64 (1873).
R. laxis, R. Br. Prodr. 245 (1810).
R. ornatus, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).
R. leucoblephara, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
R. leptocarpoides, Benth. Fl. Austr. vii. 229 (1878).
R. amblycoleus, F.v.M. Fragm. viii. 65 (1873).
R. Dielsii, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
R. tremulus, R.Br. Prodr. 245 (1810).
6. *DIELSLIA*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
D. cygnorum, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
7. *HOPKINSIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 33 (1904).
H. calovaginata, (Gilg.) Pilger in Engler's Pflanzenfam. Nachtrage iii. zu. ii. 4. 35 (1908). (*H. scabrida*, W. V. Fitzg.)
8. *LEPTOCARPUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 250 (1810).
L. scariosus, R.Br. Prodr. 250 (1810).
L. tenax, (Labill) R. Br. Prodr. 250 (1810).
L. Brownii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 73. t. 136 (1860).
L. canus, Nees in Ann. Hist. ser. 1. vi. 50 (1843).
L. coangustatus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 65 (1846).
L. humilis, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).
L. aristatus, R.Br. Prodr. 250 (1810).
L. erianthus, Benth. Fl. Austr. vii. 235 (1878).
9. *LOXOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 249 (1810).
L. myrioclada, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 90 (1904).
L. densa (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 241 (1878).
L. vestita, Benth. l. c. 241.
L. virgata, Benth. l. c. 242.
L. pubescens, (R.Br.) Benth. l. c. 242.
L. fasciculata, (R.Br.) Benth. l. c. 242.
L. flexuosa, (R.Br.) Benth. l. c. 243.
L. cinerea, R.Br. Prodr. 249 (1810).
10. *HARPERIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 34 (1904).
H. lateriflora, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 35 (1904).
11. *LEPIDOBOLUS*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).
L. Preissianus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).
L. chaetocephalus, F.v.M. Fragm. viii. 84 (1873).
L. deserti, Gilg in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 91 (1904).
12. *CHAETANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
C. leptocarpoides, R.Br. Prodr. 251 (1810).
13. *ONYCHOSEPALUM*, Steud. Syn. Pl. Glum. ii. 249 (1855).
O. laxiflorum, Steud. Syn. Glum. ii. 249 (1855).
14. *HYPOLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
H. ramosissima, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).
H. fasciculata, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).
H. gracillima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 239 (1878).
H. exsulca, R.Br. Prodr. 251 (1810).

Centrolepidaceae.

1. *HYDATELLA*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 93 (1904).
H. australis Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 93 (1904).
H. leptogyne, Diels, in l. c. 93.
2. *TRITHURIA*, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 137 (1860).
H. submersa, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 138 (1860). (*T. occidentalis*,
 Benth.)
T. bibracteata, Stapf.
T. micranthera, Stapf.
3. *BRIZULA*, Hieron. in Bot. Zeit. xxx. 206 (1872).
B. nutans, (Hook. f.) Gardner. n. comb.
B. gracilis, (Sond.) Hieron. in Abb. Naturf. Ges. Halle xii. 92 (1873).
 (*Aphelia gracilis*, Sond.)
B. Drummondii, Hieron. l. c. 92.
B. Muelleri, Hieron. l. c. 93.
4. *APHELIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
A. cyperoides, R.Br. Prodr. 252 (1810).
5. *CENTROLEPIS*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 7 (1804).
C. humillima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 203 (1878).
C. polygyna, (R.Br.) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle. xii. 96 (1873).
C. alepyroides, (Nees) Hieron. l. c. 96.
C. mutica, (R.Br.) Hieron. l. c. 96.
C. glabra, (F.v.M.) Hieron. l. c. 96.
C. aristata, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).
C. basiflora, Ostf. Det. Kgl. Danske Vidensk. Selskab. iii. 2. 13 (1921).
C. inconspicua, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 107 (1904).
C. Drummondii, (Nees) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle. xii. 98
 (1873).
C. Banksii, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).
C. pilosa, Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle 102 (1873).
C. strigosa, (R.Br.) Roem. et Schultz, Syst. Veg. i. 43 (1817).
C. exserta, (R.Br.) Roem. et Schultz. l. c. 44.

Xyridaceae.

1. *XYRIS*, Linn. Gen. Pl. ii. (1737).
X. complanata, R.Br. Prodr. 256 (1810).
X. pauciflora, Willd. Phyt. 2. t. 1 (1794).
X. lacera, R.Br. Prodr. 257 (1810).
X. flexifolia, R.Br. l. c. 256.
X. lanata, R.Br. l. c. 257.
X. laxiflora, F.v.M. Fragm. viii. 203 (1874).
X. gracillima, F.v.M. l. c. 203.

Eriocaulaceae.

1. *ERIOCAULON*, Linn. Gen. Pl. ed. 2. 35 (1742).
E. setaceum, Linn. Sp. Pl. 87 (1753).
E. quinquangulare, Linn. l. c. 87.
E. cinereum, R.Br. Prodr. 254 (1810).
E. nigricans, R.Br. l. c. 254.
E. lividum, F.v.M. Fragm. i. 92 (1858).

Commelinaceae.

1. *CYANOTIS*, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 45 (1825).
C. axillaris, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 46 (1825).
2. *COMMELINA*, (Plum.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. ensifolia, R.Br. Prodr. 269 (1810).
C. lanceolata, R.Br. l. c. 269.
3. *ANEILEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 270 (1810).
A. gramineum, R.Br. Prodr. 270 (1810).
4. *CARTONEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 271 (1810).
C. philydroides, F.v.M. Fragm. i. 62 (1858).
C. spicatum, R.Br. Prodr. 271 (1810).
C. parviflorum, Hassk. Flora Regensb. 365 (1869).

Pontederiaceae.

1. *MONOCHORIA*, Presl. Reliq. Haenk. i. 127 (1827).
M. cynea, F.v.M. Fragm. viii. 44 (1872).

Philydraceae.

1. *PHILYDRUM*, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).
P. lanuginosum, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).
2. *PRITZELIA*, F.v.M. Papuan Plants. 13 (1875).
P. pygmaea, (R.Br.) F.v.M. Papuan Plants 13 (1875).

Juncaceae.

1. *JUNCUS*, Linn. Gen. Pl. ed. i. 104 (1737).
J. gracilis, R.Br. Prodr. 259 (1810).
J. planifolius, R.Br. l. c. 259.
J. caespititius, E. Mey. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 47 (1846).
J. bufonius, Linn. Sp. Pl. 328 (1753).
J. plebius, R.Br. Prodr. 259 (1810). (*J. homalocaulis*, F.v.M.)
J. effusus, Linn. Sp. Pl. ed. i. 326 (1753). (*J. communis*, E. Mey.)
J. pallidus, R.Br. Prodr. 258 (1810).
J. radula, Buchenau Krit. Verzeichn. aller Juncac. 38 (1880).
J. maritimus, Lam. Encycl. Meth. iii. 264 (1789).
J. polyanthemus, Buchen, in Engler's Botan. Jahrb. xx. 261 (1895).
J. holoschoenus, R.Br. Prodr. 259 (1810).
2. *LUZULA*, D. C. Fl. France, iii. 158 (1805).
L. campestris, D. C. Fl. France, iii. 161 (1805).

Liliaceae.

1. *BURCHARDIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 272 (1810).
B. umbellata, R.Br. Prodr. 273 (1810).
B. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
2. *WURMBALA*, Thunb. Nov. Gen. i. 18. t. 1 (1781). (*Anguillaria*, R.Br. p.p.)
W. tubulosa, Benth. Fl. Austr. vii. 28 (1878).
W. pygmaea (Endl.) Benth. l. c. 28.
W. dioica, (R.Br.) F.v.M. Fragm. x. 119 (1877).
3. *IPHIGENIA*, Kunth, Enum. Pl. iv. 212 (1843).
I. indica, Kunth. enum. Pl. iv. 213 (1843).
**ASPHODELUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. fistulosus*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens).
4. *BULBINE*, Linn. Hort. Cliff. 122 (1737).
B. semibarbata, (R.Br.) Haw. Rev. Pl. Succul. 33 (1821).
5. *THYSANOTUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 282 (1810).
T. multiflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).
T. triandrus, (Labill) R.Br. l. c. 284.
T. Bentianus, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxi. 546 (1909).
T. glaucus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38 (1846).
T. Drummondii, Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 341 (1876).
T. pauciflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).
T. asper, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
T. gageoides, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 99 (1904).
T. chinensis, Benth. Fl. Hong kong. 37 (1861). (*T. chrysantherus*, F.v.M.)
T. isantherus, R.Br. Prodr. 283 (1810).
T. tenellus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37 (1846).
T. scaber, Endl. in l. c. 37.
T. tuberosus, R.Br. Prodr. 282 (1810).
T. thyrsoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 336 (1876).
T. Patersoni, R.Br. Prodr. 284 (1810).
T. dichotomus, (Labill) R.Br. l. c. 284.
T. arbusecula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 339 (1876).
T. anceps, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
6. *DICHOPOGON*, Kunth. Enum. Pl. iv. 622 (1843).
D. strictus, (R.Br.) J. G. Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 319 (1876).
D. fimbriatus (R.Br.) Macbride in Contr. Gray Herb. in. s. lvi. 2 (1918).
(*D. Sieberianus*, Kunth.)

7. *ARTHROPODIUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 276 (1810).
A. capillipes, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 34 (1846).
A. Preissii, Endl. in l. c. 35.
8. *CHAMAESCILLA*, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. corymbosa, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. spiralis, (Endl.) F.v.M. l. c. 68.
9. *TRICORYNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).
T. elatior, R.Br. Prodr. 278 (1810).
T. humilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 (1846).
10. *AGROSTOCRINUM*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 95 (1860).
A. scabrum (R.Br.) Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1119 (1893). (*A. stypandroides*, F.v.M.)
11. *CAESIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 277 (1810).
C. vittata, R.Br. Prodr. 277 (1810).
C. parviflora, R.Br. l. c. 277.
C. rigidifolia, F.v.M. Fragm. x. 48 (1876).
12. *CORYNOTHECA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 68 (1870).
C. lateriflora, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. micrantha, (Lindl.) Macbride, Contr. Grey. Herb. lvi. 3 (1918). (*C. dichotoma*, F.v.M.)
C. acanthoelada, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
13. *HODGSONIOLA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 176 (1861).
H. junceiformis, F.v.M. Fragm. ii. 176 (1861).
14. *STYPANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).
S. imbricata, R.Br. Prodr. 279 (1810).
S. grandiflora, Lindl. Swan Riv. App. 57 (1839).
15. *DIANELLA*, Lam. Encycl. Mèth. ii. t. 250 (1786).
D. revoluta, R.Br. Prodr. 280 (1810).
D. coerulea, Sims. Bot. Mag. t. 505 (1799).
16. *BARTLINGIA*, F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870). (*Laxmannia*, R.Br. non Forst.)
B. grandiflora, (Lindl.) F.v.M. Cens. Austr. Pl. 118 (1882).
B. squarrosa, (Lindl.) F.v.M. l. c. 118.
B. minor, (R.Br.) F.v.M. l. c. 118.
B. ramosa, (Lindl.) F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870).
B. sessiliflora, (Dene) F.v.M. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 116 (1877).
B. brachyphylla, F.v.M. Cens. Austr. P. 119 (1882).
B. sessilis, (Lindl.) F.v.M. l. c. 119.
17. *SOWERBAEA*, Smith. in Trans. Linn. Soc. v. 159 (1800).
S. multicaulis, E. Pritzl, in Engler's Jahrb. xxxv. 99 (1904).
S. laxiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 10 (1841).
18. *STAWELLIA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 85 (1870).
S. dimorphantha, F.v.M. Fragm. vii. 85 (1870).
S. gymnocephala, Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 100 (1904).
19. *BORYA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81 t. 107 (1804).
B. nitida, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81. t. 107 (1804).
B. subulata Gardner Bull. For. Dep. xxxii. 38 (1923).
20. *JOHNSONIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 287 (1810).
J. lupulina, R.Br. Prodr. 287 (1810).
J. pubescens, Lindl. Swan. Riv. App. 57 (1839).
J. acaulis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
21. *HENSMANIA*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 105 (1903).
H. turbinata, (Endl.) W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1903).
22. *ARNOCRINUM*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
A. Drummondii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
A. Preissii, Lehm. in l. c. 42.
23. *DASYPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).
D. bromeliacifolius, R.Br. Prodr. 263 (1810).
D. Hookeri, Drum. in Hook. Loud. Journ. Bot. ii. 168 (1843).

24. *ACANTHOCARPUS*, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).
A. Preissii, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).
A. serra, (Endl.) Ewart, Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 220 (1916).
A. fimbriata, (F.v.M.) Ewart, l. c. 220.
25. *LOMANDRA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 92 (1804). (*Xerotes*, R.Br.)
L. rigida, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 93. t. 120 (1804).
L. Drummondii, (F.v.M.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. Sonderi, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.
L. odora, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. multiflora, (R.Br.) J. Britt. in Bot. Cook's Voy. 95 (1905).
L. Ordii, (F.v.M.) Ewart in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. Endlicheri, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.
L. sericea, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. purpurea, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. Preissii, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. effusa, (Lindl.) Ewart, l. c. 219.
L. micrantha, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. caespitosa, (Benth.) Ewart, l. c. 220.
L. hermaphrodita, (C. Andrews) Gardner. n. comb.
L. pauciflora, (R.Br.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. glauca, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. rupestris, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. collina, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. suaveolens, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. spartea, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. leucocephala, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. hastilis, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
26. *XANTHORRHOEA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 219 (1798).
X. gracilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).
X. reflexa, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vi. pt. i. 33 (1920).
X. brevistyla, Herbert, l. c. vii. 82 (1921).
X. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).
X. nana, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vii. 83 (1921).
27. *KINGIA*, R.Br. in King's Narr. and Surv. Austr. Coasts, ii. 529 (1827).
K. australis, R.Br. in l. c. ii. 535, t. c. (1827).
28. *BAXTERIA*, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).
B. australis, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).
29. *CALECTASIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).
C. cyanea, R.Br. Prodr. 264 (1810).
30. *ASPARAGUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. racemosus, Willd. Sp. Pl. ii. 152 (1799).
31. *RHIPOGONUM*, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776).
R. album, R.Br. Prodr. 293 (1810).

Haemodoraceae.

1. *HAEMODORUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. 213 (1798).
H. sparsiflorum, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).
H. spicatum, R.Br. Prodr. 300 (1810).
H. brevisepalum, Benth. Fl. Austr. vi. 420 (1873).
H. paniculatum, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
H. laxum, R.Br. Prodr. 300 (1810).
H. simplex, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
H. simulans, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).
H. longifolium, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 127 (1918).
H. flaviflorum, W. V. Fitzg. in l. c. 128.
H. parviflorum, Benth. Fl. Austr. vi. 423 (1873).
2. *PHLEBOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 301 (1810).
P. ciliata, R.Br. Prodr. 301 (1810).
P. pilosissima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 425 (1873).
P. filifolia, (F.v.M.) Benth. l. c. 425.

Amaryllidaceae.

1. *CRINUM*, Linn. Gen. Pl. 97 (1737).
C. asiaticum, Sp. Pl. 292 (1753).
2. *HYPONIS*, Linn. Syst. ed. x. 986 (1759).
H. glabella, R.Br. Prodr. 289 (1810).
H. occidentalis, Benth. Fl. Austr. vi. 451 (1873).
H. leptantha, Benth. l. c. 451.
3. *MACROPIDIA*, Drum. c. Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 57 (1855).
M. fuliginosa, (Hook) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 1916, 634 (1917). (*M. fumosa*, Drum.)
4. *TRIBONANTHES*, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).
T. brachypetala, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
T. uniflora, Lindl. l. c. 44.
T. australis, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).
T. variabilis, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
T. longipetala, Lindl. l. c. 44.
5. *BLANCOA*, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
B. canescens, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
6. *CONOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 300 (1810).
C. Androstemma, F.v.M. Fragm. viii. 19 (1873). (*A. junceum*, Lindl. 1839.)
C. Bealiana, F.v.M. Fragm. ix. 50 (1875).
C. filifolia, F.v.M. l. c. viii. 18 (1873).
C. spinuligera, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 438 (1873).
C. bromelioides, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. phathyrantha, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 111 (1904).
C. aculeata, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. laxiflora, Benth. Fl. Austr. vi. 439 (1873).
C. cymosa, (F.v.M.) Benth. l. c. 439.
C. Harperiana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1904).
C. serrulata, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. caricina, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
C. gladiata, Benth. Fl. Austr. vi. 434 (1873).
C. scorsiflora, F.v.M. Fragm. i. 158 (1859).
C. teretiusecula, F.v.M. l. c. viii. 18 (1872).
C. stylioides, F.v.M. l. c. 17.
C. prolifera, Benth. Fl. Austr. vi. 436 (1873).
C. racemosa, Benth. l. c. 436.
C. candicans, Endl. Nov. Stirp. dec. 20 (1839).
C. dealbata, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
C. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. robusta, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 109 (1904).
C. bracteata, Engl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 16 (1846).
C. involuerata, Endl. l. c. 23.
C. juncea, Endl. Nov. Stirp. dec. 19 (1839).
C. vaginata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 23 (1846).
C. petrophiloides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 431 (1873).
C. setosa, Lindl. Swan Riv. App. 44 t. 6 (1839).
C. aurea, Lindl. l. c. 44.
C. melanopogon, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. setigera, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. psyllium, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 1 (1846).
C. Dielsii, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. n. 11 82 (1903).
C. villosa, Benth. Fl. Austr. vi. 433 (1873).
C. Drummondii, Benth. l. c. 433.
C. breviscapa, R.Br. Prodr. 301 (1810).
7. *ANIGOZANTHOS*, Labill. Voy. i. 409, t. 22 (1798).
A. rufa, Labill. Voy. i. 411, t. 22 (1798).
A. pulcherrima, Hook. Bot. Mag. t. 4180 (1845).
A. flavida, Redoute et D.C. Lil. t. 176 (1807).
A. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1846).
A. humilis, Lindl. Swan Riv. App. 46 t. 6b (1839). (*A. Dorrienii*, Domin.)
A. viridis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 25 (1847).
A. Manglesii, D. Don in Sweet Brit. Fl. Gard. ser. ii. t. 265 (1836).
A. bicolor, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1847). (*A. Gabrielae*, Domin.)

Taccaceae.

1. *TACCA*, Forst Char. Gen. 65 (1776).
T. pinnatifida, R. et G. Forst, Char. Gen. 65 (1776).

Dioscoreaceae.

1. *DIOSCOREA*, (Plum.) Linn. Gen. ed. i. 306 (1737).
D. hastifolia, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 33 (1846).

Iridaceae.

- **ROMULEA*, Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae. 13. t. 1 (1772).
 **R. rosca*, (Linn.) Eekl. (Afr. austr.)
 **R. parviflora*, (Salisb.) J. Britten. (Europ. occ.)
 **HOMERIA*, Vent. Dec. Gen. Nov. 5 (1808).
 **H. collina*, (Thunb.) Vent. (Afr. austr.)
 **H. miniata*, Sweet. (Afr. austr.)
1. *PATERSONIA*, R.Br. in Bot. Mag. t. 1041 (1807).
P. occidentalis, R.Br. Prodr. 304 (1810).
P. umbrosa, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 31 (1846).
P. xanthina, F.v.M. Fragm. i. 214 (1859).
P. limbata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).
P. juncea, Lindl. Swan River App. 58 (1839).
P. Maxwelli, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 405 (1873).
P. pygmaea, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
P. lanata, R.Br. Prodr. 303 (1810).
P. rudis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).
P. macrantha, Benth. Fl. Austr. vi. 407 (1873).
P. Drummondii, (F.v.M.) Benth. l. e. 407.
P. inaequalis, Benth. l. e. 408.
P. graminea, Benth. l. e. 408.
P. babianoides, Benth. l. e. 408.
 2. *ORTHROSANTHUS*, Sweet, Fl. Austral. t. 11 (1827).
O. multiflorus, Sweet, Fl. Austr. t. 11 (1827).
O. Muellieri, Benth. Fl. Austr. vi. 411 (1873).
O. laxus, (Endl.) Benth. l. e. 411.
O. gramineus, (Endl.) Benth. l. e. 411.
O. polystachyus, Benth. l. e. 411.

MICROSPERMAE.

Burmanniaceae.

1. *BURMANNIA*, Linn. Syst. Nat. 8 (1737).
B. disticha, Linn. Sp. Pl. 287 (1753).

Orchidaceae.

II. Monandrac-Acrotonae.

a.—Aceranthae-Convolutae.

Thelymitreae.

1. *THELYMITRA*, Forst. Char. Gen. 97 (1776).
T. ixioides, Swartz, in K. Acad. Stockh. Handl. 228, t. 3 (1800).
T. canaliculata, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. crinita, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).
T. fasciculata, Fitzg. Austr. Ore. ii. t. 29 (1888).
T. aristata, Lindl. Gen. et. sp. Orch. 521 (1840).
T. longifolia, Forst. Char. Gen. 98, t. 49 (1776).
T. pauciflora, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. mucida, Fitz. in Gard. Chron. ii. 497 (1882).
T. villosa, Lindl. Swan Riv. App. 49, t. 8c (1839).
T. tigrina, R.Br. Prodr. 315 (1810).
T. stellata, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).
T. fusco-lutea, R.Br. Prodr. 315 (1810).
T. flexuosa, Endl. Nov. Stirp. Dec. 23 (1839).
T. antennifera, (Lindl.) Hook, f. Fl. Tasm. ii. 4, t. 101a (1860).
T. psammophila, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).
T. carnea, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. Macmillani, F.v.M. Fragm. v. 93 (1865).
T. variegata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vi. 323 (1873).

2. *EPIBLEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 315 (1810).
E. grandiflorum R.Br. Prodr. 315 (1810).
Diurideae.
3. *DIURIS*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 122 (1798).
D. laevis Fitzg. in Gard. Chron. xvii. pt. i. 495 (1882).
D. Purdei, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. ii. 79 (1903).
D. setacea, R.Br. Prodr. 316 (1810).
D. emarginata, R.Br. l. c. 316.
D. longifolia, R.Br. l. c. 316.
D. pauciflora, R.Br. l. c. 316.
D. carinata, Lindl. Gen et Sp. Orch. 510 (1840).
4. *MICROTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).
M. porrifolia, R.Br. Prodr. 320 (1810).
M. truncata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 326 (1920).
M. parviflora, R.Br. Prodr. 321 (1810).
M. media, R.Br. l. c. 321.
M. alba, R.Br. l. c. 321.
M. orbicularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxi. 63 (1907).
M. atrata, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
M. pulchella, R.Br. Prodr. 321 (1810).
M. gymnenoides, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. ii. 79 (1903).
5. *GOADBYELLA*, Rogers, in Trans. Roy. Soc. South Australia, li. 294 (1927).
G. gracilis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. li. 294 (1927).
6. *PRASOPHYLLUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).
P. australe R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. elatum, R.Br. l. c. 318.
P. Muelleri, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. Ser. I. ix. 19 (1906).
P. regium, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlii. 27 (1918).
P. lanceolatum, Rogers, in l. c. xlv. 325 (1920).
P. ellipticum, Rogers, in l. c. 325.
P. fimbria, Reichb. fl. Beitr. 60 (1871).
P. hians, Reichb. f. l. c. 59.
P. cyphochilum, Benth. Fl. Austr. vi. 340 (1873).
P. ovale, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
P. macrostachyum, R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. attenuatum, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 495 (1882).
P. plumaeforme, R. Fitzg. l. c. 495.
P. triangulare, R. Fitzg. l. c. 495.
P. parvifolium, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
P. gibbosum, R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. cucullatum, Reichb. fl. Beitr. 59 (1871).
- Pterostylideae.*
7. *CALEANA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 329 (1810).
C. nigrita, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
8. *SPICULAEA*, Lindl. Swan Riv. Append. 56 (1839).
S. ciliata, Lindl. Swan Riv. App. 56 (1839).
9. *DRAKAEA*, Lindl. Bot. Reg. xxv. App. 55 (1834).
D. elastica, Lindl. Swan Riv. App. 55 (1839).
D. Fitzgeraldii, Sehltr. in Fedde, Repert. Spec. Nov. xvii. 81 (1921).
D. glyptodon, Fitzg. in Gard. Chron. i. 494 (1882).
D. Jeanensis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. xlv. 322. t. 13 (1920).
10. *PTEROSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 326 (1810).
P. nana, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. pyramidalis, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
P. reflexa, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. robusta, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 296 (1927).
P. constricta, O. H. Sargent, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. iv. 24 (1907).
P. recurva, Benth. Fl. Austr. vi. 360 (1873).
P. turfosa, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5 (1846).
P. rufa, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. Sargentii, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).
P. vittata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).

Caladenieae.

11. *ACIANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 321 (1810).
A. exsertus, R.Br. Prodr. 321 (1810)—A species stated to occur in Western Australia, but no authentic record seen by me.
12. *CYRTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 322 (1810).
C. reniformis, R.Br. Prodr. 322 (1810).
13. *CALOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).
C. Robertsoni, Benth. Fl. Austr. vi. 315 (1873).
14. *ERIOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).
E. scaber Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
E. tenuis, Lindl. l. c. 53.
E. dilatatus, Lindl. l. c. 53.
E. multiflorus Lindl. l. c. 53.
15. *LYPERANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).
L. nigricans R.Br. Prodr. 325 (1810).
L. serratus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 393 (1840).
L. Forrestii, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 55 (1882).
16. *LEPTOCERAS*, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
L. fimbriata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
17. *CALADENIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).
C. Menziesii, R.Br. Prodr. 325 (1810).
C. Bryceana, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxviii. 359. t. 18 (1914).
C. discoidea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. Cairnsiana, F.v.M. Fragm. vii. 31 (1869).
C. multielavia, Reichb. fil. Beitr. 64 (1871).
C. reticulata, R. Fitzg. Austr. Orch. II. ix. 2 (1883).
C. filamentosa, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. Dorrienii, Domin, in Journ. Linn. Soc. xli. 251 (1913).
C. tentaculata, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xii. 130 (1889).
C. Patersoni, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 324 (1810) v. *Longicauda*, (Lindl.) Rogers.
C. pectinata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 352 (1920).
C. lobata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).
C. dilatata, R.Br. Prodr. 325 (1810).
C. radialis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 296 (1927).
C. clavigera, A. Cunn. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 422 (1840).
C. plicata, R. Fitzg. in Gard. Chron. vii. i. 461 (1882).
C. cristata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlvii. 337 (1923).
C. macrostylis, Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).
C. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).
C. triangularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 10 (1927).
C. hirta, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. lavandulacea, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 11 (1927).
C. Roei, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).
C. Douchae, O. H. Sargent, in Journ. Bot. lix. 175 (1921).
C. Barbarossae, Reichb. fil. Beitr. 64 (1871).
C. flava, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. paniculata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 461 (1882).
C. Purdieana, C. Andrews, in Journ. Proc. Muell. Bot. Soc. i. 39 (1902).
C. unita, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).
C. latifolia, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. reptans, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. nana, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 7 (1846).
C. tenuis, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).
C. carnea, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. aphylla, Benth. Fl. Austr. vi. 387 (1873).
C. saccharata, Reichb. fil. Beitr. 63 (1871).
C. deformis, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. sericea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. gemmata, Lindl. l. c. 52. (*C. Gertrudae*, Ostf.)
C. ixioides, Lindl. l. c. 52.
18. *GLOSSODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).
G. Brunonis, Endl. Nov. Stirp. Dec. 16 (1839).
G. intermedia, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 462 (1882).
G. emarginata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 424 (1840).

Pogoniace.

19. *CORYSANTHES*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 328 (1810).
C. fimbriata, R.Br. Prodr. 328 (1810).
20. *CRYPTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).
C. ovata, R.Br. Prodr. 317 (1810).

Gastrodinac.

21. *GASTRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 330 (1810).
G. sesamoides, R.Br. Prodr. 330 (1810).

Rhizanthellinae.

22. *RHIZANTHELLA*, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).
R. Gardneri, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).

Pleuranthae.

*Convolutae.**Cyrtopodiinae.*

23. *EULOPHIA*, R.Br. (ex. Lindl.) in Bot. Reg. t. 686 (1823).
E. venosa, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 300 (1873).

II.—DUPLICATE.—Sympodiales.

Dendrobiinae.

24. *DENDROBIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 82 (1799).
D. dieuphum, F.v.M. Fragm. viii. 28 (1871).

Cymbidiinae.

25. *CYMBIDIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 70 (1799).
C. canaliculatum, R.Br. Prodr. 331 (1810).

DICOTYLEDONEAE.

ARCHICHLAMYDEAE.

Casuarinaceae.

1. *CASUARINA*, (Rumph.) Linn. Amoen. Acad. iv. 143 (1759).
C. Stowardi, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 193 (1920).
C. acutivalvis, F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).
C. glauca, Sieber, in Spreng. Syst. Veg. iii. 803 (1826).
C. Prinsepiana, C. Andrews, in Journ. W. Austr. Nat. Hist. Soc. i. 43 (1904).
C. lepidophloia, F.v.M. Fragm. x. 115 (1877).
C. Huegeliana, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 640 (1845). (*C. Dorrienti*,
 Domin.)
C. campestris, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 126 (1904).
C. Fraseriana, Miq. Rev. Crit. Cas. 59, t. 6d (1848).
C. Baxteriana, Miq. Rev. Cas. 37. t. 3c (1848).
C. bicuspidata, Benth. Fl. Austr. vi. 202 (1873).
C. trichodon, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 639 (1845).
C. corniculata, F.v.M. Fragm. x. 62 (1876). (*C. horrida*, Herbert; *C. spinosissima*, Gardn.)
C. decussata, Benth. Fl. Austr. vi. 200 (1873).
C. Decaisneana, F.v.M. Fragm. i. 61 (1858).
C. Helmsii, Ewart et Gordon, in Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. xxxii, 192 (1920).
C. humilis, Otto et Dietr. Allg. Gartenz., ix. 163 (1841). (*C. leptotrema*, S.
 Moore.)
C. Drummondiana, Miq. Rev. Crit. Casuar. xxvi. t. 1d (1848).
C. microstachya, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 642 (1845).
C. thuyoides, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 641 (1845).
C. acuaria, F.v.M., in Journ. Bot. v. 212 (1868).
C. fibrosa, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 61 (1928).
C. grevilleoides, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 130 (1904).

URTICALES.

Ulmaceae.

1. *CELTIS*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. I. 337 (1737).
C. philippinensis, Blanco, Fl. Philip. ed. i. 197 (1837).
2. *TREMA*, Lour. Fl. Cochinchin. 562 (1790).
T. aspera, Blume, Mus. Bot. Ludg. Batav. ii. 58 (1851).

Moraceae.

1. *FIGUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1755).
 - F. nesophila*, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 286 (1867).
 - F. eugenioides*, F.v.M. Docum. Intern. Exhib. 26 (1866).
 - F. leucotricha*, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 285 (1867).
 - F. puberula*, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vi. 562 (1847).
 - F. platypoda*, A. Cunn. l. c. 561.
 - F. coronulata*, F.v.M. in Journ. Bot. Neerland. 241 (1861).
 - F. scabra*, Forst. f. Prodr. 76 (1786).
 - F. orbicularis*, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vii. 426 (1848).
 - F. aculeata*, A. Cunn. l. c. 426.
 - F. scobina*, Benth. Fl. Austr. vi. 176 (1873).
 - F. hispida*, Linn. fil. Suppl. 442 (1781).
 - F. glomerata*, Willd. Sp. Pl. iv. 1148 (1806).

Urticaceae.

- **URTICA*, (Thorn.) Linn. Syst. ed. I. (1753).
 **U. urens*, Linn. (Cosmop.).
1. *POUZOLSIA*, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 503 (1826).
 - P. indica*, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 503 (1826).
 2. *PARIETARIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 - P. debilis*, Forst. fil. Prodr. 73 (1786).

PROTEALES.

Proteaceae.

I.—Persoonioideae.

1. *PERSOONIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 215 (1798).
 - P. hakeiformis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
 - P. teretifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
 - P. saccata*, R.Br. Prodr. Suppl. 12 (1830).
 - P. Saundersiana*, Kipp. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
 - P. diadema*, F.v.M. Fragm. x. 46 (1876).
 - P. comata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).
 - P. brachystylis*, F.v.M. Fragm. vi. 221 (1868).
 - P. falcata*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
 - P. trinervis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
 - P. tortifolia*, Meissn. l. c. 185.
 - P. angustiflora*, Benth. Fl. Austr. v. 386 (1870).
 - P. rudis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
 - P. microcarpa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
 - P. sulcata*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
 - P. acicularis*, F.v.M. Fragm. vi. 220 (1868).
 - P. scabrella*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
 - P. dillwynioides*, Meissn. l. c. iv. 185 (1852).
 - P. striata*, R.Br. Prodr. Suppl. 13 (1830).
 - P. quinquenervis*, Hook. Ic. Pl. t. 425 (1842).
 - P. rufiflora*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
 - P. scabra*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
 - P. graminea*, R.Br. l. c. 164.
 - P. longifolia*, R.Br. l. c. 164.
 - P. articulata*, R.Br. l. c. 164.
 - P. elliptica*, R.Br. l. c. 164.
 - P. leucopogon*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 220 (1898).
 - P. pungens*, W. V. Fitzg., Journ. Bot. l. 23 (1912).
2. *FRANKLANDIA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
 - F. fucifolia*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
 - F. triaristata*, Benth. Fl. Austr. v. 377 (1870).
3. *ISOPOGON*, R.Br. ex Knight, Prot. 93 (1809).
 - I. latifolius*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
 - I. cuneatus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
 - I. linearis*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
 - I. polycephalus*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
 - I. attenuatus*, R.Br. l. c. 73.
 - I. sphaerocephalus*, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
 - I. uncinatus*, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).

- I. buxifolius*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. axillaris, R.Br. l.c. 74.
I. tridens, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).
I. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).
I. roseus, Lindl. Bot. Reg. 37 (1842).
I. adenanthoides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
I. trilobus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810).
I. tripartitus, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
I. longifolius, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. Drummondii, Benth. Fl. Austr. v. 344 (1870).
I. heterophyllus, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 504 (1844).
I. villosus, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
I. alceicornis, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 134 (1904).
I. teretifolius, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 71 (1810).
I. asper, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
I. crithmifolius, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).
I. formosus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810). (*I. occidentalis*, Herbert.)
I. divergens, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).
I. scabriusculus, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).
- 4. PETROPHILA**, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 67 (1810).
P. teretifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 68 (1810).
P. longifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. media R.Br. l. c. 5.
P. acicularis R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).
P. megalostegia F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).
P. linearis R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. anceps, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. heterophylla, Lindl. Swan Riv. App. 35 (1839).
P. biloba, R.Br. Prodr. Suppl. 7. (1830).
P. propinqua, R.Br. l. c. 7.
P. squamata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. colorata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).
P. striata, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. divaricata, R.Br. l. c. 7.
P. serruriae, R.Br. l. c. 6.
P. inconspicua, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).
P. trifida, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. carduacea, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).
P. Shuttleworthiana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).
P. macrostachya, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).
P. diversifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. biternata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
P. plumosa, Meissn. l. c. 69.
P. glabriflora, Domin. New Add. Flora W.A. 3 (1923).
P. ericifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. scabriuscula, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 495 (1844).
P. chrysantha, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).
P. fastigiata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 76 (1810).
P. seminuda, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
P. circinata, Kippist, ex. Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).
P. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 496 (1844).
P. crispata, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. rigida, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).
P. conifera, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).
P. semifurcata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 335 (1870).
P. incurvata, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. 1. 22 (1912).
- 5. ADENANTHOS**, Labill. Nov. Holl. Pl. sp. i. 28. t. 36 (1804).
A. Detmoldi, F.v.M. Fragm. viii. 149 (1874).
A. barbiger, Lindl. Swan Riv. App. 36 n. 182 (1839). (*A. intermedius*, Ostf.)
A. obovata, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 37 (1804).
A. cuneata, Labill. l. c. 28. t. 36.
A. Cunninghamii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 513 (1845).
A. pungens, Meissn. l. c. 515.

- A. venosa*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
A. Dobsoni, F.v.M. Fragm. vi. 204 (1868).
A. Forrestii, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 230 (1882).
A. linearis, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
A. sericea, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 33 (1804).
A. cygnorum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904).
A. Meissneri, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 512 (1845).
A. filifolia, Benth. Fl. Austr. v. 355 (1810).
A. flavidiflora, F.v.M. Fragm. i. 157 (1859).
A. argyrea, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904). (*A. intricata*, Gardner).
A. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 514 (1845).
A. apiculata, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).
6. *STIRLINGIA*, Endl. Gen. 339 (1838). (*Simsia*, R.Br. 1810.)
S. simplex, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
S. abrotonoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 517 (1845).
S. teretifolia, Meissn. in l. c. 515.
S. tenuifolia, (R.Br.) Steud. Nom. ed. II. ii. 644 (1821).
S. latifolia, (R.Br.) Steud. l. c. 644.
7. *SYNAPHAEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
S. polymorpha, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. reticulata, (Sm.) Gardner, n. comb. (*S. dilatata*, R.Br.)
S. favosa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 529 (1845).
S. acutiloba, Meissn. in l. c. 528.
S. petiolaris, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. decorticans, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
S. pinnata, Lindl. l. c. 32.
8. *CONOSPERMUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 213 (1798).
C. capitatum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. petiolare, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. teretifolium, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. flexuosum, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. acaeroseum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. amoenum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 522 (1845). (*C. Dorrientii*, Domin.)
C. Croniniae, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 143 (1904).
C. nervosum, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).
C. diffusum, Benth. Fl. Austr. v. 367 (1870).
C. glumaceum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. ephedroides, (Kipp) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).
C. Todii, F.v.M. Fragm. x. 20 (1876).
C. polyecephalum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 249 (1847).
C. leianthum, E. Pritzel, in Engler's Jahrb. xxxv. 141 (1904).
C. Etoniae, E. Pritzel, in l. c. 141
C. caeruleum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 154 (1810).
C. debile, (Kipp.) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).
C. scaposum, Benth. Fl. Austr. v. 369 (1870).
C. Huegelii, R.Br. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 58 (1839).
C. densiflorum, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
C. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 248 (1847).
C. distichum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. floribundum, Benth. Fl. Austr. v. 373 (1870).
C. incurvum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. brachyphyllum, Lindl. l. c. 31.
C. stoechadis, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. 208 (1838).
C. triplinervium, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. bracteosum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 518 (1845).
C. crassinervium, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 184 (1852).

II.—Grevilloideae.

9. *GREVILLEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 167 (1810).
G. pinaster, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).
G. obtusifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 187 (1852).

- G. sparsiflora*, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).
G. macrostylis, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).
G. tripartita, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. platypoda, F.v.M. Fragm. vi. 205 (1868).
G. patentiloba, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).
G. pectinata, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. plurijuga, F.v.M. Fragm. iv. 84 (1864).
G. oncogyne, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 149 (1904).
G. nudiflora, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. stenomera, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).
G. Thelemanniana, Hueg. in Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 6 (1839).

Hebegyne, Benth.

- G. concinna*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).
G. Pritzelii, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 150 (1904).
G. apiciloba, F.v.M. Fragm. x. 45 (1876).
G. Hookeriana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 546 (1845).
G. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 22 (1830).
G. eriobotrya, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).
G. pterosperma, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 22 (1854).
G. stenobotrya, F.v.M. Fragm. ix. 3 (1875).
G. eriostachya, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).
G. excelsior, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 151 (1904).
G. thyrsoides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 77 (1855).
G. chrysodendron, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).
G. cirsiifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. 253 (1847).
G. bipinnatifida, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. armigera, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. asparagoides, Meissn. l. c. 186.

Plagiopoda, Benth.

- G. Treueriana*, F.v.M. Fragm. ix. 123 (1875).
G. juncifolia, Hook. in Mitch. Trop. Austr. 341 (1848).
G. Wilsoni, A. Cunn in Wils. Voy. round the World, 273 (1835).
G. erectiloba, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).
G. asteriscosa, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 151 (1904).
G. insignis, Kippist, ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).
G. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 537 (1845).
G. crassifolia, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 10 (1923).
G. fasciculata, R.Br. Prodr. Suppl. 20 (1830).
G. aspera, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).
G. brachystylis, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 538 (1845).
G. saccata, Benth. Fl. Austr. v. 450 (1870).
G. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 536 (1845). (*G. pimelioides*
 W. V. Fitzg.)
G. deflexa F.v.M. in Melb. Chem. p. 72 (1883).
G. disjuncta, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).
G. Yorkrakinensis, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. ix. pt. i. 34 (1923).
G. haplantha, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 451 (1870).
G. extorris, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 221 (1898).
G. pinifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. acuaria, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 452 (1870).
G. Jamesoniana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1904).
G. aculeolata, S. Moore in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).
G. pauciflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 174 (1810).
G. cynanchicarpa, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).

Calothyrsus, Benth.

- G. quercifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. angulata, R.Br. l. c. 24.
G. Wickhami, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. agrifolia, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 24 (1830).
G. Victori, Morrison, in Journ. Bot. l. 276 (1912). (*G. miniata*, W. V.
 Fitzg.)
G. Cunninghamii, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. Huegelii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 543 (1845).
G. Sarissa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).
G. dimidiata, F.v.M. Fragm. iii. 146 (1863).

- G. heliosperma*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).
G. refracta, R.Br. l. c. 176.

Cycladenia, Benth.

- G. annulifera*, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).
G. leucoptera, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).

Cycloptera, Benth.

- G. pyramidalis*, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830). (*G. leucadendron*, A. Cunn.)
G. simulans, A. Morrison, in Journ. Bot. l. 277 (1812).
G. Berryana, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. xxii. 14 (1909).
G. erythroclada W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 132 (1918).
G. viscidula, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 44 (1923).
G. striata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 177 (1810).
G. mimosoides, R.Br. in l. c. 177.
G. latifolia, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 43 (1923).

Eriostylis.

- G. occidentalis*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 173 (1810).
G. acerosa, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).
G. umbellulata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 252 (1847).
G. pilulifera, (Lindl.) Gardner n. comb. (*G. oxy stigma*, Meissn.)
G. uncinulata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904). (*G. lycopodiina*, S. Moore.)
G. Candolleana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 541 (1845).
G. scabra, Meissn. in l. c. 541.

Lissostylis.

- G. commutata*, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).
G. stenophylla, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).
G. pinnatisecta, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 473 (1870).
G. argyrophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).
G. brachystachya, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).
G. Endlicheriana, Meissn. in l. c. i. 546 (1845).
G. Manglesioides, Meissn. in l. c. i. 547. (*G. Loboana*, Domin.)
G. diversifolia, Meissn. in l. c. i. 547.
G. filifolia, Meissn. in l. c. i. 547.
G. hakeoides, Meissn. in l. c. ii. 252 (1847).
G. inconspicua, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 153 (1904).
G. teretifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 255 (1847).
G. eryngioides, Benth. Fl. Austr. v. 476 (1870).
G. bracteosa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).
G. erithmifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
G. trachytheca, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).
G. brachyclada, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).

Conogyne.

- G. monticola*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 259 (1847).
G. Muelleri, Benth. Fl. Austr. v. 479 (1870).
G. trifida, (R.Br.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 553 (1845).
G. synapheae, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. flexuosa, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 533 (1845).
G. leptobotrya, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).
G. brevicuspis, Meissn. in l. c. ii. 256.
G. intricata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. didymobotrya, (Endl.) Meissn. in l. c. iv. 186 (1852).
G. polybotrya, Meissn. in l. c. iv. 185.
G. nematophylla, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).
G. Purdieana, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 154 (1904).

Anadenia.

- G. paradoxa*, F.v.M. Fragm. vi. 246 (1868).
G. petrophiloides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 257 (1847).
G. tenuiflora, (Lindl.) Meissn. in l. c. i. 554 (1845).
G. pulchella, (R.Br.) Meissn. in l. c. i. 553.
G. rudis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 73 (1855).
G. cordata, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. iv. pt. i. 35 (1923).
G. Shuttleworthiana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 258 (1847).
G. integrifolia, (Endl.) Meissn. in D. C. Prodr. xiv. 385 (1856).

- G. incrassata*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 156 (1904).
G. ceratocarpa, Diels in l. c. 157.
G. stenocarpa, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 485 (1870).

Manglesia.

- G. aerobotrya*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. glabrata, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 549 (1845).
G. ornithopoda, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).
G. paniculata, Meissn. in l. c. i. 550 (1845).
G. biternata, Meissn. in l. c. i. 549.
G. triloba, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. amplexans, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 488 (1870).
G. vestita, (Endl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 548 (1845).
G. tridentifera, (Endl.) Meissn. in l. c. i. 549.
G. phanerophlebia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 157 (1904).
G. erinacea, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
10. *HAKEA*, Schrader, Sert. Hannov. 27. t. 17 (1797).

Grevilleoides.

- H. chordophylla*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 23 (1857).
H. Cunninghamii, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).
H. suberea, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 223 (1898).
H. lorea, R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830).
H. macrocarpa, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).
H. arborescens, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).
H. Morrisoniana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 134 (1918).
H. stenophylla, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).

Euhakea.

- H. cyclocarpa*, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).
H. crassifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 570 (1845).
H. Brooksiana, F.v.M. in Austr. Journ. Pharm. i. 430 (1886).
H. pandanicarpa, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. Roei, Benth. Fl. Austr. v. 499 (1870).
H. adnata, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).
H. obliqua, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).
H. polyanthema, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 161 (1904).
H. Hookeriana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).
H. incrassata, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. flabellifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).
H. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 569 (1845).
H. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. ceratophylla, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. lasiantha, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. eriantha, R.Br. l. c. 29
H. megalosperma, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 177 (1855).
H. clavata, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 31. t. 41 (1804).
H. orthorrhyncha, F.v.M. Fragm. v. 214 (1868).
H. Candolleana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 262 (1847).
H. trifurecata, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).
H. erinacea, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 559 (1845).
H. platysperma, Hook. Ic. Plant. t. 433 (1842).
H. brachyptera, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).
H. Kippistiana, Meissn. in l. c. vii. 115 (1855).
H. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. amplexicaulis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. Pritzelli, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 163 (1904).
H. prostrata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810). (*H. glabella*, R.Br.)
H. auriculata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).
H. cristata, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. linearis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).
H. stenocarpoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 511 (1870).
H. ruscifolia, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 30. t. 39 (1804).
H. verrucosa, F.v.M. Fragm. v. 25 (1865).
H. rhombalis, F.v.M. l. c. x. 90 (1876).
H. purpurea, Hook. in Mitch. Trop. Austr. 348 (1848).
H. arida, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904).

- H. recurva*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 207 (1852).
H. circumalata, Meissn. in l. c. vii. 114 (1855).
H. commutata, F.v.M. Fragm. v. 26 (1865).
H. strumosa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).

Conogynoides.

- H. multilincata*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 261 (1847).
H. laurina, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830). (*H. eucalyptoides*, Meissn.)
H. obtusa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).
H. cinerea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 186 (1810).
H. corymbosa, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. undulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. petiolaris, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. neurophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).
H. loranthifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 574 (1845).
H. cucullata, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830). (*H. Victoriae*, Drumm.)
H. ferruginea, Sweet, Fl. Austr. t. 45 (1828).
H. smilacifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 567 (1845).
H. elliptica, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).
H. ambigua, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 260 (1847).
H. falcata, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. pycnoneura, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).
H. stenocarpa, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. marginata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. myrtoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. costata, Meissn. in l. c. 575.
H. oleifolia, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. florida, R.Br. in l. c. 183.
H. varia, R.Br. in l. c. 183.
H. dolichostyla, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 166 (1904).
H. sulcata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).
H. Meissneriana, Kippist ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 114 (1855).
H. subsulcata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 555 (1845).
H. Lehmanniana, Meissn. in l. c. i. 557.

Manglesioides.

- H. nitida*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. Oldfieldii, Benth. Fl. Austr. v. 530 (1870).
H. suaveolens, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 182 (1810).
H. lissoearpha, R.Br. in Prodr. Suppl. 27 (1830).
H. bipinnatifida, R.Br. l. c. 28.
11. *XYLOMELUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214 (1798).
X. occidentale, R.Br. Prodr. Suppl. 31 (1830).
X. angustifolium, Kippist in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).
12. *LAMBERTIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214. t. 20 (1798).
L. uniflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).
L. rariflora, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 263 (1847).
L. inermis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).
L. ericifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).
L. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
L. echinata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 189 (1810).
L. ilicifolia, Hook. Ic. Plant. t. 553 (1843).
13. *STENOCARPUS*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 201 (1810).
S. salignus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).
S. Cunninghamii, R. Br. Prodr. Suppl. 34 (1830).
14. *BANKSIA*, Linn. fil. Suppl. 15 et 126 (1781).
Oncostylis.
B. pulchella, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).
B. Meissneri, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 582 (1845).
B. nutans, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).
B. violacea, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 62 (1927).
B. sphaerocarpa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).
B. tricuspis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 118 (1855).
B. occidentalis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 204 (1810).
B. littoralis, R.Br. in l. c. 204.

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS

Auctore

CHARLES A. GARDNER.

PART II.

(Proteaceae - Papilionaceæ)

Published June 1930.

- B. verticillata, R.Br. in l. c. 207.
 B. dryandroides, Baxter in Sweet Hort. Brit. 350 (1827).
 B. Brownii, Baxter ex R.Br. Prodr. Suppl. 37 (1830).

Cyrtostylis.

- B. attenuata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 209 (1810).
 B. Elderiana, F.v.M. et Tate, Bot. Centralbl. Iv. 317 (1893).
 B. media, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).
 B. audax, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927)
 B. Solandri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. Goodii, R.Br. l. c. 36.
 B. petiolaris, F.v.M. Fragm. iv. 109 (1864).
 B. repens, Labill. Voy. i. 412. t. 23 (1798).
 B. prostrata, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. grandis, Willd. Sp. Pl. i. 535 (1797).
 B. quercifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).
 B. Baueri, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).

Eubanksia.

- B. dentata, Linn. fil. Suppl. 127 (1781).

Orthostylis.

- B. coccinea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 207 (1810).
 B. spectrum, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).
 B. Menziesii, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. laevigata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 B. Hookeriana, Meissn. in l. c. vii. 119 (1855).
 B. prionotes, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
 B. Victoriae, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 119 (1855).
 B. speciosa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).
 B. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. praemorsa, Andrews, in Bot. Rep. t. 258 (1802). (*B. marcescens*, R.Br.)
 B. Lemanniana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 B. Caleyi, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).
 B. Lindleyana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).
 B. elegans, Meissn. in l. c. 119.
 B. Candolleana, Meissn. in l. c. 118.

Isostylis.

- B. ilicifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211 (1810).

15. *DRYANDRA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211. t. 3 (1810).
 D. quercifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 D. praemorsa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 265 (1847).
 D. cuneata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).
 D. falcata, R.Br. in l. c. 213. (*D. Dorrienii*, Domin.)
 D. armata, R.Br. in l. c. 213.
 D. longifolia, R.Br. l. c. 215.
 D. Fraseri, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
 D. floribunda, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).
 D. carduacea, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
 D. carlinoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 267 (1847).
 D. polycephala, Benth. Fl. Austr. v. 570 (1870).
 D. Kippistiana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 122 (1855).
 D. squarrosa, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
 D. serra, R.Br. l. c. 38.
 D. concinna, R.Br. l. c. 38.
 D. foliolata, R.Br. l. c. 38.
 D. stuppeosa, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
 D. nobilis, Lindl. l. c. 33.
 D. mucronulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 213 (1810).
 D. formosa, R.Br. l. c. 213 t. 3.
 D. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
 D. nivea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
 D. aretotidis, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
 D. nana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).
 D. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 599 (1845).
 D. sclerophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 123 (1855).
 D. pulchella, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).

- D. plumosa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
D. seneciifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
D. erythrocephala, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927).
D. vestita, (Kippist) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).
D. cirsioides, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. Purdieana, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 174 (1904).
D. Gilbertii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 211 (1920).
D. Hewardiana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
D. patens, Benth. Fl. Austr. v. 578 (1870).
D. conferta, Benth. l. c. 578.
D. horrida, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 211 (1852).
D. serratuloides, Meissn. in l. c. vii. 123 (1855).
D. comosa, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. Shuttleworthiana, Meissn. l. c. vii. 122 (1855).
D. speciosa, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. tridentata, Meissn. in l. c. vii. 120 (1855).
D. tenuifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).
D. proteoides, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
D. runcinata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
D. obtusa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
D. bipinnatifida, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
D. pteridifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).
D. calophylla, R.Br. Prodr. Suppl. 40 (1830).

SANTALALES.

Santalaceae.

- ANTHOBOLUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 357 (1810).
A. foveolatus, F.v.M. Fragm. i. 212 (1859).
A. exocarpoides, F.v.M. Fragm. ix. 3 (1875).
- EXOCARPUS*, Labill. Voy. i. 155 t. 14 (1798).
E. latifolia, R.Br. Prodr. 356 (1810).
E. odorata (Miq.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 689 (1857).
E. cupressiformis, Labill. Voy. i. 155. t. 14 (1798).
E. spartea, R.Br. Prodr. 356 (1810).
E. aphylla, R.Br. Prodr. 357 (1810).
- CHORETNUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 354 (1810).
C. glomeratum, R.Br. Prodr. 354 (1810).
C. pendulum, Tovey et Morris, in Proc. Roy. Soc. Viet. n.s. xxxiv. 209 (1922).
C. Pritzellii, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 177 (1904).
C. lateriflorum, R.Br. Prodr. 354 (1810).
- LEPTOMERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 353 (1810).
L. spinosa, (Lehm.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 678 (1857).
L. pachyclada, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 178 (1904).
L. Preissiana, (Miq.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 678 (1857).
L. pauciflora, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. serobiculata, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. squarrulosa, R.Br. l. c. 354.
L. Rohlenae, Domin, Zolastni Olisk 2 Vestnika Kral. Spol. t. ii. 21 (1923).
L. Cunninghamii, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 611 (1845).
L. empetriformis, Miq. l. c. 610.
L. axillaris, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. laxa, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 612 (1845).
L. obovata, Miq. l. c. 613.
- SANTALUM*, Linn. Gen. ed. II. 165 (1742). (*Fusanus*, R.Br. p.p.;
Eucarya, (Mitch.) Sprague et Summerhayes, p.p.)
S. lanceolatum, R.Br. Prodr. 356 (1810).
S. Murrayanum, (L. T. Mitch.) Gardn. comb. nov. (*F. persicarius*, F.v.M.)
S. acuminatum, (R.Br.) D.C. Prodr. xiv. 684 (1856). (*F. acuminatus*, R.Br.)
S. spicatum, (R.Br.) D.C. l. c. 685. (*F. spicatus*, R.Br.)

Opiliaceae.

1. *OPILIA*, Roxb. Pl. Corom. ii. 31. t. 158 (1799).
O. amentacea, Roxb. Pl. Corom. ii. 31. t. 158 (1799).

Olacaceae.

1. *OLAX*, Linn. Diss. Dass. 3 (1747).
O. phyllanthi, (Labill.) R.Br. Prodr. 358 (1810).
O. Benthamiana, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 228 (1844).

Loranthaceae.

1. *NUYTSIA*, R.Br. in Journ. Geogr. Soc. i. 17 (1831).
N. floribunda, (Labill.) R.Br. in Journ. Geogr. Soc. i. 17 (1831).
2. *AMYEMA*, Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr., xli. 483, 488 (1894). (*Loranthus* p.p.)
A. gibberula, (Tate) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
L. gibberulus, Tate.
A. bifurcata, (Benth.) V. Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894).
(L. bifurcatus, Benth.)
A. ferruginiflora, (W. V. Fitzg.) Dans. Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
(L. ferruginiflorus, W. V. Fitzg.)
A. sanguinea, (F.v.M.) Danser, l. c. 298. (*L. sanguineus, F.v.M.*)
A. Miquelii, (Lehm.) V. Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894). (*L. Miqueli, Lehm.*)
A. Cyenei-Sinus, (Blakely) Dans. Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
(L. Cyeneus-Sinus, Blakely.)
A. miraculosa, (Miq.) Van Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 94 (1894).
(L. miraculosus, Miquel.)
A. Preissii, (Miq.) van Tiegh l. c. 84. (*L. Preissii, Miq.*)
A. linophylla, (Fenzl.) Van Tiegh l. c. 65. (*L. linophyllus, Fenzl.*)
A. Nestor, (S. Moore) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 297 (1929). (*L. Nestor, S. Moore.*)
A. Quandang, (Lindl.) Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894).
(L. Quandang, Lindl.)
A. Benthami, (Blakely) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 294 (1929).
(L. Benthami, Blakely.)
A. Fitzgeraldii, (Blakely) Dans. l. c. 295. (*L. Fitzgeraldii, Blakely.*)
A. acaeioides, (A. Cunn.) Danser, l. c. 293. (*L. acaeioides, (A. Cunn.) Benth.*)
3. *LYSIANA*, Van Tiegh. Bull. Soc. Bot. France, xli. 599 (1894). (*Loranthus*, Linn. p.p.)
L. Murrayi, (Tate) Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 603 (1894). (*L. Murrayi, F.M. et Tate.*)
L. linearifolia, (Hook.) Van Tiegh. l. c. 603. (*L. Mitchellianus, Blakely.*)
L. Casuarinae, (Miq.) Van Tiegh. l. c. 601. (*L. Casuarinae, Miq.*)
L. Exocarpi, (Behr.) Van Tiegh. l. c. 603. (*L. Exocarpi, Behr.*)
4. *AMYLOTHECA*, Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. France xli. 261 (1894). (*Loranthus*, p.p.)
A. triflora, (Span.) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 302 (1929). (*L. signatus, F.v.M.*)
A. amplexans, (Van Tiegh) Dans. in l. c. 300. (*L. amplexans, Van Tiegh.*)
A. biangulata, (W. V. Fitzg.) Danser. in l. c. 300. (*L. biangulatus, W. V. Fitzg.*)
5. *DIPLATIA*, Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. France, xli. 501 (1894). (*Loranthus*, p.p.)
D. Maidenii, (Blakely) Danser in Bull. Jard. Bot. Buit. x. 312 (1929).
(L. Maidenii, Blakely.)
D. grandibracteata, (F.v.M.) Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 502 (1894).
(L. grandibracteatus, F.v.M.)
6. *DENDROPHTHE*, Mart., Flora, 1830, I. 109 (1830). (*Loranthus*, Linn. p.p.)
D. curvata, (Blume) Miq. Fl. Ind. Bat. l. 1. 820 (1855). (*L. vitellinus, F.v.M.*)

7. *KORTHALSELLA*, Van Tiegh., in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 83 (1896).
 (*Viscum*, Linn. p.p.)
K. articulata, (Benth.) Blakely in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, liii. 33
 (1928). (*Viscum articulatum*, Benth.)

POLYGONALES.

Polygonaceae.

- **EMEX*, Necker, Elem. Bot. ii. 214 (1790).
 **E. australis*, Steinh. (Afr. Austr.) "Double Gee."
 1. *RUMEX*, Linn. Syst. ed. I. (1733).
 **R. pulcher*, Linn. (Europ. Asia.) "Fiddle Dock."
R. Brownii, Campd. Monogr. Rum. 81 (1819).
 **R. conglomeratus*, Murray. (Cosmop.) "Clustered Dock."
 **R. crispus*, Linn. (Reg. temp.) "Curled Dock."
 **R. Acetosella*, Linn. (Reg. temp.) "Sheep Sorrel."
 2. *POLYGONUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **P. aviculare*, Linn. (Cosmop.) "Wireweed," "Hogweed."
P. prostratum, R.Br. Prodr. 419 (1810).
P. serrulatum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14 (?).
P. attenuatum, R.Br. Prodr. 429 (1810).
 3. *MUEHLENBECKIA*, Meissn. Gen. 316, Comm. 227 (1843).
M. adpressa, (Labill.) Meissn. Gen. Comm. 227 (1843).
M. polybotrya, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 623 (1845).
M. Cunninghamii, (Meissn.) F.v.M. Fragm. v. 91 (1865).
M. dielina, (F.v.M.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 636 (1917).
 (*M. polygonoides*, F.v.M.)

CENTROSPERMAE.

Chenopodiaceae.

1. *RHAGODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 408 (1810).
R. baccata, (Labill.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 50 (1849).
R. parabolica, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. dioica, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 636 (1845).
R. Preissii, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 49 (1849).
R. Gaudichaudiana, Moq. Chenop. Enum. 11 (1840).
R. spinescens, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. obovata, Moq. Chenop. Enum. 10 (1840).
R. crassifolia, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. corallocarpa, S. Moore, in Journ. Bot. 168 (1897).
R. nutans, R.Br. Prodr. 408 (1810).
 2. *CHENOPODIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. nitrariaceum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 158 (1870).
 **C. ambrosioides*, Linn. (Cosmop.) "Ant weed."
C. rhadinostachyum, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 98 (1880).
C. simulans, F.v.M. et Tate, in Proc. Roy. Soc. S.A. viii. 71 (1885).
C. carinatum, R.Br. Prodr. 407 (1810).
C. cristatum, F.v.M. Fragm. vii. 11 (1869).
C. auricomum, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 94 (1848).
 **C. album*, Linn. (fere Cosmop.) "Mexican Spinach."
 **C. murale*, Linn. (fere Cosmop.) "Nettle-leaved Goosefoot."
C. glaucum, Linn. Sp. Pl. 220 (1753).
 5. *DYSPLANIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 411 (1810).
D. plantaginella, F.v.M. Fragm. i. 61 (1858).
D. littoralis, R.Br. Prodr. 412 (1810). (*D. myriocephala*, Benth.)
 4. *ATRIPLEX*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. stipitatum, Benth. Fl. Austr. v. 168 (1870).
A. Moquinianum, Webb, in D.C. Prodr. xiii. 97 (1849).

- A. Drummondii, Moq. in D.C. Prodr. xiii. 102 (1849).
 A. isatidium, Moq. Chemop. Enum. 63 (1840).
 A. nummularium, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 64 (1848).
 A. paludosum, R.Br. Prodr. 406 (1810).
 A. angulatum, Benth, Fl. Austr. v. 174 (1870).
 A. velutinellum, F.v.M. Rep. Babb. Exped. 20 (1858).
 A. vesicarium, (Heward) Benth. Fl. Austr. v. 172 (1870).
 A. hymenothecum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 101 (1849).
 A. cinereum, Poir, Encl. suppl. i. 471 (1810).
 A. rhagodioides, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. 74 (1857).
 A. quadrivalvatum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 182 (1904).
 A. patulum, Linn. Sp. Pl. 1053 (1735).
 A. semibaccatum, R.Br. Prodr. 406 (1810).
 A. prostratum, R.Br. l. c. 406.
 A. Muelleri, Benth, Fl. Austr. v. 175 (1870).
 A. elachophyllum, F.v.M. Fragm. vii. 8 (1870).
 A. halimoides, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 282 (1838).
 A. spongiosum, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Viet. ii. 74 (1857).
5. *BASSIA*, Allioni, Mel de Phil. Soc. Roy. Turin, iii. 177. t. 4 (1766).
 B. astrocarpa, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. Muelleri, (Benth.) F.v.M. l. c. 13.
 B. eurotioides, F.v.M. Fragm. xii. 13.
 B. densiflora, W. V. Fitzg. in Muell. Bot. Soc. Perth, 31 (1904).
 B. sclerolaenoides, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. ericantha, (F.v.M.) R. H. Anderson in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xlviii. 328 (1925).
 B. uniflora, (R.Br.) F.v.M. First Census (1882).
 B. recurviuspis, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. Perth 32 (1904).
 B. glabra, F.v.M. First Census (1882).
 B. divaricata, (R.Br.) F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882). (*B. hostilis*, Diels.)
 B. lanicuspis, F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882).
 B. Drummondii, (Benth.) F.v.M. Cens. of Austr. pl. 30 (1882).
 B. patentiuspis, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii. 338 (1923).
 B. obliquiuspis, R. H. Anderson, in l. c. 337.
 B. intricata, R. H. Anderson, in l. c. 340.
 B. Forrestiana, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. bicornis, (Lindl.) F.v.M. l. c. 13.
 B. Cornishiana, F.v.M. Aust. Chem. 1885.
 B. microcarpa, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii, 348 (1923).
 B. parviflora, R. H. Anderson, in l. c. 347.
 B. convexula, R. H. Anderson, in l. c. 346.
 B. costata, R. H. Anderson, in l. c. 347.
 B. paradoxa, (R.Br.) F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882).
 B. tridens, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
6. *MALACOCERA*, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. New South Wales, li. 382 (1926).
 M. tricornis, (Benth.) R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S.W. li. 382 (1926). (*Bassia tricornis*, F.v.M.)
7. *KOCHIA*, Roth, in Schrad. Journ. Bot. 1800, i. 307, t. 2 (1801).
 K. lobiflora, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 184 (1870).
 K. lanosa, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 88 (1848).
 K. prosthococheta, F.v.M. Fragm. xii. 14 (1882).
 K. Atkinsiana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 31 (1904).
 K. melanocoma, F.v.M. Fragm. xii. 14 (1882).
 K. polypterygia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 183 (1904).
 K. triptera, Benth. Fl. Austr. v. 185 (1870).
 K. Ostenfeldi, Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 60 (1918).
 K. oppositifolia, F.v.M. in Trans. Viet. Inst. i. 134 (1855).
 K. amoena, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 133 (1904).
 K. brevifolia, R.Br. Prodr. 409 (1810).
 K. pyramidata, Benth. Fl. Austr. v. 186 (1870).

- K. spongiocarpa, F.v.M. in Viet. Natl. iii. 92 (1886).
 K. Georgei, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 184 (1904).
 K. Stowardi, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 189 (1920).
 K. aphylla, R.Br. Prodr. 409 (1810).
 K. villosa, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 91 (1848).
 K. Murrayana, Ewart et Rees, in Proc. Roy. Soc. Vict. (n. s.) xxiii. 16 (1909).
 K. planifolia, F.v.M. Fragm. i. 213 (1859).
 K. sedifolia, F.v.M. in Trans. Viet. Inst. i. 134 (1855).
 K. glomerifolia, F.v.M. et Tate, in Trans. Roy. Soc. S.A. xvi. 345 (1896).
 K. Massoni, A. J. Ewart in Proc. Roy. Soc. Vict. (n. s.) xx. 82 (1907).
 K. carnososa, (Miq.) R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii. 353 (1923).
8. *ENCHYLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 407 (1810).
 E. micrantha, Benth. Fl. Austr. v. 181 (1870).
 E. tomentosa, R.Br. Prodr. 408 (1810).
 E. marginata, Benth. Fl. Austr. v. 182 (1870).
9. *DIDYMANTHUS*, Endl. Nov. Stirp. Dec. 7 (1839).
 D. Roei, Endl. Nov. Stirp. Dec. 8 (1839).
10. *THRELKELDIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 409 (1810).
 T. diffusa, R.Br. Prodr. 410 (1810).
 T. drupata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 187 (1904).
 T. haloragoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 198 (1870).
11. *ARTHROCNUM*, Moq. Chenop. Enum. 111 (1841) partim.
 A. arbusculum, (R.Br.) Moq. Chenop. Enum. 113 (1841).
 A. Donaldsoni, Ewart et White, in Journ. Roy. Soc. N.S.W. xlii. 194 (1909).
 A. leiostachyum, (Benth.) Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 61 (1918).
 A. Benthami, Paulsen, in l. c. 62.
 A. bidens, Nees ab Essenbach in Lehm. Pl. Preiss. i. 633 (1845).
 A. halocnemoides, Nees l. c. 632.
 A. pruinatum, Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 63 (1918).
 A. brachystachyum, Paulsen, in l. c. 64.
 A. Lylei, (Ewart) J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xliii. 359 (1919).
12. *PACHYCORNIA*, Hook. fil. in Benth. et Hook. f. Gen. Plant. iii. 65 (1880).
 P. triandra, (F.v.M.) Black, Fl. S. Austr. 206 (1924).
13. *SALICORNIA*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 357 (1737).
 S. australis, Banks et Soland. in Forst. Fl. Insul. Austr. Prodr. 88 (1786).
14. *SUAEDA*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 69 t. 1813 (1775).
 S. australis, (R.Br.) Moq. in Ann. Se. Nat. ser. I. xxiii. 318 (1831)
 (*S. maritima*, R.Br.)
15. *SALSOLA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 S. Kali, Linn. Sp. Pl. 222 (1753).

Amarantaceae.

1. *HEMICHROA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 409 (1810).
 H. pentandra, R.Br. Prodr. 409 (1810).
 H. diandra, R.Br. l. c. 409.
2. *AMARANTUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **A. retroflexus*, Linn. (Amer. bor.)
 **A. patulus*, Bertoli. (Amer. bor.)
 A. pallidiflorus, F.v.M. Fragm. i. 140 (1859).
 A. viridis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1405 (1753).
3. *TRICHINIUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 414 (1810).
 i. *Astrotricha*.
 T. obovatum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
 T. Elderi, Farmar, in Bull. Herb. Boiss, ser. II. v. 1088 (1905).
 T. incanum, R.Br. Prodr. 415 (1810).

- T. Roci, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 240 (1870). (*T. Sewelliae*, F.v.M.)
 T. astrolasium, (F.v.M.) Benth. l. c. 222.
- ii. *Straminea*.
 T. distans, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. longistachyum, (W. V. Fitzg.) Gardn. comb. nov. (*Ptilotus longistachyus*, W.V.F.)
 T. alopecuroideum, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 13 (1839).
 T. polystachyum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
 T. macrocephalum, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. Clementi, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1087 (1905).
 T. rotundifolium, F.v.M. Fragm. iii. 122 (1863).
 T. corymbosum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 444 (1826).
 T. eremita, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 218 (1898).
- iii. *Rhodostachya*, Benth.
 T. parvifolium, F.v.M. Rep. Babb. Exped. 19 (1858).
 T. Polakii, (F.v.M.) Diels et Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 191 (1904).
 T. exaltatum, (Nees) Benth. Fl. Austr. v. 227 (1870).
 T. Manglesii, Lindl. Bot. Reg. t. 28 (1839).
 T. gomphrenoides, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 287 (1849).
 T. esquamatum, Benth. Fl. Austr. v. 229 (1870).
- iv. *Incurva*, Benth.
 T. declinatum, (Nees) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 293 (1849).
- v. *Polycephala*, Benth.
 T. divaricatum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
 T. helipteroides, F.v.M. Fragm. iii. 122 (1863).
 T. Stirlingii, Lindl. Bot. Reg. t. 28 (1839).
 T. laxum, Benth. Fl. Austr. v. 232 (1870).
 T. depressum, (W. V. Fitzg.) Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1088 (1905).
 T. axillare, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 232 (1870).
 T. striatum, (Moq.) Benth. l. c. 233.
 T. auriculifolium, (A. Cunn.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 287 (1849).
 (*T. siphonandrum*, Diels.)
 T. sericostachyum, Nees in Lehm. Pl. Preiss, i. 627 (1845).
 T. roseum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 284 (1849).
 T. fusiforme, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. gracile, R.Br. l. c. 415.
- vi. *Squamigera*.
 T. Dummondii, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 292 (1849).
 T. procerum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 191 (1904).
 T. calostachyum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 236 (1870).
 T. Carlsonsii, F.v.M. in Vict. Nat. v. 74 (1888).
 T. Fraseri, (A. Cunn.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 295 (1849).
- vii. *Spathulata*.
 T. spathulatum, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. pyramidatum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 288 (1849).
 T. holsericeum, Moq. in l. c. 287.
- viii. *Parviflora*.
 T. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. v. 238 (1870). (*P. lanatus* (A. Cunn.) Moq.)
 T. villosum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 628 (1845).
 T. brachyanthum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 239 (1870).
 T. arthrolasium, (F.v.M.) Benth. l. c. 239.
 T. Forrestii, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*Ptilotus Forrestii*, F.v.M.)
 T. aervoides, F.v.M. Fragm. iii. 123 (1863).
 T. caespitulosum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 240 (1870).
- ix. *Helichrysoidea*.
 T. helichrysoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 241 (1870).
4. *PTILOTUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 415 (1810).
 P. capitatus, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*P. psilotrichoides*, F.v.M.)
 P. corymbosus, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 P. grandiflorus, F.v.M. Fragm. i. 237 (1859).
 P. Johnstonianus, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 138 (1918).

- P. spicatus*, (F.v.M.) Benth Fl. Austr. v. 243 (1870).
P. petiolatus, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1089 (1905).
P. Murrayi, (F.v.M.) Fragm. iii. 145 (1863).
P. decipiens, (Benth.) Gardn. comb. nov. (*P. Hoodii*, F.v.M.)
P. roseo-albus, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1090 (1905).
P. gomphrenoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 244 (1870).
P. latifolius, R.Br. in App. Sturt's Exped. ii. 88 (1849).
P. chamaecladus, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 193 (1904).
P. villosiflorus, F.v.M. Fragm. iii. 125 (1863). (*P. macrotrichus*, F.v.M.)
(*Alternanthera polycephalus*, Benth.)
P. humilis, (Nees) F.v.M. Fragm. vi. 229 (1868).
5. *DIPTERANTHEMUM*, F.v.M. in Wing's Southern Science Record, iii. 281 (1884).
D. Crosslandi, F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. iii. 281 (1884).
 6. *ACHYRANTHES*, Linn. Gen. ed. I. 34 (1737).
A. aspera, Linn. Sp. Pl. 204 (1753).
 7. *ALTERNANTHERA*, Forsk. Fl. Ægypt-Arab. 28 (1775).
A. triandra, Lamarek, Encycl. Meth. i. 95 (1783). (*A. nodiflora*, R.Br.)
A. nana, R.Br. Prodr. 417 (1810).
A. leptophylla, Benth. Fl. Austr. v. 251 (1870).
A. longipes, (Moq.) Benth. l. c. 252.
 8. *GOMPHRENA*, Linn. Gen. ed. I. 69 (1737).
G. canescens, R.Br. Prodr. 416 (1810).
G. flaccida, R.Br. l. c. 416.
G. affinis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 254 (1870).
G. platandra, F.v.M. in Trans. Roy. Soc. Vict. xxiii. 52 (1886).
G. brachystylis, F.v.M. Fragm. iii. 124 (1862).
G. alba, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1090 (1905).
G. leptoclada, Benth. Fl. Austr. v. 255 (1870).
G. Cunninghamii, (Moq.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 625 (1917). (*G. Maillandi*, F.v.M.)
G. tenella, (Moq.) Benth. Fl. Austr. v. 256 (1870).
G. conica, (R.Br.) Spreng. Syst. i. 824 (1825).
G. conferta, (Moq.) Benth. Fl. Austr. v. 257 (1870).
G. sordida, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1091 (1905).
G. parviflora, Benth. Fl. Austr. v. 257 (1870).

Nyctaginaceae.

1. *BOERHAAVIA*, (Vaill.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
B. diffusa, Linn. Fl. Zeyl. 4 (1747).
B. repandra, Willd. Sp. Pl. i. 22 (1816).

Phytolaccaceae.

- **PHYTOLACCA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **P. octandra*, Linn. (Japon.)
1. *DIDYMOTHECA*, Hook. fil. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. 278 (1747).
D. thesioides, Hook. fil. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. 279 (1847).
 2. *GYROSTEMON*, Desf. in Mem. Mus. Par. vi. 16. t. 6 (1820).
G. subnudus, (Nees) Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 195 (1904).
(*G. brachystigma*, F.v.M.)
G. Sheathii, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. no. ii. 81 (1903).
G. australasicus, (Moq.) Hiermerl. in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenfam. iii. 1B. 12 (1889). (*G. cyclothecca*, Benth.)
G. ramulosus, Desf. in Mem. Mus. Par. vi. 17. t. 6 (1820).
G. Brownii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 190 (1920).
 3. *CODONOCARPUS*, A. Cunn. ex Hook. in Hook. Bot. Misc. i. 244 (1830).
C. cotinifolius, (Desf.) F.v.M. Pl. Viet. i. 200 (1862).

4. *TERSONIA*, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 40 (1849).
T. brevipes, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 40 (1849).
T. subvolubilis, Benth, Fl. Austr. v. 150 (1870).

Aizoaceae.

1. *MOLLUGO*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 336 (1737).
M. molluginis, (F.v.M.) Druce, Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916. 636 (1917). (*M. trigastrotheca*, F.v.M.)
M. cerviana, Ser. in D.C. Prodr. i. 392 (1824).
M. hirta, Thunb. Prodr. Fl. Cap. i. 24 (1794). (*M. glinus*, A. Rich.)
 (*Glinus lotoides*, Loef.)
M. Spergula, Linn. Sp. Pl. ed. alt. 131 (1762). (*Glinus Spergula* (L.) Pax.)
2. *MACARTHURIA*, Hueg. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 11 (1837).
M. apetala, Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 55 (1855).
M. australis, Hueg. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 11 (1837).
3. *SESUVIUM*, Linn. Syst. ed. X. 1058 (1759).
S. portulacastrum, Linn. Syst. ed. X. 1058 (1759).
4. *TRIANTHEMA*, (Sauv.) Linn. Sp. Pl. ed. I. 223 (1753).
T. decandra, Linn. Mant. i. 70 (1771).
T. crystallina, Vahl. Symb. Bot. i. 32 (1790). (*T. glaucifolia*, F.v.M.)
T. pilosa, F.v.M. Fragm. i. 174 (1859).
T. oxycalyptra, F.v.M. l. c. 173.
T. turgidifolia, F.v.M. l. c. x. 83 (1786).
T. glossostigma F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. iii. 282 (1864).
5. *GUNNIA*, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 9 (1858).
G. Drummondii, Benth, Fl. Austr. iii. 327 (1866).
6. *GUNNIOPSIS*, Pax. in Engler et Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iii. IB. 44 (1889). (*Aizoon*, Linn. p.p.)
G. intermedia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 197 (1904).
G. quadriifida, (F.v.M.) Pax. in Engl. et Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iii. Ib. 44 (1889).
G. Rodwayi, (A. J. Ewart) Gardn. comb. nov. (*Aizoon Rodwayi*, Ewart).
G. zygophylloides, (F.v.M.) Maiden et Beteche, Cens. N.S. Wales Pl. 74 (1916).
G. glabra, (Ewart) Gardn. comb. nov. (*Aizoon glabrum*, Ewart).
7. *TETRAGONIA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
T. expansa, Murr. in Com. Gotting. vi. 13 (1783).
T. eremaca, Ostf. in Dansk. Vidensk. Selsk. Biol. Meddel. iii. 2. 59 (1921).
T. diptera, F.v.M. Fragm. xi. 8 (1878).
T. implexicoma, (Miq.) Hook. fil. Fl. Tasm. i. 148 (1859).
8. *MESEMBRYANTHEMUM*, (Breyne) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **M. crystallinum*, Linn. (Graecia; Ins. Canar.; Afr. austr.; Calif.)
M. aequilaterale, Haw. Misc. Nat. 77 (1803).
M. australe, Soland, ex Forst. Prodr. 90 (1786).
 **M. tumidulum*, Haw. (Afr. austr.)

Portulacaceae.

1. *CALANDRINIA*, H.B. et K. Nov. Gen. et. Sp. vi. 77 t. 526 (1823).
C. spergularina, F.v.M. Fragm. i. 175 (1859).
C. ptychosperma, F.v.M. l. c. iv. 137 (1864).
C. strophiolata, F.v.M. l. c. xi. 82 (1880).
C. Lehmanni, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 235 (1847).
C. schistorrhiza, A. Morrison, in Journ. Bot. l. 164 (1912).
C. primuliflora, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 198 (1904).
C. uniflora, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Viet. iii. 41 (1859).
C. Tepperiana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy Soc. W.A. iii. 141 (1918).
C. balonensis, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 148 (1848).
C. polyandra, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 172 (1863).
C. quadrivalvis, F.v.M. Fragm. i. 176 (1859).
C. liniflora, Fenzl. in Enum. Pl. Hueg. 59 (1837).

- C. polypetala*, Fenzl. in l. c. 51.
C. volubilis, Benth. Fl. Austr. i. 174 (1863).
C. Maryonii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 164 (1920).
C. calyptrata, Hook. fil. in Icones Pl. t. 296 (1840).
C. cygnorum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 199 (1904).
C. pumila, F.v.M. Fragm. x. 68 (1876).
C. composita, Benth. Fl. Austr. i. 175 (1863).
C. corrigioloides, (F.v.M.) Benth. l. c. 175.
C. brevipedata, F.v.M. Fragm. x. 69 (1876).
C. granulifera, Benth. Fl. Austr. i. 176 (1863).
C. pygmaea, F.v.M. Fragm. i. 175 (1859).
C. Creethae, Tratman ex Morrison in Journ. Bot. i. 165 (1912).
2. *CLAYTONIA*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 339 (1737).
C. australasica, Hook. fil. Icones Pl. t. 293 (1840).
 3. *PORTULACA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
P. oleracea, Linn. Sp. Pl. 445 (1753).
P. napiformis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 169 (1863).
P. australis, Endl. Atakta. 7 t. 6 (1833).
P. tuberosa, Roxb. Hort. Beng. (91) Fl. Ind. ii. 464 (?).
P. digyna, F.v.M. Fragm. i. 170 (1859).
P. oligosperma, F.v.M. l. c. 170.
P. bicolor, F.v.M. l. c. 171.

Caryophyllaceae.

- **SILENE*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **S. gallica*, Linn. (Oriens.)
 **S. nocturna*, Linn. (Reg. Mediterr.)
 **S. vulgaris*, (Moench.) Garcke. (Europ.; Afr. bor.; Reg. Himal.)
 **TUNICA*, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 381 (1742).
 **T. prolifera*, Scop. (Europ.; Reg. Cauc.)
 **SAPONARIA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **S. Vaccaria*, Linn. (Europ.; As. Min.; Sibir.)
1. *STELLARIA*, Linn. Syst. Nat. ed. vi. (1748).
S. media, Cyrill. (Geront. temp.)
S. multiflora, Hook. in Comp. Bot. Mag. i. 275 (1835).
 **CERASTIUM*, Linn. Syst. Nat. ed. i. (1735).
 **C. glomeratum*, Thuill. (Reg. temp. et subtrop.)
 2. *SAGINA*, Linn. Syst. Nat. 8 (1735).
S. apetala, Arduino, Animad. Bot. Sp. alt. 22 (1764).
 **SPERGULA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **S. arvensis*, Linn. (Europ.)
 5. *DRYMARIA*, Willd. in Roem. et Schultz. Syst. v. 406 (1819).
D. filiformis, Benth. Fl. Austr. i. 162 (1863).
 4. *POLYCARPON*, Loef. Inter. Hisp. 7 (1758).
P. tetraphyllum, Loef. in Linn. Syst. ed. x. 881 (1759).
P. alsinaefolium, D.C. Prodr. iii. 376 (1828).
 5. *POLYCARPAEA*, Lamk. Journ. d'Hist. Nat. Par. ii. 8. t. 25 (1792).
P. longiflora, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 8 (1858).
P. synandra, F.v.M. in l. c. 8.
P. violacea, (Mart.) Benth. Fl. Austr. i. 165 (1863).
P. Holtzei, Maiden et Bêche, in Ewart et Davies, Fl. N. Terr. 109 (1917).
P. staminodina, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 8 (1858).
P. breviflora, F.v.M. in l. c. 9.
P. spicata, Wight et Arn. in Ann. Nat. Hist, ser. I. iii. 91 (1839).
P. involuerata, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 9 (1858).

RANALES.

Nymphaceae.

1. *NYMPHAEA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
N. stellata, Willd. Sp. Pl. ii. 1153 (1799). (*N. gigantea*, Hook.)

Ranunculaceae.

1. *CLEMATIS*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 163 (1737).
C. pubescens, Hueg. Enum. Pl. i. (1837).
C. microphylla, D.C. Prodr. i. 147 (1818).
2. *RANUNCULUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
R. lappaeus, Sm. in Rees Cyclop. xxix. n. 61 (1815).
R. hirtus, Banks et Soland in G. Forst. Fl. Ins. Austr. Prodr. 90 (1786).
(*R. plebeius*, R.Br.)
R. parviflorus, Linn. Sp. Pl. ed. ii. 780 (1762).
**R. muricatus*, Linn. (Europ.; Oriens.)

Menispermaceae.

1. *TINOSPORA*, Miers, in Ann. Nat. Hist. ser. II. vii. 38 (1851).
T. smilacina, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. 52 (1861).
T. Walcottii (F.v.M.) Benth, Fl. Austr. i. 56 (1863).

Myristicaceae.

1. *MYRISTICA*, Linn. Gen. Ed. II. 524 (1742).
M. insipida, R.Br. Prodr. 400 (1810).

Lauraceae.

1. *CRYPTOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 402 (1810).
C. glaucescens, R.Br. Prodr. 402 (1810).
2. *CASSYTHA*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 35 (1753).
C. nodiflora, Meissn. in D.C. Prodr. xv. i. 252 (1864).
C. glabella, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. flava, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 620 (1845).
C. pubescens, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. strigosa, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 143 (1918).
C. filiformis, Linn. Sp. Pl. 35 (1753).
C. melantha, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. micrantha, Meissn. in D.C. Prodr. xv. i. 256 (1864).
C. coronata, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 620 (1845).
C. racemosa, Nees in l. c. 621.
C. pomiformis, Nees in l. c. 620.

Hernandiaceae.

1. *GYEOCARPUS*, Jacq. Select. Ann. 282. t. 178 (1763).
G. americanus, Jacq. Select. Ann. 282. t. 178 (1763).

RHOEADALES.

Papaveraceae.

- **PAPAVER*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. hybridum*, Linn. (Europ.; Syria; Afr. bor.)
**P. aculeatum*, Thunb. (Afr. austr. Austr.)
**ARGEMONE*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. mexicana*, Linn. (Amer. bor.; Mexic.)

Fumariaceae.

- **FUMARIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**F. capreolata*, Linn. (Europ.; Afr. bor.)
**F. muralis*, Sond. (Europ.)

Capparidaceae.

1. *CLEOME*, Linn. Syst. Nat. 9 (1735).
C. oxalidea, F.v.M. Fragm. i. 69 (1858).
C. tetrandra, Banks, in D.C. Prodr. i. 240 (1824).
C. viscosa, Linn. Sp. Pl. 672 (1753). (*Polanisia viscosa* (Linn.) D.C.)
2. *ROEPERIA*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 15 (1857).
R. cleomoides, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 15 (1857). (*Gynandropsis Muelleri*, Benth.)

3. *CAPPARIS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. umbellata, R.Br. in D.C. Prodr. i. 247 (1824).
C. lasiantha, R.Br. in l. c. 247.
C. nummularia, R.Br. in l. c. 246.
C. spinosa, Linn. Sp. Pl. 503 (1753).
C. lucida, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 96 (1863).
C. umbonata, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 257 (1848).
4. *EMBLINGIA*, F.v.M. Fragm. ii. 2 (1860).
E. calceoliflora, F.v.M. Fragm. ii. 2. t. 11 (1860).

Cruciferae.

A. THELYPODIEAE.

a. Heliophilinae.

- **HELIOPHILA*, (Burm. fil) Linn. Sp. Pl. ed. II. 926 (1763).
- **H. pusilla*, Linn. (Afr. aust.)

B. SINAPEAE.

a. Lepidiinae.

1. *LEPIDIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
L. Merrallii, F.v.M. in Viet. Nat. vii. 114 (1890).
L. linifolium, (Desv.) Benth. Fl. Austr. i. 84 (1863).
L. leptopetalum, F.v.M. Pl. Viet. i. 48 (1860).
L. rotundum, D.C. Syst. Veg. ii. 537 (1818).
L. papillosum, F.v.M. in Linnaca, xxv. 370 (1852).
L. oxytrichum, Sprague, in Kew Bull. Misc. 123 (1915).
L. foliosum, Desv. in Journ. Bot. iii. 164. d. 180 (1813).
L. ambiguum, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. 34 (1855).
L. pseudo-ruderales, Thell. in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Nat. Zurich, xli. i. 303 (1906). (*L. ruderales*, Linn. p.p.)

**L. Draba*, Linn. (Europ.; Oriens.)

**CORONOPUS*, (Rupp.) Gaertn. Fruct. ii. 293 (1791).

**C. didymus*, (Linn.) Sm. (Cosmop.)

b. Sisymbriinae.

- **SISYMBRIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 - **S. officinale*, Linn. (Europ.; Afr. bor.)
 - **S. erysimoides*, Desv. (Reg. Meditter.; Afr. trop.; Arab.)
 - **S. orientale*, Linn. (Europ.; Oriens.; Reg. Himal.)
2. *BLENNODIA*, R.Br. in Sturt. Exped. ii. App. 67 (1849). (*Sisymbrium* (T) Linn. p.p.) (*Erysimum*, F.v.M. p.p.)
B. trisecta, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 74 (1863).
B. Richardsii, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*Sisymbrium Richardsii*, F.v.M.)
B. Drummondii, (Turez.) Gardn. comb. nov. (*Sisymbrium brachypodum*, F.v.M.)
B. cardaminoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 75 (1863).
 3. *GEOCOCCUS*, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 52 (1855).
G. pusillus, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 52 (1855).
 4. *CAKILE*, (Tourn.) Miller, Gard. Diet. Abridg. Ed. IV. (1754).
C. maritima, Scop. Flor. Carn. ed. ii. 35 (1760).

c. Brassicinae.

5. *DIPLOTAXIS*, D.C. Syst. ii. 628 (1821).
D. tenuifolia, (Linn.) D.C. Syst. Veg. ii. 632 (1821).
**D. muralis*, (Linn.) D.C. (Europ.)
- **BRASSICA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735). (*Sinapis*, Linn.)
 - **B. Tournefortii*, Gouan. (Reg. Meditter.; Oriens.; Ind. or.)
 - **B. nigra*, Koch. (Cosmop.)
 - **B. sinapistrum*, Boiss. (Europ.) (*Sinapis arvensis*, Linn.)
 - **B. campestris*, Linn. (Cosmop.)
 - **RAPHANUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 - **R. raphanistrum*, Linn. (Europ.)

d. Cardamininae.

6. *NASTURTIUM*, (Linn.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 110 (1812).
N. officinale, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 111 (1812).

7. *CARDAMINE*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. dictyosperma, Hook. Journ. Bot. i. 246 (1834).
C. hirsuta, Linn. Sp. Pl. 655 (1753).
C. eustylis, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. i. 114 (1854).

C. SCHIZOPETALEAE.

a. Schizopetalinae.

8. *STENOPETALUM*, R.Br. in D.C. Syst. Veg. ii. 513 (1821).
S. velutinum, F.v.M. Pl. Vict. i. 49 (1860).
S. lineare, R.Br. in D.C. Syst. Veg. ii. 513 (1821).
S. filifolium, Benth. Fl. Austr. i. 78 (1863).
S. sphaerocarpum, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 35 (1854).
S. nutans, F.v.M. Fragm. iii. 27 (1862).
S. robustum, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 4 (1837).
S. pedicellare, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 79 (1863).
S. croceum, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss, i. 258 (1845).
9. *MENKEA*, Lehm. in Sem. Hort. Hamb. 8 (1843).
M. australis, Lehm. in Sem. Hort. Hamb. 8 (1843).
M. Coolgardiensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 161 (1897).
M. draboides, (Hook. fil.) Benth. Fl. Austr. i. 80 (1863).
M. sphaerocarpa, F.v.M. Fragm. viii. 223 (1874).

D. HESPERIDEAE.

a. Capsellinae.

10. *HUTCHINSIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 82 (1812).
H. procumbens, (Linn.) Desv. in Journ. Bot. iii. 168 (1814).
H. Drummondii, (Benth.) J. M. Black, Fl. S. Austr. 254 (1924).
11. *CAPSELLA*, Medicus, Pflanzen. Gattungen 85 (1792).
C. pilosula, F.v.M. Pl. Vict. i. 44 (1860).
**C. bursa-pastoris*, (Linn.) Medic. (Reg. temp.)

b. Alyssinae.

12. *ALYSSUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. minimum, Pallas, Reise Pror. Russ. Reich. iii. 746 (1776). (*A. lini-folium*, Steph.)

Resedaceae.

- *RESEDA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**R. luteola*, Linn. (Europ.; Oriens.)
**R. alba*, Linn. (Europ.; Oriens.)

Droseraceae.

1. *ALDROVANDRA*, (Monti) Linn. Nov. Pl. Gen. 39 (1751).
A. vesiculosa, Linn. Sp. Pl. ed. I 281 (1753).
2. *DROSERA*, Linn. Gen. ed. I. 253 (1737).
 Subgen. I. *Rorella*, D.C.
 Sect. i. *Lamprolepis*, Planch.
D. paleacea, D.C. Prodr. i. 318 (1824).
D. parvula, Planch. in Ann. sc. nat. 3 ser. ix. 287 (1848).
D. pycnoblata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 207 (1904).
D. androsacea, Diels, in l. c. 205.
D. pulchella, Lehmann, Pugill. viii. 38 (1844).
D. leucoblata, Benth. Fl. Austr. ii. 458 (1864).
D. miniata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 206. t. 25A-D (1904).
D. dichrosepala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. 2, 343 (1854).
D. scorpioides, Planch, in Ann. sc. nat. 3 ser. ix. 288 (1848).
D. Drummondii, Lehm. Pl. Preiss. ii. 235 (1847).
D. platystigma, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
D. Sewelliae, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 206. t. 25 (1904).
D. nitidula, Planch. in Ann. sc. nat. 3 ser. ix. 285 (1848).
D. omissa, Diels, in Engler's Pflanzenreich Droseraceae iv. 112, 73 (1906).

- Sect. ii. *Thlocalyx*, Planch.
 D. Burmanni, Vahl. Symbol. iii. 50 (1794).
- Sect. iii. *Coelophylla*, Planch.
 D. glanduligera, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
 D. occidentalis, A. Morrison, in Journ. Bot. 1. 166 (1912).
- Sect. iv. *Avachnopus*, Planch.
 D. indica, Linn. Sp. Pl. ed. 1. 282 (1753).
- Sect. v. *Rosolis*, Planch.
 D. petiolaris, R.Br. in D.C. Prodr. i. 318 (1824).
- Sect. vi. *Stelogyne*, Diels.
 D. Hamiltonii, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. West. Austr. Perth 81 (1903).
- Subgen. II. *Ergaleium*, D.C.
- Sect. vii. *Polypettes*, Diels.
 D. Banksii, R.Br. ex D.C. Prodr. i. 319 (1824).
 D. peltata, Sm. in Willd. Spec. pl. i. 1546 (1797).
 D. Andersoniana, (W.V.F.) Ewart et White in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxii. 93 (1909).
 D. modesta, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 209 (1904).
 D. sulphurea, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
 D. Neesii, Lehm. l. c. 42.
 D. gigantea, Lindl. Swan Riv. App. xx. n. 88 (1839).
 D. myriantha, Planch. in Ann. sc. nat. 3. ser. ix. 291 (1848).
 D. bulbigena, Morrison, in Trans. et Proc. Bot. Soc. Edinburgh xxii. 417 (1903).
 D. pallida, Lindl. Swan Riv. App. xx. n. 87 (1839).
 D. Menziesii, R.Br. in D.C. Prodr. i. 319 (1824). (*D. penicillaris*, Benth.)
 D. macrantha, Endl. Enum. pl. Hueg. 6 (1837).
 D. stricticaulis, (Diels) O. H. Sargent in Journ. Bot. li. 40 (1913).
 D. subhirtella, Planch. in Ann. sc. nat. 3. ser. ix. 292 (1848).
 D. microphylla, Endl. Enum. pl. Hueg. 6 (1837).
 D. thysanosepala, Diels, in Engler's Pflanzenreich Droseraceae iv. 112, 121 (1906).
 D. Huegelii, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 6 (1837).
 D. heterophylla, Lindl. Swan Riv. App. 89 (1839).
- Sect. viii. *Erythrorrhiza*, Planch.
 D. erythrorrhiza, Lindl. Swan Riv. App. xx. 91 (1839).
 D. squamosa, Benth. Fl. Austr. ii. 463 (1864).
 D. macrophylla, Lindl. Swan Riv. App. xx. 91 (1839).
 D. rosulata, Lehm. Pugill. viii. 36 (1844).
 D. bulbosa, Hook. in Leon. pl. t. 375 (1841).
 D. stolonifera, Endl. Enum. pl. Hueg. 5 (1837).
 D. platypoda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvii. 2. 343 (1854).
 D. ramellosa, Lehm. Pugill. viii. 40 (1844).

ROSALES.

Crassulaceae.

- CRASSULA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 C. Miriamae, Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 42 (1918).
 C. intricata, (Nees) Ostf. l. c. 46. (*Tillaea intricata*, Nees.)
 C. colorata, (Nees) Ostf. l. c. 45. (*T. verticillata*, Benth.)
 C. natans, Thunb. Fl. Cap. 54 (1794).
 C. recurva, (Hook. f.) Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 40. (*T. recurva*, Hook. f.)
 C. bonariensis, D.C.) Cambess in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii.
 C. macrantha, (Hook. f.) Diels et Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 210 (1904).
 C. pedicellosa, (F.v.M.) Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 42 (1918).

Cephalotaceae.

- CEPHALOTUS*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 6. t. 145 (1806).
 C. follicularis, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 7. t. 145 (1806).

Saxifragaceae.

1. *EREMOSYNE*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 53 (1837).
E. pectinata, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 53 (1837).

Pittosporaceae.

1. *PITTIOSPORUM*, Banks, in Gaertn. Fruct. i. 286 (1788).
P. melanospermum, F.v.M. Fragm. i. 70 (1858).
P. phillyræoides, D.C. Prodr. i. 347 (1824).
2. *MARIANTHUS*, Hueg. in Enum. Pl. Hueg. 8 (1837).
M. procumbens, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 117 (1863).
M. microphyllus, (Turez.) Benth. l. c. 117.
M. villosus, (Turez.) Benth. l. c. 117.
M. granulatus, (Turez.) Benth. l. c. 118.
M. parviflorus, F.v.M. Fragm. ii. 144 (1861).
M. Drummondianus, (Putterl.) Benth. Fl. Austr. i. 119 (1863).
M. tenuis, Benth. Fl. Austr. i. 119 (1863). (*Billardiera parviflora*, D.C.)
M. coeruleo-punctatus, Klotzsch in Link. Kl. et Otto Ic. Pl. 28. t. 12 (1841).
M. gracilis, Ostf. in Det. Kgl. Dans. Videns. Selk. iii. 2. 67 (1921).
M. candidus, Hueg. in Enum. Pl. Hueg. 8 (1837).
M. erubescens, Putterl. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 60 (1839).
M. ringens, (Drum. et Harv.) F.v.M. Fragm. i. 218 (1859).
M. lineatus, F.v.M. Fragm. i. 217 (1859).
M. pictus, Lindl. Swan Riv. App. 22 (1839).
3. *BURSARIA*, Cav. Ic. et Deser. Pl. iv. 30. t. 350 (1797).
B. spinosa, Cav. Ic. et Deser. Pl. iv. 30. t. 350 (1797).
4. *SOLLYA*, Lindl. in Bot. Reg. t. 1466 (1830).
S. fusiformis, (Labill.) Briq. in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genev. xx. 423 (1919). (*S. heterophylla*, Lindl.)
S. parviflora, Turez. in Bull. Soc. Mose. xxvii. 361 (1854).
S. erecta, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. 38 (1902).
5. *CHEIRANTHERA*, A. Cunn. in Brongn. Bot. Voy. Coq. t. 77 (1829).
C. parviflora, Benth. Fl. Austr. i. 128 (1863).
C. filifolia, Turez. in Bull. Soc. Mose. xxvii. 364 (1854).
6. *BILLARDIERA*, Sm. Sp. Bot. New Holl. i. t. 1 (1793).
B. latifolia, (Turez.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916. 609 (1917).
(*B. coriacea*, Benth.)
B. gracilis, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 213 (1904).
B. variifolia, D.C. Prodr. i. 346 (1824).
B. angustifolia, (Putterl.) Gardn. comb. nov. (*B. Lehmanniana*, F.v.M.)
B. floribunda, (Putterl.) F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. ii. 1 (1882).
(*M. floribundus*, Putterl.)
7. *CITRIOBATUS*, A. Cunn. in Loudon's Hort. Brit. Suppl. i. 585 (1832).
C. pauciflorus, A. Cunn. in Loudon's Hort. Brit. Suppl. i. 585 (1832).
8. *PRONAYA*, Hueg. Bot. Archiv. t. 6 (1837).
P. elegans, Hueg. Bot. Archiv. t. 6 (1837).

Byblidaceae.

1. *BYBLIS*, Salisb. Parad. Lond. t. 95 (1808).
B. liniflora, Salisb. Parad. Lond. t. 95 (1808).
B. gigantea, Lindl. in Swan Riv. App. 21 (1839).

Cunoniaceae.

1. *APHANOPETALUM*, Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 34 (1839).
A. clematideum, (Drumm. et Harv.) Gardn. comb. nov. (*A. occidentale*, F.v.M.)

Rosaceae.

- **RUBUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
- **R. fruticosus*, Linn. (Europ.)
- **ROSA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
- **R. rubiginosa*, Linn. (Europ.; Reg. Caucas.)

1. *ACAENA*, Linn. Mantiss. ii. 200 (1771).
A. ovina, A. Cunn. in Field's N.S. Wales 358 (1825).
2. *STYLOBASIUM*, Desf. in Mem. Mus. Par. v. 37. t. 2 (1819).
S. spathulatum, Desf. in Mem. Mus. Par. v. 37. t. 2 (1819).
S. lineare, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 95 (1845).

LEGUMINOSAE.

Mimosaceae.

1. *PITHECOLOBIUM*, Mart. in Fl. xx. (1837).
P. monoliferum, (Hassk.) Benth. in Hook. Lond. Journ. iii. 211 (1844).
2. *ALBIZZIA*, Durazz in Mag. Tose. III. iv. 11 (1772).
A. distachya, (Vent.) Macbride in Contrib. Gray Herb. n. s. lix. 3 (1919).
(*A. lophantha*, Benth.)
A. procera, (Willd.) Benth. in Hook. Lond. Journ. iii. 88 (1844).
A. lebbek (Willd.) Benth l. c. 87.
3. *ACACIA*, (Tourn.) Willd. Sp. Pl. iv. 1049 (1805).

PHYLLODINEAE.

Series I. *Alatae*.

- A. glaucoptera, Benth. in Linnæa xxvi. 604 (1854).
- A. alata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 464 (1813).
- A. diptera, Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
- A. stenoptera, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 325 (1842).

Series II. *Continuae*.

- A. incurva, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 325 (1842).
- A. trigonophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 199 (1846).
- A. imabilis, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 289 (1904).

Series III. *Pungentes*.

A. *Plurinerves*.

- A. latipes, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 334 (1842).
- A. comans, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 5 (1904).
- A. cochlearis, (Labill.) Wendl. Comm. Acac. Aphyll. 15 (1820).
- A. colletioides, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 336 (1842).
- A. acclerata, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 2 (1927).
- A. periculosa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 171 (1920).
- A. Mackeyana, Ewart et Jean White, in Proc. Roy. Soc. Viet. xxii. (n.s.) 6 (1909).
- A. sedifolia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 3 (1927).
- A. striatulata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 336 (1842).
- A. campylophylla, Benth. in Linnæa xxvi. 605 (1853).
- A. teretifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).
- A. sulcata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3 v. 460 (1813).
- A. costata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 339 (1842).
- A. pulviniformis, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 1 (1927).
- A. acuararia, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 7 (1904).
- A. Andrewsii, W. V. Fitzg. in l. c. 6.
- A. acutata, W. V. Fitzg. in l. c. 6.
- A. barbinervis, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).
- A. ataxiphylla, Benth. in Linnæa xxvi. 605 (1853).
- A. Baxteri, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 327 (1842).

B. *Uninerves*.

- A. aronitens, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
- A. quadrisulcata, F.v.M. Fragm. iii. 127 (1863).
- A. Tamminensis, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 290 (1904).
- A. calcarata, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 2 (1927).
- A. collina, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 291 (1904).
- A. erioclada, Benth. in Linnæa xxvi. 606 (1853).
- A. excentrica, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 4 (1927).
- A. patens, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 120 (1858).
- A. larcina, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 6 (1845).
- A. tetragonophylla, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 121 (1858).
- A. genistoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 330 (1864).

- A. inaequiloba*, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. l. 18 (1912).
A. nigripilosa, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 172 (1920).
A. Prainii, Maiden in l. c. li. 238 (1917).
A. sphacelata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 338 (1842).
A. ingrata, Benth. Fl. Austr. ii. 331 (1864).
A. inops, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 4 (1927).

Series IV. Calamiformes.

A. Subaphyllae.

- A. volubilis*, F.v.M. Fragm. x. 98 (1877).
A. tetragonocarpa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 4 (1844).
A. restiacea, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 379 (1842).

B. Plurinerves.

- A. squamata*, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
A. exocarpioides, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 7 (1904).
A. brachyphylla, Benth. in Linnaea xxvi. 615 (1853).
A. Ewartiana, (W. V. Fitzg.) J. White in Proc. Roy. Soc. Vict. xxiii. (n.s.) 286 (1911).
A. Dielsii, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 294 (1904).
A. Bynoeana, Benth. in Linnaea xxvi. 614 (1853).
A. Helmsiana, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 174 (1920).
A. triptycha, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 337 (1864).
A. fragilis, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 5 (1927).
A. sublexuosa, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 178 (1920).
A. leptoneura, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 341 (1842).
A. eremophila, (W. V. Fitzg.) Ewart & J. White in Proc. Roy. Soc. Vict. ns. xxiii. 286 (1911).
A. Sowdeni, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 180 (1920).
A. abrupta, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 6 (1927).
A. viscifolia, Maiden et Blakely in l. c. 7.
A. densiflora, Morrison, in Scott. Bot. Rev. i. 96 (1912).
A. papyrocarpa, Benth. Fl. Austr. ii. 338 (1864).

C. Uninerves.

- A. scirpifolia*, Meissn. in Bot. Zeit. 10 (1855).
A. extensa, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
A. longispinea, Morrison, in Scott. Bot. Rev. i. 96 (1912).
A. gonophylla, Benth. in Linnaea xxvi. 613 (1853).
A. prismifolia, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 293 (1904).
A. polychroa, E. Pritzel in l. c. 293.
A. ericifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 345 (1842).
A. psammophila, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 294 (1904).
A. Maxwellii, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 7 (1927).
A. uncinella, Benth. in Linnaea xxvi. 613 (1853).
A. enervia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 8 (1927).
A. Inceana, Domin, New Add. Fl. W. Austr. ii. 43 (1923). (*A. Inceae*, Maid & Blakely.)
A. assimilis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 172 (1920).

Seris V. Brunioideae.

- A. Rossi*, F.v.M. in Vict. Nat. July (1893).
A. cedroides, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 615 (1853).
A. lycopodifolia, A. Cunn. in Hook. Ic. Plant. t. 172 (1837).
A. hippuroides, (Heward) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 344 (1842).
A. sorophylla, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 296 (1904).
A. cometes, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 39 (1904).

Series VI. Uninerves.

A. Spinescentes.

- A. scabra*, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 605 (1853).
A. nodiflora, Benth. l. c. 621.
A. oxyclada, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 341 (1864).
A. leptacantha, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 296 (1904).
A. ulicina Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 202 (1847).
A. spinosissima, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 621 (1853). (*A. ferocior*, Maiden.)

- A. Basedowii, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 197 (1920).
 A. erinacea, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 360 (1842).
 A. intricata, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 172 (1920).

B. *Armatae*.

- A. Huegelii, Benth. in Endl. Enum. Pl. Huug. 42 (1837).
 A. nervosa, D.C. Mem. Leg. xii. 444 (1825).
 A. obovata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 329 (1842).
 A. congesta, Benth. l. c. 327.
 A. dermatophylla, Benth. Fl. Austr. ii. 346 (1864).
 A. armata, R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 3. v. 463 (1813).
 A. idiomorpha, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 329 (1842).
 A. Shuttleworthii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 7 (1844).
 A. dubia, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 9 (1904).
 A. Gregorii, F.v.M. Fragm. iii. 47 (1862).
 A. pilosa, Benth. in Linnæa xxvi. 607 (1853).
 A. crispula, Benth. l. c. 607.
 A. crassistipula, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).

C. *Triangularæ*.

- A. Cliftoniana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 10 (1904).
 A. hastulata, Smith in Rees Cyclop. xxxix. Suppl. (1819).
 A. horridula, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 9 (1844).
 A. divergens, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 331 (1842).
 A. biflora, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 463 (1813).
 A. Mooreana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 10 (1904).
 A. decipiens, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 463 (1813).
 A. vernicosa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 11 (1904).
 A. cuneata, Benth. in Endl. Enum. Pl. Huug. 42 (1837).
 A. dilatata, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 608 (1853).
 A. Rendlei, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 241 (1917).
 A. orbifolia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 9 (1927).
 A. bidentata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 333 (1842).
 A. flabellifolia, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 11 (1904).
 A. acanthoclada, F.v.M. Fragm. iii. 127 (1863).
 A. Forrestiana, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 298 (1904).

D. *Brevifoliae*.

- A. lachnophylla, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 150 (1882).
 A. triquetra, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 358 (1842).
 A. chrysopoda, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 10 (1927).
 A. ligustrina, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 203 (1847).
 A. saxatilis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 173 (1920).
 A. glabriflora, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 12 (1927).
 A. Meissneri, Lehm. Del. Sem. Hort. Bot. Hamb. 1842.
 A. Merriekae, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 13 (1927).
 A. sericocarpa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 9 (1904).
 A. Merrallii, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 2nd. ser. v. 18 (1890).
 A. oblonga, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 10 (1927).
 A. Tysoni, Luehmann in Viet. Nat. xiii. 112 (1897).
 A. pallidiramosa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 12 (1927).
 A. anceps, D.C. Mem. Leg. 446 (1825).
 A. undulifolia, Fraser, in Lodd. Bot. Cab. xvi. 1544 (1829).
 A. brachyelada, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. i. 20 (1912).
 A. dura, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 622 (1853).
 A. spathulata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 356 (1864).
 A. porphyrochila, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 290. (1904).

E. *Angustifoliae*.

- A. glutinosissima, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 13 (1927).
 A. acutifolia, Maiden et Blakely l. c. 14.
 A. ramosissima, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 356 (1842).
 A. cupularis, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 45 (1923).
 A. Dempsteri, F.v.M. Fragm. xi. 65 (1879).
 A. sentis, F.v.M. Gen. Rep. 11 (1854).
 A. dentifera, Benth. in Maund. Bot. iv. t. 179 (1839).

F. Racemosae.

- A. amblyphylla*, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 149 (1832).
A. subglauca, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 14 (1927).
A. microbotrya, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 353 (1842).
A. aestivalis, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 300 (1904).
A. chrysellata, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 16 (1927).
A. saligna, Wendl. Comm. Acac. 26 (1820).
A. cyanophylla, Lindl. Bot. Reg. 49 (1835).
A. notabilis, F.v.M. Fragm. i. 6 (1858).
A. validinervia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 15 (1927).
A. Steedmani, Maiden et Blakely in l. c. 16.
A. hakeoides, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 354 (1842).
A. salicina, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 20 (1838).
A. Blakelyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 246 (1917).
A. rostellifera, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 356 (1842).
A. sclerosperma, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. July, 1882. (*A. spodi-*
sperma, F.v.M., and *A. leucosperma*, F.v.M.)
A. crassiuscula, Wendl. Comm. Acac. 31. t. 8 (1820).
A. Harveyi, Benth. Fl. Austr. ii. 368 (1864).
A. iteaphylla, F.v.M. in Schlecht. Linnaea xxvi. 617 (1853).
A. braeteata, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 18 (1927).
A. subacutulea, Lindl. Bot. Reg. t. 1075 (1827).
A. Graffiana, F.v.M. in Melb. Chem. n.s. ii. 118 (1887).
A. Lindleyi, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 14 (1844).
A. leptopetala, Benth. in Schlecht. Linnaea, xxvi. 619 (1853).
A. pyriformis, D.C. Mem. Leg. 447 (1825).
A. myrtifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 1054 (1805).

*Series VII. Plurinervae.**A. Armatae.*

- A. dictyoneura*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 303 (1904).
A. scalpelliformis, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 200 (1847).
A. urophylla, Benth. in Bot. Reg. 24 (1841).

B. Triangulares.

- A. adnata*, F.v.M. in Melb. Chemist July, 1882.
A. deltoidea, A. Cunn. in G. Don. Syst. ii. 401 (1832). (*A. stipulosa*, F.v.M.)
A. Luehmanni, F.v.M. Fragm. xi. 116 (1881).
A. Froggattii, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 204 (1920).

C. Brevifoliae.

- A. loxophylla*, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 625 (1853).
A. setulifera, Benth. in l. c. 625.
A. translucens, A. Cunn. in Hook. Ic. Plant. t. 160 (1837).
A. impressa, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 133 (1858).

D. Oligoneurac.

- A. bivenosa*, D.C. Prodr. ii. 452 (1825).
A. nitidula, Benth. Fl. Austr. ii. 381 (1864).
A. deflexa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 18 (1927).
A. Kingiana, Maiden et Blakely, l. c. 19.
A. heteroclitata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 318 (1845).
A. Ridleyana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 12 (1904).
A. Benthani, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 11 (1844).
A. obtecta, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 20 (1927).
A. eremaea, Cecil Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 40 (1904).

E. Microneurac.

- A. ancistrophylla*, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 40 (1904).
A. resinostipulea, W. V. Fitzg. in l. c. i. 12.
A. leptospermoides, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 626 (1853).
A. Osswaldi, F.v.M. Pl. of Viet. ii. 27 (1860).
A. Loderi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 209 (1919).
A. pachyacra, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 21 (1927).
A. subangularis, Maiden et Blakely in l. c. 21.
A. lineolata, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 626 (1853).

- A. coriacea*, D.C. Mem. Leg. 446 (1825).
A. stenophylla, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 366 (1842).

F. Nervosae.

- A. hemignosta*, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 134 (1858).
A. sclerophylla, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 138 (1838).
A. heteroneura, Benth. in Schlecht. Linnæa. xxvi. 624 (1853).
A. xiphophylla, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 364 (1842).
A. duriuseula, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. multilineata, W. V. Fitzg. in l. c. 13.
A. dictyophleba, F.v.M. Fragm. iii. 128 (1863).
A. cyclopis, A. Cunn. in Loudon Hort. Brit. 407 (1830).
A. implexa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 368 (1842).

G. Dimidiatae.

- A. platycarpa*, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 145 (1858).
A. sericata, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 380 (1842).
 (*A. flavescens*, A. Cunn.)
A. retivenia, F.v.M. Fragm. iii. 128 (1863).
A. dineura, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 130 (1858).

Series VIII. Juliflorae.

A. Spicatae.

- A. Kochii*, (W. V. Fitzg.) Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n.s. xxiii. 285 (1911).

B. Rigidulae.

- A. craspedocarpa*, F.v.M. in Melb. Chemist. n.s. ii. 73 (1887). (*A. euphleba*, W. V. Fitz.)
A. Wickhami, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 379 (1842).
A. lysiphloea, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 137 (1858).
A. linarioides, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 371 (1842).
A. Kellerei, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales xvi. 468 (1891).
A. stipuligera, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 144 (1858).
A. ptychophylla, F.v.M. in l. c. 142.
A. sphaerostachya, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 305 (1904).
A. xiphophylla, E. Pritzel, in l. c. 305.
A. stigmatophylla, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 377 (1842).
A. Chisholmi, Bail. in Queensland Agric. Journ. iv. 47 (1899).
A. acradenia, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 142 (1858).
A. curvicarpa, W. V. Fitzg. in Proc. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 114 (1917).
A. leptophleba, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 143 (1858).
A. megalantha, F.v.M. in l. c. 143.

C. Tetramerae.

- A. neurophylla*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 13 (1904).
A. malloclada, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 23 (1927).
A. cochliocarpa, Meissn. in Bot. Zeit. 10 (1855).

D. Stenophyllae.

- A. Coolgardiensis*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 211 (1919).
A. aciphylla, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 627 (1853).
A. filifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 369 (1842).
A. ophedroides, Benth. in l. c. 370.
A. Tratmaniana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 8 (1904).
A. Hynesiana, W. V. Fitzg. Journ. Bot. l. 20 (1912).
A. merinthophora, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 307 (1904).
A. Burkittii, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864). (*A. Rantelliana*, W. V. Fitzg.)
A. microneura, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 19 (1844).
A. Jutsoni, Maiden, in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 262 (1917).
A. resinomarginea, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. palustris, Luehmann in Viet. Nat. Dec. 1896.
A. Grasbyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 251 (1917).
A. cyperophylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864).
A. longiphyllodinea, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 254 (1917).
A. inophloia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 25 (1927).
A. sessilispica, Maiden et Blakely in l. c. 23.

- A. multispicata*, Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864).
A. pityoides, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 135 (1858).
A. xylocarpa, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 370 (1842).
A. Kimberleyensis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 112 (1917).
A. ramulosa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. linophylla, W. V. Fitzg. in l. c. 16.
A. Websteri, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 25 (1917).
A. Jibberdingensis, Maiden et Blakely in l. c. 29.
A. oncinophylla, Lindl. (Bot. Reg. xxv.) Swan Riv. App. 15 (1839).
A. Fauntleroyi, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 26 (1927).
A. Tanumbirincense, Maiden in Ewart & Davies, Flora, N. Terr. 338 (1917).
A. arida, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 370 (1842).
A. trachycarpa, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 308 (1904).
A. aneura, F.v.M. in Schlecht. Linnæa xxvi. 627 (1853).
A. sibirica, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 189 (1898).
A. brachystachya, Benth. Fl. Austr. ii. 403 (1864).
A. cibaria, F.v.M. in Melb. Chemist. July, 1882.

E. Falcatae.

- A. Clementi*, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 26 (1927).
A. Cuthbertsoni, Luehmann in Viet. Nat. xiii. 117 (1897).
A. cognata, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 28 (1927).
A. lasiocalyx, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 41 (1904).
A. doratoxyton, A. Cunn. in Field's N.S.W. 345 (1825).
A. proxima, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 105 (1917). (*A. camptoclada*, E.P.)
A. adsurgens, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 28 (1927).
A. eriopoda, Maiden et Blakely in l. c. 27.
A. numerosa, Maiden et Blakely in l. c. 27.
A. acuminata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 373 (1862). (*A. Oldfieldii*, Benth.)
A. signata, F.v.M. Fragm. iv. 7 (1864).
A. Stowardi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 269 (1917).
A. Beauverdiana, Ewart & Sharman in Proc. Roy. Soc. Vict. n.s. xxvii. 230 (1916).
A. stereophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 203 (1847).
A. delibrata (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 374 (1842).
A. quadrimarginea F.v.M. Fragm. x. 31 (1876).
A. Helmsleyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 87 (1917).
A. plectocarpa, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 375 (1842).
A. lentiginea, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 30 (1927).
A. pachycarpa, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 139 (1858).
A. aneurocarpa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 31 (1927).
A. Cunninghamii, Hook. Ic. Plant. t. 165 (1837).
A. Gardneri, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 32 (1927).
A. tumida, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 144 (1858).
A. oncinocarpa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 378 (1842).
A. aulacocarpa, (A. Cunn.) Benth l. c. 378.
A. retinervis, Benth. in l. c. 379.

F. Dimidiatae.

- A. latifolia*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 382 (1842).
A. holsericea, A. Cunn. in G. Don. Gen. Syst. ii. 407 (1832).
A. denticulosa, F.v.M. Fragm. x. 32 (1876).
A. humifusa, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 382 (1842).

BIPINNATAE.

Series IX. Botryocephalae.

- A. pachyphloia*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales li. 116 (1917).

Series X. Pulchellae.

- A. pulchella*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 464 (1813). (*A. Goodbyi*, Domin.)
A. pentadenia, Lindl. Bot. Reg. t. 1521 (1832).
A. Gilberti, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 204 (1847).

- A. nigricans, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 465 (1813).
 A. Taylorina, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. July. 1882.
 A. Drewiana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 273 (1917).
 A. obscura, D.C. Not. 6 Pl. Rar. Jard. Genev. 23. t. 3 (1829)
 A. insolita, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 310 (1904).
 A. strigosa, Link. Enum. Pl. Hort. Berol. 444 (1822).
 A. Drummondii, Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
 A. Moirii, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 312 (1904).
 A. grisea, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 174 (1920).

Series XI. Gumniferae.

- A. Farnesiana, Willd. Sp. Pl. iv. 1083 (1805).
 A. suberosa, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 499 (1842).
 A. Bidwilli, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 629 (1853).
 A. pallida, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 147 (1858).
4. *NEPTUNIA*, Lour, Fl. Cochinch. ii. 653 (1790).
 N. gracilis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. 355 (1842).
 N. monosperma, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 300 (1864).
5. *DICHOSTACHYS*, Wight et Arnott Prodr. 271 (1834).
 D. spicata, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*D. Muelleri*, Benth.)

Caesalpiniaceae.

1. *ERYTHROPHLEUM*, Afzel ex R.Br. in Tuckey's Narr. Congo. 430 (1818).
 E. chlorostachys, (F.v.M.) Hennings ex Taub. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. iii. 3. 127 (1892). (*E. Laboucherii*, F.v.M.)
2. *BAUHINIA*, Linn. Gen. ed. I. 126 (1736).
 B. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. ii. 295 (1864).
3. *LABICHEA*, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 507 (1825).
 L. cassioides, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 507 (1825).
 L. lanceolata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 41 (1837).
 L. punctata, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
4. *PETALOSTYLES*, R.Br. in Sturt Exped. Central Austr. App. ii. 79 (1849).
 P. labicheoides, R.Br. in App. Sturt Exped. 80 (1849).
 P. millefolium, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 275 (1904).
5. *CASSIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 C. sophera, Linn. Sp. Pl. 379 (1753).
 C. venusta, F.v.M. Fragm. i. 165 (1859).
 C. notabilis, F.v.M. l. e. iii. 28 (1862).
 C. pleurocarpa, F.v.M. l. e. i. 223 (1859)
 C. neurophylla, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 147 (1918).
 C. retusa, Soland, in Linnæa, xi. 72 (1842).
 C. australis, Sims, in Bot. Mag. t. 2676 (1826).
 C. Chatelainiana, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 485. t. 111 (1826).
 C. glutinosa, D.C. Prodr. ii. 495 (1825).
 C. cladophylla, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 147 (1918).
 C. pruinosa, F.v.M. Fragm. iii. 48 (1862).
 C. phyllodinea, R.Br. in App. Sturt Exped. 15 (1849).
 C. eremophila, A. Cunn. in T. Vog. Gen. Cass. Synops. 47 (1837).
 C. artemisioides, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 495 (1825).
 C. Sturtii, R.Br. in App. Sturt Exped. 77 (1849).
 C. desolata, F.v.M. in Linnæa xxv. 389 (1852).
 C. oligophylla, F.v.M. Fragm. iii. 49 (1862).
 C. oligoclada, F.v.M. l. e. 49.
 C. cardiosperma, F.v.M. Fragm. x. 50 (1877).
 C. pumila, Lam. Encycl. Meth. i. 620 (1783).
 C. concinna, Benth. Fl. Austr. ii. 291 (1864).
 C. mimosoides, Linn. Sp. Pl. 379 (1753).
6. *CAESALPINIA*, Linn. Sp. Pl. 380 (1753).
 C. Bonducella, (Linn.) Fleming in Asiat. Research xi. 159 (1801).

Papilionaceae.

I. Podalyricae.

1. *JANSONIA*, Kipp. in Proc. Linn. Soc. i. 330 (1847).
J. pimeleoides, (Meissn.) Gardn. comb. nov. (*J. formosa*, Kipp.)
2. *BRACHYSEMA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
B. praemorsum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 25 (1844).
B. lanceolatum, Meissn. in l. c. i. 24.
B. latifolium, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
B. sericeum, (Sm.) Domin. New Add. Fl. W. Austr. 25 Prague, (1923)
(*B. undulatum*, Ker.)
B. subcordatum, Benth. Fl. Austr. ii. 11 (1864).
B. bracteolosum, F.v.M. Fragm. iv. 10 (1864).
B. aphyllum, Hook. Bot. Mag. t. 4481 (1849).
B. macrocarpum, Benth. Fl. Austr. ii. 13 (1864).
B. tomentosum, Benth. l. c. 13.
B. Chambersii, (F.v.M.) Benth. l. c. 13.
B. daviesioides, (Turez.) Benth. l. c. 13.
3. *OXYLOBIUM*, Andrews, Bot. Rep. t. 492 (1809). (*Callistachys*, Vent.)
O. lanceolatum, (Vent.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916 638
(1917).
O. ellipticum, (Labill.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
O. linearifolium, (Don.) Domin. New Add. Fl. W. Austr. 26, Prague (1923).
(*O. lineare*, Benth.)
O. carinatum, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 18 (1864).
O. spathulatum, (Meissn.) Benth. l. c. 18.
O. obtusifolium, Sweet, Fl. Austral. t. 5 (1827).
O. microphyllum, Benth. Fl. Austr. ii. 19 (1864).
O. tricuspidatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 30 (1844).
O. spectabile, Endl. Nov. Stirp. Dec. 2 (1839).
O. atropurpureum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. 250 (1853). (*Nemcia*
atropurpurea (Turez.) Domin.)
O. coriaceum, (Sm.) Gardn. comb. nov. (*O. retusum*, R.Br.)
O. graniticum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 185 (1898).
O. virgatum, Benth. Fl. Austr. ii. 22 (1864).
O. reticulatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 29 (1844).
O. capitatum, Benth. in Enum. pl. Hueg. 28 (1837).
O. euneatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
O. melinoeae, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 224 (1904).
O. acutum, Benth. Fl. Austr. ii. 24 (1864).
O. parviflorum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
O. Kelsoi, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 4 (1904).
O. heterophyllum, (Turez.) Benth. Fl. Austr. ii. 25 (1864).
O. tetragonophyllum, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 226 (1904).
O. emarginatum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 167 (1920).
3. *CHORIZEMA*, Labill. Voy. I. 405 (1799).
C. Dicksonii, Grah. in Maund. Botanist, t. 106 (1841).
C. nervosum, T. Moore in Gard. Comp. 1852 (1852).
C. varium, Benth. in Lindl. Bot. Reg. 1839. t. 49 (1839).
C. cordatum, Lindl. Bot. Reg. 1838. t. 10 (1838).
C. ilicifolium, Labill. Voy. i. 405. t. 21 (1799).
C. rhombeum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 9 (1811).
C. diversifolium, D.C. Pl. Rar. Jard. Gen. 7e. 44 (1836).
C. glycinifolium, (Sm.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 615
(1917). (*C. angustifolium*, Benth.)
C. reticulatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 34 (1844).
C. trigonum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1853. i. 254 (1853).
C. genistoides, (Meissn.) Gardn. comb. nov. (*C. humile*, Turez.)
C. cytisoides, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1853. i. 256 (1853).
C. uncinatum, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 38 (1904).
C. aciculare, (D.C.), Gardn. comb. nov. (*C. Henchmanni*, R.Br.)
C. ericifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 209 (1847).
5. *MIRBELIA*, Sm. in Koenig. et Sims Ann. Bot. i. 511 (1805).
M. dilatata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 21 (1811).

- M. racemosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. i. 282 (1853).
M. subeordata, Turcz. in l. c. 282.
M. ovata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 77 (1844).
M. floribunda, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
M. spinosa, Benth. Fl. Austr. ii. 36 (1864).
M. trichocalyx, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 28. Prague (1923).
M. depressa, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 230 (1904).
M. microphyloides, S. Moore, in Journ. Bot. 164 (1897).
M. microphylla, (Turcz.) Benth. Fl. Austr. ii. 37 (1864).
M. multicaulis, (Turcz.) Benth. l. c. 37.
M. ramulosa, (Benth.) Gardn. comb. nov. (*M. daviesioides*, Benth.)
M. viminalis, (A. Cunn.) Gardn. comb. nov. (*M. oxyclada*, F.v.M.)
6. *ISOTROPIS*, Benth. in Enum. pl. Hueg. 28 (1837).
I. cuneifolia, (Sm.) Domin, New Add. Fl. W. Austr. 28, Prague (1923).
 (*I. striata*, Bth.)
I. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 31 (1844).
I. juncea, Turcz. in Bull. Mose. i. 251 (1853).
I. canescens, F.v.M. Fragm. x. 51 (1876).
I. atropurpurea, F.v.M. l. c. iii. 16 (1862).
I. Forrestii, F.v.M. in Wing's S. Se. Rec. ii. 252 (1882).
7. *GOMPHOLOBIUM*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 220 (1798).
G. ovatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 35 (1844).
G. amplexicaule, Meissn. in l. c. i. 36.
G. polymorphum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 11 (1811).
G. obovatum, Turcz. in Bull. Soc. Mose. i. 258 (1853).
G. marginatum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 11 (1811).
G. Eatoniae, F.v.M. in Vict. Natur. vi. 38 (1889).
G. Baxteri, Benth. Fl. Austr. ii. 46 (1864).
G. aristatum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. 72 (1838).
G. burtonioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 37 (1844).
G. capitatum, A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg. i. 1563 (1839).
G. tomentosum, Labill. in pl. Nov. Holl. i. 106. t. 134 (1804).
G. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 40 (1844).
G. viscidulum, Meissn. in l. c. i. 39.
G. Shuttleworthii, Meissn. in l. c. i. 39.
G. venustum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 12 (1811).
G. Knightianum, Lindl. in Bot. Reg. t. 1468 (1837).
8. *BURTONIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 13 (1811).
B. subulata, Benth. Fl. Austr. ii. 50 (1864).
B. polyzyga, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 51 (1864).
B. villosa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 41 (1844).
B. Hendersoni, (Paxt.) Benth. Fl. Austr. ii. 51 (1864).
B. asperula, S. Moore in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 167 (1920).
B. viscida, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 234 (1904).
B. gompholobioides, F.v.M. Fragm. x. 34 (1876).
B. scabra, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 12 (1811).
B. conferta, D.C. Prodr. ii. 106 (1825).
B. simplicifolia, F.v.M. et Tate in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xvi. 348 (1896).
9. *JACKSONIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 12 (1811).
J. floribunda, Endl. in Ann. des Wien. Mus. ii. 197 (1838).
J. carduacea, Meissn. in Bot. Zeit. 1855, 25 (1855).
J. decumbens, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 238 (1904).
J. eremodendron, E. Pritzel. in l. c. 239.
J. argentea, Gardn. in Bull. Forests Dep. xxxii. 54 (1923).
J. grevilleoides, Turcz. in Bull. Mose. xxvi. i. 259 (1853).
J. petrophiloides, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 148 (1918).
J. aculeata, W. V. Fitzg. in l. c. 149.
J. foliosa, Turcz. in Bull. Mose. xxvi. i. 260 (1853).
J. spinosa, (Labill.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 13 (1811).
J. stricta, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. 27 (1855).
J. hakeoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 45 (1844).
J. furellata, (Bonpl.) D.C. Prodr. ii. 107 (1824).
J. horrida, D.C. l. c. 107.

- J. mollissima*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 22 (1905).
J. sericea, Benth. in Enum. pl. Hueg. 31 (1837).
J. Sternbergiana, Hueg. Bot. Arkiv. t. 3 (1837).
J. Forrestii, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. ser. II. ii. 194 (1887).
J. thesioides, (A. Cunn.) Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. 74 (1838).
J. compressa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 260 (1853).
J. calycina, Domin, New Add. Flora W. Austr. 31 Prague (1923).
J. cupulifera, Meissn. in Bot. Zeit. 27 (1855).
J. restioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 46 (1844).
J. velutina, Benth. Fl. Austr. ii. 60 (1864).
J. Lehmanni, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 46 (1844).
J. racemosa, Meissn. in l. c. ii. 212 (1847). (*J. hemisericea*, Herbert.)
J. umbellata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 261 (1853).
J. nematoclada, F.v.M. Fragm. x. 50 (1876).
J. rhadinoelada, F.v.M. l. c. 38.
J. capitata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 45 (1844).
J. alata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 30 (1837).
J. aphylla, (Turcz) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles 1916. 629 (1917).
(*J. piptomeris*, Benth.)
J. pteroclada, F.v.M. Fragm. x. 37 (1876).
J. macrocalyx, Meissn. in Bot. Zeit. 1855. 26 (1855).
10. *SPHAEROLOBIUM*, Sm. in Koenig et Sims Ann. Bot. i. 509 (1805).
S. linophyllum, (Hueg.) Benth. Fl. Austr. ii. 64 (1864).
S. nudiflorum, (Meissn.) Benth. l. c. 64.
S. gracile, Benth. l. c. 64.
S. racemosum, Benth. l. c. 65.
S. alatum, Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
S. vimineum, Sm. in Koenig et Sims, Ann. Bot. i. 509 (1805).
S. grandiflorum, (R.Br.) Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
S. fornicatum, Benth. l. c. 32.
S. medium, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 14 (1811).
S. scabriusculum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 214 (1847).
S. maeranthum, Meissn. in l. c. 213.
S. daviesioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 266 (1853).
11. *VIMINARIA*, Smith Exotic Bot. 51. t. 27 (1804).
V. denudata, Sm. Exot. Bot. 51. t. 27 (1804).
12. *ERICHSENIA*, Hemsl. in Hook. Ic. plant. t. 2777 (1905).
E. uncinata, Hemsl. in Hook. Ic. plant. t. 2777 (1905).
13. *DAVIESIA*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 220 (1798).
Series 1. *Involucratae*, Benth.
D. cordata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 259 (1808).
D. ovata, Benth. Fl. Austr. ii. 72 (1864).
D. crenulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 265 (1853).
D. oppositifolia, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. 199 (1838).
D. alternifolia, Endl. in l. c. 199.
D. elongata, Benth. Fl. Austr. ii. 74 (1864).
Series 2. *Umbellatae*, Benth.
D. pedunculata, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
D. arthropoda, F.v.M. Fragm. viii. 22 (1874).
D. mollis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 263 (1853).
Series 3. *Racemosae*, Benth.
D. costata, E. Cheel, in Journ. Roy. Soc. W.A. vi. (pt. i.) 35 (1920).
D. buxifolia, Benth. Fl. Austr. ii. 75 (1864).
D. horrida, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 54 (1844).
D. reclinata, (A. Cunn.) Benth. Fl. Austr. ii. 77 (1864).
D. obtusifolia, F.v.M. Fragm. ii. 104 (1861).
D. obovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 261 (1853).
Series 4. *Calamiformes*, Benth.
D. Croniniana, F.v.M. in Vict. Nat. x. 194 (1894).
D. longifolia, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
D. chordophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 48 (1844).
D. nematophylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 78 (1864).

Series 5. *Fasciculatae*, Benth.

- D. daphnoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 54 (1844).
- D. nudiflora, Meissn. in l. c. 53.
- D. rhombifolia, Meissn. in l. c. 56.
- D. cardiophylla, F.v.M. Fragm. ii. 105 (1861).
- D. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 53 (1844).
- D. ulicina, Sm. in Koenig et Sims Ann. Bot. i. 506 (1805).
- D. Grahmi, Ewart et Jean White, in Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. xxii. 12 (1909).
- D. uniflora, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. viii. 37 (1922).

Series 6. *Tercitifoliae*, Benth.

- D. pachyphylla, F.v.M. Fragm. iv. 15 (1864).
- D. teretifolia, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 82 (1864).
- D. hakeoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 47 (1844).
- D. colletioides, Meissn. in l. c. 48.
- D. reversifolia, F.v.M. Fragm. i. 145 (1859).
- D. inersata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 255 (1808).
- D. brevifolia, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austr. ii. 201 (1838).
- D. acanthoclona, F.v.M. Fragm. x. 32 (1876).
- D. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 50 (1844).
- D. spinosissima, Meissn. in l. c. 51.
- D. pachylina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 263 (1853).

Series 7. *Verticales*, Benth.

- D. quadrilatera, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
- D. striata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 264 (1853).
- D. polyphylla, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
- D. microphylla, Benth. Fl. Austr. ii. 86 (1864).
- D. Dielsii, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 249 (1904).

Series 8. *Decurrentes*, Benth.

- D. flexuosa, Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
- D. pectinata, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austr. ii. 151 (1838).
- D. trigonophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 213 (1847).
- D. epiphylla, Meissn. in Bot. Zeit. 27 (1855).

Series 9. *Aphyllae*, Benth.

- D. euphorbioides, Benth. Fl. Austr. ii. 88 (1864).
- D. divaricata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 31 (1837).
- D. paniculata, Benth. in l. c. 31.
- D. aphylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 88 (1864).
- D. juncea, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 260 (1808).

- 14. *AOTUS*, Sm. in Koenig et Sims Ann. of Bot. i. 504 (1805). --
 - A. villosa, Sm. in Ann. Bot. i. 504 (1805).
 - A. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 214 (1847).
 - A. phyllicoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 92 (1864).
 - A. genistoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 268 (1853).
 - A. carinata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 215 (1847).
 - A. passerinoides, Meissn. in l. c. i. 61 (1844).
 - A. diffusa, Gardn. Ms.
 - A. Tietkinsii, F.v.M. Fragm. x. 33 (1876).
 - A. cordifolia, Benth. in Enum. pl. Hueg. 33 (1837).
- 15. *PHYLLOTA*, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 33 (1837).
 - P. barbata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 33 (1837).
 - P. graeillis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 267 (1853).
- 16. *PULTENAEA*, Sm. Bot. Nov. Holl. 35 t. 12 (1793).
 - P. Luchmanni, Maiden in Viet. Nat. xxii. 100.
 - P. Georgei, (Hemsl.) Gardn. comb. nov. (*Phyllota Georgei*, Hemsl.)
Pultenaea astipulca, Herbert.)
 - P. humilis, (S. Moore) Gardn. comb. nov. (*Phyllota humilis*, S. Moore.)
 - P. capitata, (Turcz.) Gardn. comb. nov. (*Pultenaea urodon*, Benth.)
 - P. arachnoidea, Gardn. Ms.
 - P. lycopodioides, (S. Moore), Gardn. comb. nov. (*Phyllota lycopodioides*, S. Moore.)
 - P. Skinneri, F.v.M. Fragm. viii. 166 (1874).

- P. Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
P. barbata, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 38 (1904).
P. pinifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 220 (1847).
P. conferta, Benth. Fl. Austr. ii. 118 (1864).
P. pauciflora, Scott in Kew Bull. 1914, 378 (1914).
P. reticulata, (Sm.) Benth. Fl. Austr. ii. 119 (1864).
P. ochreatea, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75 (1844).
P. aspalathoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 73.
P. obcordata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 120 (1864).
P. arida, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 258 (1904).
P. rotundifolia, (Turez.) Benth. Fl. Austr. ii. 121 (1864).
P. calycina, (Turez.) Benth. l. c. 121.
P. spinulosa, (Turez.) Benth. l. c. 121.
P. cymbifolia, J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. South Austr. xxxix. 96 (1915).
P. vestita, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 19 (1811).
P. strobilifera, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75 (1844).
P. ericifolia, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
P. verruculosa, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 278 (1853).
P. empetrifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76 (1844).
P. radiata, H. B. Williamson, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxxiii. (n.s.) 137 (1921).
P. adunca, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 279 (1853).
P. neurocalyx, Turez. l. c. 281.
P. tenuifolia, R.Br. in Bot. Mag. t. 2086 (1819).

17. *GASTROLOBIUM*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).

Series i. *Axillares*, Benth.

- G. pyramidale*, T. Moore, in Gard. Comp. i. 81 (1852).
G. Lehmanni, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 70 (1844).
G. pulchellum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 274 (1853).
G. stipulare, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 218 (1847).
G. Brownii, Meissn. in l. c. i. 71 (1844).
G. reticulatum, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 99 (1864).
G. truncatum, Benth. l. c. 99.
G. crispifolium, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 35 Prague (1923).
G. spathulatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
G. Stowardi, S. Moore. in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 169 (1920).
G. plicatum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 274 (1853).
G. tricuspidatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 66 (1844).
G. obovatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
G. epacridioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 72 (1844).
G. trilobum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. ilicifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 67 (1844).

Series ii. *Racemosae*, Benth.

- G. villosum*, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. polystachyum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 217 (1847).
G. ovalifolium, Henfr. in Gard. Comp. i. 41 (1852).
G. grandiflorum, F.v.M. Fragm. iii. 17 (1862).
G. pyenostachyum, Benth. Fl. Austr. ii. 103 (1864).
G. spinosum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. rotundifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 216 (1847).
G. densifolium, Gardn. in Journ. Roy. Soc. W.A. xii. 69 (1926).
G. floribundum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 170 (1920).
G. microcarpum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 70 (1844).
G. oxylobioides, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. calycinum, Benth. in l. c. 13. (*G. sagittulatum*, S. Moore.)
G. Callistachys, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 216 (1847).
G. Forrestii, Ewart in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, (1908) xlii. 188 (1909).
G. stenophyllum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 275 (1853).
G. crassifolium, Benth. Fl. Austr. ii. 105 (1864).
G. parvifolium, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. hamulosum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 218 (1847).
G. velutinum, Lindl. in Paxt. Fl. Gard. iii. 76. f. 270 (1853).
G. bidens, Meissn. in Bot. Zeit. xlii. 29 (1855). (*G. Laytonii*, J. White.)
G. bilobum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).
G. seorsifolium, F.v.M. Fragm. x. 35 (1876).

18. *EUTAXIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).
E. cuneata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 65 (1844).
E. obovata, (Labill.) Gardn. comb. nov. (*E. myrtifolia*, R.Br.)
E. epaeridioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 64 (1844).
E. virgata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 34 (1837).
E. densifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 271 (1853).
E. dillwynioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 63 (1844).
E. parvifolia, Benth. in Enum. pl. Hueg. 34 (1837).
E. microphylla, (R.Br.) Gardn. comb. nov. (*E. empetrifolia*, Schlecht.)
19. *LATROBEA*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
L. abnormis, (F.v.M.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 1916, 631 (1917). (*L. pungens*, Benth.)
L. genistoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
L. Brunonis, (Benth.) Meissn. in l. c. 219.
L. tenella, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 141 (1864).
L. hirtella, (Turcz.) Benth. l. c. 142.
L. diosmifolia, Benth. l. c. 142.
20. *DILLWYNIA*, Sm. in Koenig et Sims, Ann. of. Bot. i. 510 (1805).
D. incerta, Domin, Zvlastno Otisk Z Vestnika Kral. Ces. Spole. Nauk II. 37 (1923).
D. dillwynioides, (Meissn.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 620 (1917). (*D. Preissii*, Benth.)
D. acerosa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xxxiv. 187 (1898).
D. pungens, (Sweet) Mackay, in den Annal des Wien. Mus. ii. 79 (1838).
D. cinerascens, R.Br. in Bot. Mag. t. 2247 (1821).
D. divaricata, (Turcz.) Benth. Fl. Austr. ii. 151 (1864).
D. uncinata, (Turcz.) Gardn. comb. nov. (*D. patula*, F.v.M.)
21. *EUCHILOPSIS*, F.v.M. in Melb. Chemist June (1882).
E. linearis, (Benth.) F.v.M. in Melb. Chem. June (1882). (*Sphaerolobium euchilus*, Benth.)
- II. Genisteeae.
22. *BOSSIAEA*, Vent. Jard. Cels. i. 7. t. 7 (1800).
Series i. *Oppositifoliae*, Benth.
B. dentata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 156 (1864).
B. aquifolium, Benth. l. c. 157.
B. Laidlawiana, Tovey et Morris in Proc. Roy. Soc. Vict. (n.s.) xxxiv. 207 (1922).
B. Webbia, F.v.M. in Melb. Chem. et Drugg. Dec. (1882).
B. strigillosa, Benth. Fl. Austr. ii. 157 (1864).
- Series ii. *Normales*, Benth.
B. biloba, Benth. in Enum. pl. Hueg. 36 (1837).
B. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 82 (1844).
B. concinna, Benth. Fl. Austr. ii. 161 (1864).
B. linophylla, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 268 (1812).
B. disticha, Lindl. Bot. Reg. 1841, Misc. 38 (1841).
B. pulchella, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 84 (1844).
B. peduncularis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 287 (1853).
B. rufa, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. iv. 267 (1812).
B. Walkeri, F.v.M. Fragm. ii. 120 (1861).
B. leptacantha, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 263 (1904).
B. phylloclada, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. 52 (1859).
- Series iii. *Eriocarpae*, Benth.
B. ornata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. ii. 158 (1864).
B. eriocarpa, Benth. in Enum. pl. Hueg. 36 (1837).
B. divaricata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 285 (1853).
B. spinosa, (Turcz.) Domin, New Add. Fl. W. Austr. (Prague) 39 (1923). (*B. calycina*, Benth.)
23. *TEMPLETONIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2. iv. 269 (1812).
T. retusa, (Vent.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 269 (1812).
T. Drummondii, Benth. Fl. Austr. ii. 169 (1864);

- T. aculeata*, (F.v.M.) Benth. l. c. 170.
T. egena, (F.v.M.) Benth. l. c. 170.
T. Battii, F.v.M. in Melb. Chem. et Drugg. n.s. ii. 31 (1887).
T. sulcata, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 171 (1864).
24. *HOVEA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 275 (1812).
H. acanthoelada, (Turez.) F.v.M. Fragm. iv. 15 (1864).
H. chorizemifolia, (Sweet) D.C. Prodr. ii. 116 (1825).
H. elliptica, (Sm.) D.C. Prodr. ii. 115 (1825). (*H. Celsi*, Bonpl.)
H. trisperma, Benth. in Enum. pl. Hueg. 37 (1837).
H. stricta, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 79 (1844).
H. pungens, Benth. in Enum. pl. Hueg. 37 (1837).
25. *GOODIA*, Salisb. Parad. Lond. t. 41 (1806).
G. lotifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 41 (1806).
26. *CROTALARIA*, Dill. ex Linn. Gen. ed. I. 218 (1737).
- Sect. i. *Simplicifoliae*, Benth.
C. alata, Hamilt. in D. Don. Prodr. Fl. Nepal. 241 (1825).
C. retusa, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. Mitchellii, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 120 (1848).
C. linifolia, Linn. fl. Suppl. 322 (1781).
C. membranacea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy Soc. W.A. iii. 150 (1918).
C. verrucosa, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. crispata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 179 (1864).
C. junea, Linn. Sp. Pl. 714 (1753).
- Sect. ii. *Unifoliolatae*, Benth.
C. Novae-Hollandiae, D.C. Prodr. ii. 127 (1825).
C. erassipes, Hook. Icon. plant. t. 830 (1852).
C. Cunninghamii, R.Br. in Sturt's Exped. ii. App. 71 (1849).
- Sect. iii. *Trifoliolatae*, Bak.
C. trifoliastrum, Willd. Sp. Pl. iii. 983 (1753).
C. laburnifolia, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. incana, Linn. Sp. Pl. 716 (1753).
C. dissitiflora, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 386 (1848).
C. Benthamiana, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 267 (1904).
- **LUPINUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **L. pilosus*, Murr. (Europ. austr.)
 **L. hirsutus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
 **L. angustifolius*, Linn. (Reg. Mediterr.)
 **L. luteus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **ULEX*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **U. europaeus*, Linn. (Europ. occ.)
- **CYTISUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **C. prolifer*, Linn. f. (Ins. Canar.)
- III. Trifolieae.
27. *TRIGONELLA*, Linn. Gen. ed. i. 351 (1737).
T. suavissima, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 255 (1838).
- **MEDICAGO*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. i. 225 (1737).
 **M. lupulina*, Linn. (Geront. bor. temp.)
 **M. orbicularis*, All. (Reg. Mediterr.; Abyss.)
 **M. scutellata*, All. (Reg. Mediterr.)
 **M. denticulata*, Willd. (Geront. bor. temp.)
 **M. apiculata*, Willd. (Geront. bor. temp.)
 **M. luciniata*, All. (Reg. Mediterr.)
 **M. cchinus*, D.C. (Reg. Mediterr.)
 **M. arabica*, (Linn.) All. (Europ.) (*M. maculata*, Willd.)
 **M. minima*, (Linn.) Grufb. (Europ.)
- **MELILOTUS*, (Tourn.) Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 587 (1742).
 **M. indica*, All. (Europ.; Asia.)
 **M. alba*, Desr. (Europ.; Asia.)

**TRIFOLIUM*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. i. 229 (1737).

Subg. I. *Trifolium*, Gren. et Godr.

Seet. i. *Chronosemium*, Ser.

- **T. agrarium*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
- **T. procumbens*, Linn. (Europ.; Afr. et Asia bor.)
- **T. dubium*, Sibth. (Europ.)
- **T. filiforme*, Linn. (Europ. Reg. Cauc.)

Seet. ii. *Euamoria*, Gib. et Belli.

- **T. hybridum*, Linn. (Europ. austr. Asia Min.)
- **T. repens*, Linn. (Geront. bor. temp.)
- **T. cernuum*, Brot. (Lusitan.)
- **T. glomeratum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. suffocatum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr. et Cauc.)

Seet. iii. *Galearia*, Presl.

- **T. resupinatum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.)
- **T. tomentosum*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **T. fragiferum*, Linn. (Europ.; Oriens.; Reg. Himal.)

Subg. II. *Lagopus*, Lojac.

Seet. i. *Eulagopus*, Lojac.

- **T. striatum*, Linn. (Europ. austr.; Asia Min.)
- **T. arvense*, Linn. (Europ.; As. et Afr. bor.; Oriens.)
- **T. scabrum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. Alexandrinum*, Linn. (Aegypt.; Asia Min.)
- **T. incarnatum*, Linn. (Europ. austr.)
- **T. stellatum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. pratense*, Linn. (Europ.; Asia temp.)
- **T. lappaccum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. Cherleri*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **T. angustifolium*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. maritimum*, Huds. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.)

Seet. ii. *Calycomorphum*, Presl.

- **T. subterraneum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. globosum*, Linn. (Byzant.; Asia Min.)

IV. Loteeae.

28. *LOTUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).

- **L. uliginosus*, (Linn.) Schkuhr. (Europ. Reg. Mediterr.) (*L. major*, Sm.)
 - **L. hispidus*, Desf. (Europ. et Afr. bor. oec.)
 - **L. angustissimus*, Linn. (Europ.; Oriens.; As. bor.)
- L. australis*, Andr. Bot. Rep. t. 624 (1810).

V. Galegeae.

29. *INDIGOFERA*, Linn. Hort. Cliff. 187 (1737).

- I. linifolia*, Retz. Obs. iv. 29 (1786).
- I. emeaphylla*, Linn. Mant. ii. 272 (1771).
- I. trifoliata*, Linn. Cent. Pl. ii. 29 (1759).
- I. trita*, Linn. fil. Suppl. 335 (1781).
- I. parviflora*, Heyne in Wall. Cat. 5457 (1828).
- I. viseosa*, Lam. in Encycl. Meth. iii. 247 (1789).
- I. hirsuta*, Linn. Sp. Pl. 751 (1753).
- I. monophylla*, D.C. Prodr. ii. 222 (1825).
- I. rugosa*, Benth. Fl. Austr. ii. 199 (1864).
- I. australis*, Willd. Sp. Pl. iii. 1235 (1800).
- I. Georgei*, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 261 (1904).
- I. bovipерda*, A. Morrison, in Journ. Bot. 1. 166 (1912).
- I. brevidens*, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 385 (1848).

30. *PSORALEA*, Linn. Gen. ed. ii. 358 (1742).

- P. badocana*, (Blanco) Benth. Fl. Austr. ii. 190 (1864).
- P. Martini*, F.v.M. Fragm. v. 11 (1865).
- P. Archeri*, F.v.M. Fragm. iv. 21 p.p. (1864).
- P. cuneata*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 151 (1918).
- P. balsamica*, F.v.M. in Trans. Viet. Inst. iii. 55 (1858).

- P. virens*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 151 (1918).
P. plumosa, F.v.M. Fragm. iv. 22 (1864).
P. pustulata, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. iii. 54 (1858).
P. lachnostachys, F.v.M. Fragm. iii. 105 (1863).
P. eriantha, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 131 (1848).
P. patens, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 9 (1838).
P. cinerea, Lindl. in l. c. ii. 65.
P. leucantha, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. iii. 54 (1858).
P. Testariae, F.v.M. Fragm. v. 45 (1865).
31. *PTYCHOSEMA*, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 16 (1839).
P. pusillum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 16 (1839).
P. trifoliatum, F.v.M. in Wing's South Sci. Rec. ii. 72 (1882).
32. *TEPHROSIA*, Pers. Syn. pl. ii. 328 (1807).
T. coriacea, Benth. Fl. Austr. ii. 204 (1864).
T. Forrestiana, F.v.M. Fragm. xi. 98 (1880).
T. uniovulata, F.v.M. l. c. 70.
T. flammaea, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 204 (1864).
T. conspicua, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 152 (1918).
T. leptoclada, Benth. Fl. Austr. ii. 207 (1864).
T. Stuartii, Benth. l. c. 207.
T. eriocarpa, Benth. l. c. 207.
T. phaeosperma, (F.v.M.) Benth. l. c. 208.
T. filipes, Benth. l. c. 208.
T. remotiflora, (F.v.M.) Benth. l. c. 209.
T. stipuligera, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 154 (1918).
T. macrocarpa, Benth. Fl. Austr. ii. 209 (1864).
T. purpurea, Pers. Syn. pl. ii. 330 (1807).
T. Bidwilli, Benth. Fl. Austr. ii. 210 (1864).
T. rosea, (F.v.M.) Benth. l. c. 211.
33. *SESBANIA*, Scop. Introd. 308 (1777).
S. grandiflora, Pers. Synops. pl. ii. 316 (1807).
S. aculeata, Pers. l. c. 316.
S. Ægyptiaca, Pers. l. c. 316.
34. *CLIANTHUS*, Banks et Soland. in G. Don. Syst. ii. 468 (1832).
C. speciosus, (G. Don.) Aschers et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. vi. 725 (1909),
 (*C. Dampieri*, A. Cunn.) (*Donia speciosa*).
35. *SWAINSONA*, Salisb. Parad. Lond. i. 28 (1806).
S. phacoides, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 363 (1848).
S. Burkei, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 218 (1864).
S. oligophylla, (F.v.M.) Benth. l. c. 219.
S. occidentalis, F.v.M. Fragm. iii. 46 (1862).
S. paradoxa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 5 (1904).
S. stenodonta, F.v.M. Fragm. xi. 70 (1879).
S. gracilis, Benth. Fl. Austr. ii. 220 (1864).
S. Drummondii, Benth. l. c. 220.
S. Oliveri, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 152 (1882).
S. canescens, (Benth.) F.v.M. Fragm. iii. 46 (1862).
S. Beasleyana, F.v.M. in Chem. et Drugg. Austral. 84 (1887).
S. stipularis, F.v.M. in Linnæa xxv. 393 (1852). (*S. phacifolia*, F.v.M.)
S. tenuis, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 270 (1904).
S. Kingii, F.v.M. in Trans. Proc. Roy. Soc. Viet. xxii. 53 (1887).
S. oroboides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 222 (1864).
S. unifoliolata, F.v.M. Fragm. viii. 226 (1874).
S. microphylla, A. Gray in Bot. Amer. Expl. Exped. i. 410 (1854).
S. colutioides, F.v.M. Fragm. x. 6 (1876).
S. Macullochiana, F.v.M. Fragm. vii. 25 (1869).
36. *GLYCYRRHIZA*, (Tourn.) Linn. Corr. Gen. 13 (1737).
G. acanthocarpa, (Lindl.) J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xliii.
 351 (1919).

VI. Hedysareae.


37. *ZESCHYNOMEME*, Linn. Gen. ed. i. 350 (1737).
Z. indica, Linn. Sp. Pl. 713 (1753).
38. *ZORNIA*, Gmel. Syst. 1076, 1096 (1791).
Z. diphylla, Pers. Syn. ii. 218 (1807).
39. *DESMODIUM*, Desv. Journ. Bot. i. 122. t. 5 (1813).
D. biarticulatum, (D.C.) F.v.M. Fragm. ii. 121 (1861).
D. campylocaulon, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 233 (1864).
D. neurocarpum, Benth. l. c. 234.
D. trichostachyum, Benth. l. c. 234.
D. parvifolium, D.C. Prodr. ii. 334 (1825).
40. *ALYSICARPUS*, Neck. elem. Bot. iii. 15 (1790).
A. rugosus, (Willd.) D.C. Prodr. ii. 353 (1825).
A. Checlii, Gardn. in Bull. For. Dep. xxxii. 57 (1923).
41. *UEARIA*, Desv. Journ. Bot. i. 122. t. 5. f. 19 (1813).
U. cylindracea, Benth. Fl. Austr. ii. 237 (1864).

VII. Viciae.

- **VICIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **V. sativa*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
 **V. hirsuta*, (Linn.) S. F. Gray. (Europ.; Asia et Afr. bor.)
 **V. tetrasperma*, (Linn.) Moench. (Europ.; Oriens.)
 **LATHYRUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **L. latifolius*, Linn. (Europ.)
 **L. odoratus*, Linn. (Italia.)
42. *ABRUS* Linn. Hort. Cliff. 488 (1737).
A. precatorius, Linn. Syst. ed. xii. 533 (1767).
- VIII. Phaseoleae.
43. *GLYCINE*, Linn. Gen. ed. i. 349 (1737).
G. falcata, Benth. Fl. Austr. ii. 243 (1864).
G. clandestina, Wendl. Bot. Beob. 54 (1798).
G. tabacina, (Labill.) Benth. Fl. Austr. ii. 245 (1864).
G. sericea, (F.v.M.) Benth. l. c. 245.
44. *KENNEDYA*, Vent. Jard. Malm. 104. t. 104 (1804).
K. nigricans, Lindl. Bot. Reg. t. 1715 (1835).
K. Beekxiana, F.v.M. Fragm. xi. 98 (1198) (1880).
K. prorepens, F.v.M. l. c. viii. 225 (1874).
K. prostrata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 299 (1812).
K. eximia, Lindl. in Paxt. Mag. xvi. 35 (1849).
K. microphylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 91 (1844).
K. carinata, (Benth.) Domin, New Add. Fl. West. Austr. (Prague) 41
 (1923). (*K. parviflora*, Meissn.)
K. Stirlingii, Lindl. Bot. Reg. t. 1845 (1837).
K. glabrata, (Benth.) Lindl. l. c. t. 1838 (1837).
K. macrophylla, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 252 (1864).
K. coccinea, Vent. Jard. Malm. 104. t. 105 (1804).
45. *HARDENBERGIA*, Benth. in Enum. pl. Hueg. 40 (1837).
H. Comptoniana, (Andr.) Benth. in Enum. pl. Hueg. 41 (1837).
46. *ERYTHINA*, Linn. Gen. ed. i. 216 (1737).
E. vespertilio, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 218 (1848).
47. *CANAVALIA*, D.C. Mem. Leg. ix. 375 (1825).
C. ensiformis, D.C. Prodr. ii. 404 (1825).
C. obtusifolia, D.C. l. c. 404.
48. *ATYLOSIA*, Wight et Arnott, Prodr. 257 (1834).
A. marmorata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 263 (1864).
A. lanceolata, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 156 (1918).
A. grandifolia, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 264 (1864).
A. cinerea, (F.v.M.) Benth. l. c. 264.

49. *RHYNCHOSIA*, Lour. Fl. Cochinch. 460 (1790).
R. rhomboidea, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 265 (1864).
R. acutifolia, (F.v.M.) Benth. l. c. 266.
R. rostrata, Benth. l. c. 266.
R. minima, D.C. Prodr. ii. 385 (1825).
R. australis, Benth. Fl. Austr. ii. 267 (1864).
50. *FLEMINGIA*, Roxb. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 349 (1812).
F. lineata, Roxb. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 350 (1812).
F. pauciflora, Benth, Fl. Austr. ii. 269 (1864).
51. *PHASEOLUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
P. vulgaris, Linn. Sp. Pl. 723 (1735). (? indigenous.)
52. *VIGNA*, Savi. Dissert. 6 (1824).
V. lanceolata, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 350 (1848).
-

Western



Australia.

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS

A SYSTEMATIC CENSUS OF THE PLANTS
OCCURRING IN
WESTERN AUSTRALIA.

CHARLES A. GARDNER,
Government Botanist.

MCMXXXI.

Price—£1.

NATIONAL HERBARIUM
LIBRARY

ROYAL BOTANIC GARDENS,
ST. YARRES, GARDENS, VIC.

BY AUTHORITY

FRED. WM. SIMPSON, GOVERNMENT PRINTER, PERTH.



See "Annotated Flora of Rottnest Island" by G. M. Storr
in W. Aust. Nat. 8⁵: 109-124 (Nov. 1962)

27229¹ p. 12

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS.

A Systematic Census of the Plants
occurring in Western Australia.

CHARLES A. GARDNER,
Government Botanist.

MCMXXX.

NATIONAL HERBARIUM
LIBRARY
ROYAL BOTANIC GARDENS,
STH. YARRA, S.E.1, VIC.

PREFACE.

Western Australia is to-day the only State of the Australian Commonwealth which does not possess a text book dealing with its own flora. The official standard work is still Bentham's "*Flora Australiensis*," published between 1863 and 1878. All subsequent work dealing with the plants of the country has been published either in small papers printed by various societies within Australia, or included in monographs published abroad. For many years past there has been an increasing demand for a Flora of Western Australia, or failing this a list of the species which have been described with references to the publications in which they may be found. Although Bentham's "*Flora Australiensis*" deals with about seventy-five per cent. of our indigenous species, the additions are important as representing in many cases common inland plants, and in addition the nomenclature has been much altered with the advancement of our knowledge, not to mention the changes which have been necessitated by the International Rules governing Nomenclature, so that Bentham's Flora, from the point of view of nomenclature, is now obsolete.

With the exception of a list of plants prepared by Dr. A. Morrison for the Western Australian Year Book for 1901, no sequential list of the plants indigenous to this State has hitherto been published, and it is hoped that this Census may supply a long felt want.

The arrangement of the families and genera in this work is taken from Engler's Classification as given in *Die Natürlichen Pflanzenfamilien*, the only exception being the division of the family *Leguminosac* into the three families as suggested by J. Hutchinson in his "Families of Flowering Plants" (1926). The Rules governing nomenclature have been faithfully observed, and in consequence many well-known species are given new names. The want of a good reference library has made portions of the work extremely difficult, and for the older species, specially those of Linnæus, I have been compelled to quote from more recent works concerning the name and date of the species in question.

The introduced naturalised flora has been dealt with, all the recorded species being included. These are given in italics, and instead of the name and date of the publication in which they were described, I have given the country of origin as shown in the "Index Kewensis."

It was originally intended to include geographical references, and also references to the "*Flora Australiensis*," but it was found that this would either necessitate making this work inconvenient in size, or interfering with its compactness, and thus no references to Bentham's work are given, but wherever the name of a species differs from that given in the "*Flora Australiensis*," the synonym as quoted in Bentham's work is given in italics following the original reference.

To Mr. H. G. Elliott, Assistant Plant Pathologist of the Department of Agriculture, I am indebted for assistance in tracing references, and to Mr. G. R. Meady for assistance in making the Index, and correcting proofs.

CHARLES A. GARDNER.

State Herbarium,
Department of Agriculture,
Perth, W.A.

SYSTEMA FAMILIARUM.

Secundum Engler.

EMBRYOPHYTA ZOIDIOGAMA.

PTERIDOPHYTA.

I. FILICALES.

- a. Leptosporangiatae.
 - i. *Eufilicineae*.
 - 1. Polypodiaceae.
 - 2. Parkeriaceae.
 - 3. Gleicheniaceae.
 - 4. Schizaeaceae.
 - ii. *Hydropteridineae*.
 - 5. Salviniaceae.
 - 6. Marsileaceae.
- b. Ophioglossales.
 - 7. Ophioglossaceae.

II. LYCOPODIALES.

- a. Eligulatae.
 - 1. Lycopodiaceae.
- b. Ligulatae.
 - 2. Selaginellaceae.

III. PSILOTALES.

- 1. Psilotaceae.

IV. ISOETALES.

- 1. Isoetaceae.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

GYMNOSPERMAE.

- a. Cycadales.
 - 1. Cycadaceae.

- b. Coniferae.
 - 1. Podocarpaceae.
 - 2. Cupressaceae.

ANGIOSPERMAE.


I. MONOCOTYLEDONEAE.

- a. Pandanales.
 - 1. Typhaceae.
 - 2. Pandanaceae.
- b. Heliobiae.
 - 1. Potamogetonaceae.
 - 2. Naiadaceae.
 - 3. Aponogetonaceae.
 - 4. Scheuchzeriaceae.
 - 5. Alismaceae.
 - 6. Hydrocharitaceae.
- c. Glumiflorae.
 - 1. Gramineae.
 - 2. Cyperaceae.
- d. Principes.
 - 1. Palmae.
- e. Spathiflorae.
 - 1. Araceae.
 - 2. Lemnaceae.
- f. Farinosae.
 - 1. Flagellariaceae.
 - 2. Restionaceae.
 - 3. Centrolepidaceae.
 - 4. Xyridaceae.
 - 5. Eriocaulaceae.
 - 6. Commelinaceae.
 - 7. Pontederiaceae.
 - 8. Philydraceae.
- g. Liliiflorae.
 - 1. Juncaceae.
 - 2. Liliaceae.
 - 3. Haemodoraceae.
 - 4. Amaryllidaceae.
 - 5. Taccaceae.
 - 6. Dioscoreaceae.
 - 7. Iridaceae.
- h. Microspermae.
 - 1. Burmanniaceae.
 - 2. Orchidaceae.

II. DICOTYLEDONEAE.

- A. Archichlamydeae.
 - a. Verticillatae.
 - 1. Casuarinaceae.
 - b. Urticales.
 - 1. Ulmaceae.
 - 2. Moraceae.
 - 3. Urticaceae.
 - c. Proteales.
 - 1. Proteaceae.
 - d. Santalales.
 - 1. Santalaceae.
 - 2. Opiliaceae.
 - 3. Olacaceae.
 - 4. Loranthaceae.
 - e. Polygonales.
 - 1. Polygonaceae.
 - f. Centrospermae.
 - 1. Chenopodiaceae.
 - 2. Amarantaceae.
 - 3. Nyctaginaceae.
 - 4. Phytolaccaceae.
 - 5. Aizoaceae.
 - 6. Portulacaceae.
 - 7. Caryophyllaceae.
 - g. Ranales.
 - 1. Nymphaeaceae.
 - 2. Ranunculaceae.
 - 3. Menispermaceae.
 - 4. Myristicaceae.
 - 5. Lauraceae.
 - 6. Hernandiaceae.
 - h. Rhoadales.
 - 1. Papaveraceae.
 - 2. Fumariaceae.
 - 3. Cappariidaceae.
 - 4. Cruciferae.
 - 5. Resedaceae.
 - i. Sarraceniales.
 - 1. Droseraceae.

- k. Rosales.
1. Crassulaceae.
 2. Cephalotaceae.
 3. Saxifragaceae.
 4. Pittosporaceae.
 5. Byblidaceae.
 6. Cunoniaceae.
 7. Rosaceae.
- l. Leguminales.
1. Mimosaceae.
 2. Caesalpiniaceae.
 3. Papilionaceae.
- m. Geraniales.
1. Geraniaceae.
 2. Oxalidaceae.
 3. Linaceae.
 4. Zygophyllaceae.
 5. Rutaceae.
 6. Burseraceae.
 7. Meliaceae.
 8. Tremandraceae.
 9. Polygalaceae.
 10. Euphorbiaceae.
 11. Callitrichaceae.
- n. Sapindales.
1. Anacardiaceae.
 2. Celastraceae.
 3. Stackhousiaceae.
 4. Sapindaceae.
- o. Rhamnales.
1. Rhamnaceae.
 2. Vitaceae.
- p. Malvales.
1. Tiliaceae.
 2. Malvaceae.
 3. Bombacaceae.
 4. Sterculiaceae.
- q. Parietales.
1. Dilleniaceae.
 2. Guttiferae.
 3. Elatinaceae.
 4. Frankeniaceae.
 5. Cochlospermaceae.
 6. Violaceae.
 7. Passifloraceae.
- r. Myrtiflorae.
1. Thymelaeaceae.
 2. Lythraceae.
 3. Sonneratiaceae.
 4. Lecythidaceae.
 5. Rhizophoraceae.
 6. Combretaceae.
7. Myrtaceae.
 8. Melastomaceae.
 9. Onagraceae.
 10. Halorrhagaceae.
- s. Umbelliflorae.
1. Araliaceae.
 2. Umbelliferae.
- B. *Sympetalae*.
- a. Ericales.
1. Epacridaceae.
- b. Primulales.
1. Myrsinaceae.
 2. Primulaceae.
- c. Plumbaginales.
1. Plumbaginaceae.
- d. Ebenales.
1. Sapotaceae.
 2. Ebenaceae.
- e. Contortae.
1. Oleaceae.
 2. Loganiaceae.
 3. Gentianaceae.
 4. Apocynaceae.
 5. Asclepiadaceae.
- f. Tubiflorae.
1. Convolvulaceae.
 2. Hydrophyllaceae.
 3. Boraginaceae.
 4. Verbenaceae.
 5. Labiatae.
 6. Solanaceae.
 7. Scrophulariaceae.
 8. Bignoniaceae.
 9. Pedaliaceae.
 10. Orobanchaceae.
 11. Lentibulariaceae.
 12. Acanthaceae.
 13. Myoporaceae.
- g. Plantaginales.
1. Plantaginaceae.
- h. Rubiales.
1. Rubiaceae.
- i. Cucurbitales.
1. Cucurbitaceae.
- k. Campanulatae.
1. Campanulaceae.
 2. Lobeliaceae.
 3. Goodeniaceae.
 4. Brunoniaceae.
 5. Stylidiaceae.
 6. Compositae.
-



ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS.

Auctore

C. A. GARDNER.

PTERIDOPHYTA.

FILICALES.

Polypodiaceae.

1. *DRYOPTERIS*, Adans, Fam. des. Pl. ii. 20 (1763).
D. gongyloides, (Schkuhr.) O. Kuntze Rev. Gen. ii. 81, 811 (1891) (*Aspidium unitum*, Swartz.)
2. *NEPHROLEPIS*, Schott, Jen. fl. t. 3 (1834).
N. exaltata, (Linn.) Schott. Jen. fl. t. 3 (1834).
3. *MICROLEPIA*,
M. speluncae, (Linn.) Moore, Ind. xciii. (1857) (*Davallia speluncae*, (L) Bak.)
4. *SCHIZOLOMA*, Gaud.
S. ensifolium, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 414 (1841) (*Lindsaya ensifolia*, Sw.)
5. *LINDSAYA*, (Dryand) J. Sm. Mem. Acad. Turin. v. 413 (1793).
L. linearis, Swartz. Schrad. Journ. 1800 78 (1801).
6. *ASPLENIUM*, Linn. Gen. Pl. 783 (1737).
A. flabellifolium Cav. Deser. 257 (1802).
A. praemorsum, Swartz. Prodr. 130 (1788). (*A. furcatum*, Thunb.)
A. bulbiferum, Forst. Prodr. 80 (1786).
7. *PLEUROSORUS*, Fee. Gen. Fil. 179 (1850-52).
P. rutifolius, (R.Br.) Fee. Gen. Fil. 180 (1852) (*Grammitis rutacifolia* R.Br.)
8. *BLECHNUM*, Linn. Sp. Pl. ii. 1077 (1753).
B. orientale, Linn. Sp. ed. ii. 1535 (1763).
9. *STENOCHLAENA*, J. Sm. Journ. of Bot. iii. 401 (1841).
S. palustris, (Burm.) Bedd. Fern. Br. Ind. suppl. 26 (1876). (*Acrostichum scandens*, Hook.)
10. *GYMNOPTERIS*, Bernh.
G. Reynoldsi, (F. v. M.) C. Christens, Ind. Fil. 341 (1906) (*Annogramma Reynoldsi*, F. v. M.)
11. *PITYROGRAMMA*, (Link.) Domin de la Fact. Sci. l'Univ. Charles, Prague. 83.3 (1928).
P. leptophylla, (Linn.) Domin de la Fac. Sci. Univ. Charles, Prague. 83.9 (1928).
12. *CHEILANTHES*, Swartz. Syn. Fil. 5 126 (1806).
C. Brownii, (Desv.) Domin Biblio Bot. 85 133 (1913).
C. distans, (R.Br.) Mett. Cheil. 25 n. 19 (1859).
C. tenuifolia, (Burm.) Swartz. Syn. Fil. 129. 332 (1806).
13. *ADIANTUM*, Linn. Gen. Pl. 782 (1737).
A. lunulatum, Burm. Fl. Ind. 235 (1768).
A. aethiopicum, Linn. Syst. Nat. ed. x. ii. 1329 (1759).
14. *PTERIS*, Linn. Hort. Cliff. 443 (1737).
P. longifolia, Linn. Sp. Pl. ii. 1074 (1753).
15. *PTERIDIUM*, Gled. Scop. Fl. Carn. 169 (1760).
P. aquilinum, (Linn.) Kuhn. v. Deck. Reisen. iii. 3; bot. 11 (1879). (*Pteris aquilina*).
16. *POLYPODIUM*, Linn. Gen. Pl. 784 (1753).
P. phymatodes, Linn. Mant. 306 (1771).
17. *ACROSTICHUM*, Linn. Gen. Pl. 785 (1753).
A. aureum, Linn. Sp. Pl. ii. 1069 (1753).

Parkeriaceae.

1. *CERATOPTERIS*, Brong. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).
C. thalietroides, Brongn. in Bull. Soc. Phil. 186 (1821).

Gleicheniaceae.

1. *GLEICHENIA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin. v. 419 (1793).
G. linearis, (Burm.) Clarke in Trans. Linn. Soc. ii. bot. i. 428 (1880) (*G. dichotoma*, Hook).
G. microphylla, (R.Br.) Christ, Frankr. d. Erd. 339 (1897) (*Platycolea microphylla*, R.Br.)

Schizaeaceae.

1. *SCHIZAEA*, J. Sm. in Mem. Acad. Turin v. 419 (1793).
S. fistulosa, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 103 (1806).
2. *LYGODIUM*, Swartz, Schrad. Journ. 1800. 106 (1801).
L. scandens, (Linn.) Swartz, in Schrad. Journ. 1800, 106 (1801).

Salviniaceae.

1. *AZOLLA*, Lam. Encycl. Meth. i. 343 (1783).
A. filiculoides, Lam. Encyc. Meth. i. 343, var. *rubra*, Diels.

Marsileaceae.

1. *MARSILEA*, Linn. Gen. Pl. 799 (1753).
M. Brownii, A. Braun, Monatsbr. Acad. Berol. 418 (1863) (*M. quadrifolia*, Benth.)
M. angustifolia, R.Br. Prodr. 167 (1810).
M. hirsuta, R.Br. l. c. 167.
M. Drummondii, A. Braun, in Linnaea xxv. 721 (1852).
2. *PILULARIA*, Linn. Sp. Pl. ii. 1100 (1753).
P. Novae-Hollandiae, A. Br. Monatsber Akad. Berol. 435 (1863) (*P. globifera*, Benth.).

OPHIOGLOSSALES.

Ophioglossaceae.

1. *OPHIOGLOSSUM*, Linn. Gen. Pl. 503 (1753).
O. coriaceum, A. Cunn. in Hook Comp. Bot. Mag. ii. 361 (1836) (*O. vulgatum*, Benth.).

LYCOPODIALES.

Lycopodiaceae.

1. *PHYLLOGLOSSUM*, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).
P. Drummondii, Kunze in Mohl et Schlecht. Bot. Zeit. 721 (1843).
2. *LYCOPODIUM*, (Rupp.) Linn. Gen. Pl. 503 (1753).
L. Drummondii, Spring, Monogr. Lycop. ii. 35 (1849).
L. cernuum, Linn. Sp. Pl. ed. 2. ii. 1566 (1763).

Psilotaceae.

1. *PSILOTUM*, Swartz, in Schrad. Journ. in ii. 109 (1800).
P. nudum (Linn.) Griseb. in Veget. d. Karaißen 130 (1857) (*P. triquetrum*, Sw.).

Selaginellaceae.

1. *SELAGINELLA*, Beauv. Prodr. des. Fam. de L'Aeth. 101 (1805).
S. Preissiana, Spring, Monogr. Lycop. ii. 61 (1849).
S. uliginosa, Spring. l. c. 60.
S. prouiflora, (Lam.) Baker in Journ. Bot. xiv. 156 (1885). (*S. Belangeri* Spring.).

Isoetaceae.

1. *ISOETES*, Linn. Skanska Resa 420 (1751).
I. Drummondii, A.Br. in Berol. Monatsber 593 (1863).

GYMNOSPERMAE.

CYCADALES.

Cycadaceae.

1. *CYCAS*, Linn. Hort. Cliff. 482 (1737).
C. Lane-Pooli, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 30 (1923).
C. furfuracea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 108 (1918).
C. angulata, R.Br. Prodr. 348 (1810) (*C. media*, Benth.).
C. basaltica, Gardner in Bull. For. Dept. xxxii. 31 (1923).
2. *MACROZAMIA*, Miq. Monogr. Cycad. 36 (1841).
M. Collei (Gaud.) Gardner. comb. nov. (*M. Fraseri*, Miq.)
M. Dyeri, (F.v.M.) Gardner. comb. nov. (*Encephalartos Dyeri*, F.v.M.)

Er/

CONIFERAE.

Podocarpaceae.

1. *PODOCARPUS*, L' Herit. Pers. Syn. Pl. ii. 580 (1807).
P. Drouyniana, F. v. M. Fragm. iv. 86. t. 31 (1864).

Cupressaceae.

1. *ACTINOSTROBUS*, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).
A. pyramidalis, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 644 (1845).
A. acuminatus, Parlat. Ind. Sem. Hort. Florent. 25 (1862).
2. *CALLITRIS*, Vent. Decas Gen. Nov. 10 (1808). (*Frenela*, Mirb. p. p.).
C. Roei, (Endl.) F. v. M. Census 109 (1882).
C. Drummondii, (Parlat.) F. v. M. Census 109 (1882).
C. Morrisoni, R. T. Baker in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxi. 717 (1907).
C. robusta, (R.Br.) Mirb. in Mem. Mus. Par. xiii. 74 (1825). — *C. Brownii* (Miq.)
C. verrucosa, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.
C. glauca, (R.Br.) Mirb. l. c. 74.
C. intratropica. (F. v. M.) R. T. Baker, Pines of Australia, 172 (1910).

ANGIOSPERMAE.

MONOCOTYLEDONEAE.

PANDANALES.

Typhaceae.

1. *TYPHA* (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
T. angustifolia, Linn. Sp. Pl. 971 (1753).

Pandaneaceae.

1. *PANDANUS*, (Rumph.) Linn. fil. Suppl. 64 (1781).
P. odoratissimus, Linn. fil. Suppl. 424 (1781).
P. aquaticus, F. v. M. Fragm. v. 40 (1856).

HELIOBIAE.

Potamogetonaceae.

1. *POSIDONIA*, Koenig. Ann. of Bot. ii. 95 (1805).
P. australis, Hook, fil. Fl. Tasm. ii. 43 (1865).
2. *POTAMOGETON*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
P. tricarinatus, F. v. M. et A. Benn. in Brit. Journ. Bot. xxx. 229 (1892)
(*P. natans*, Bth.).
P. javanicus, Hassk. in Verh. Natur. K. Ver. Nedrl. Ind. i. 26 (1856).
P. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vii. 171 (1878).
P. orchreatus, Raoul Ann. Soc. Nat. Ser. iii. 117 (1844). (*P. obtusifolius*,
Mert.).
P. pectinatus, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
3. *RUPPIA*, Linn. Syst. Nat. 9 (1735).
R. maritima, Linn. Sp. Pl. 127 (1753).
4. *CYMODOCEA*, Koenig. in Kon. & Sims Ann. Bot. ii. (1806).
C. angustata, Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. no. 6, 19 (1916).
C. isoctifolia, Aschers, Sitzber. Geo. Nat. Freunde Berlin 3 (1867).
C. antarctica, (Labill.) Endl. Gen. Pl. 230 (1836).
5. *DIPLANTHERA*, Thou. Gen. Nov. Madag. 3 (1806).
D. uninervis, (Forsk.) Aschers in Engl. et Prant. Naturpflanz. 37 (1897).
6. *ALTHENIA*, Petit. in Ann. Soc. Obs. i. (1829). (*Lepilaena*, J. Drumm.)
A. australis, (Drum.) Aschers. in Engl. et Prantl. Natpflanz. ii. 1. (1887).
A. Preissii, (Lehm.) Aschers et Graebn. in Engler's Pflanzenreich, Potamog.
160 (1907).

Naiadaceae.

1. *NAIAS*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753).
N. marina, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1015 (1753) (*N. major*, All.).
N. tenuifolia, R.Br. Prodr. 345 (1810).

Aponogetonaceae.

1. *APONOGETON*, Linn. fil. Suppl. Pl. 32 (1781).
A. elongatus. (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 188 (1878).

Scheuchzeriaceae.

1. *TRIGLOCHIN*, (Riv.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
T. striata, Ruiz et Pav. Fl. Peruv. iii. 72 (1802).
T. mucronata, R.Br. Prodr. 343 (1810).
T. calcitrapa, Hook. Ic. Pl. viii. t. 731 (1845).

- T. Stowardi, N. E. Brown in Kew Bull. Misc. 189 (1914).
 T. turrifera, Ewart in Viet. Nat. xxiii. 43 (1906).
 T. centrocarpa, Hook. Icon. Pl. viii. t. 728 (1845).
 T. minutissima, F. v. M. Fragm. vi. 82 (1867).
 T. trichophora, Nees et Essenschbach in Lehm. Pl. Preiss. ii. 54 (1846).
 T. Muelleri, Buchenau in Engl. Pflanzenreich iv. 15, 12 (1903).
 T. procera, R.Br. Prodr. 343 (1810).
 T. pterocarpa, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 110 (1918).

Alismaceae.

1. *ALISMA*, Linn. Gen. ed. I. 108 (1737).
A. oligococceum, F. v. M. Fragm. i. 23 (1858).
2. *DAMASONIUM*, Mill. Gard. Diet. ed. vi. (1752).
D. minor, (R.Br.) Buchenau, Ind. Crit. in Abh. Nat. Ver. Brem, ii. 20, 39 (1868). (*D. australe*, Salish.)

Hydrocharitaceae.

1. *OTTELLIA*, Pers. Syn. Plant. i. 400 (1805).
O. ovalifolia, (R.Br.) L. C. Rich, in Mem. Inst. Fr. ii. 78 (1811).
2. *MAIDENIA*, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).
M. rubra, (W. V. Fitzg.) Rendle, in Journ. Bot. liv. 313 (1916).
3. *FALLISNERIA*, (Mich.) Linn. Gen. ed. i. 300 (1737).
F. spiralis, Linn. Sp. Pl. 1015 (1753).
4. *HALOPHILA*, Thou. Gen. Nov. Madag. n. 6 (1806).
H. ovalis, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. 45 (1860).
H. spinulosa, (R.Br.) Aschers. in Nuemayer. Anleit. Wissan. Beob. 368 (1875).

GLUMIFLORAE.

Gramineae.

1. *CHIONACHNE*, R.Br. in Beauv. Pl. Jav. Rar. 15 (1838).
C. cyathopoda, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 516 (1878).
2. *DIMERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 204 (1810).
D. ornithopoda, Trin. Fund. Agrost. 167 (1820). (*D. tenera*, Trin.).
3. *IMPERATA*, Cyrillo, Pl. Rar. Ic. ii. 26. t. 11 (1792).
I. cylindrica, (Linn.) Beauv. Agrost. 165 (1812) (*I. arundinacea*, Cyrillo).
4. *POLLINIA*, Trin. in Mem. Acad. Petersb. ser. vi. ii. 304 (1833).
P. fulva, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 526 (1878).
5. *ROTTBOELLIA*, Linn. fil. Nov. Gram. Gen. in Amoen Acad x. 22 (1779)
p.p.
R. rottboellioides, (R.Br.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles. 1916, 644 (1917). (*R. ophiuroides*, Benth.)
R. compressa, Linn. f. Suppl. 114 (1781). (*Hemarthria compressa*, R.Br.)
6. *ISCHAEMUM*, Linn. Gen. ed. ii. 525 (1742).
I. nervosum (Rottb.) Gardner n. comb. (*I. larum*, R.Br.)
7. *ANDROPOGON*, Linn. Sp. Pl. ed. i. 1045 (1753).
A. intermedius, R.Br. Prodr. 202 (1810).
A. Ischaemum, Linn. Sp. Pl. 1047 (1753).
A. sericeus, R.Br. Prodr. 201 (1810).
A. affinis, R.Br. Prodr. 201 (1810).
A. annulatus, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 173 (1775).
A. procerus, R.Br. Prodr. 202 (1810).
A. exaltatus, R.Br. l. c. 202.
A. bombycinus, R.Br. l. c. 202.
A. brevifolius, Swartz. Fl. Ind. occ. i. 209 (1797) (*A. fragilis*, R.Br.).
A. axilis, Hochst. in Flora xxvii. 241 (1844).
A. Gryllus, Linn. Cent. Pl. ii. 33 (1759). (*Chrysopogon Gryllus*, Trin.)
**A. halepensis* (Linn.) Sibth. et. Sm. Reg. calid.
A. australis, Spreng. Syst. i. 287 (1825). (*Holcus plumosus*, R.Br.)
A. stipoides, (Ewart) Gardner n. comb. (*Sarga stipoides*, Ewart & White.)
A. intrans, F.v.M. Cens. Austr. Pl. 132 (1882).
8. *HETEROPOGON*, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807).
H. hirtus, Pers. Syn. Glum. ii. 533 (1807). (*H. contortus*, Roem. et Schultz.)
H. insignis, Thw. Enum, Pl. Ceyl. 437. (*Andropogon triticeus*, R.Br.)

9. *THEMEDA*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*Anthistiria*, Linn. f.)
T. triandra, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 178 (1775). (*A. imberbis*, Retz. & *A. ciliata*, Benth.)
T. avenacea, (F.v.M.) Maiden et Betcher, Cens. Pl. N.S.W. 15 (1916). (*A. avenacea*, F.v.M.)
10. *ISEILEMA*, Anderss. in Nov. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*Anthistiria*, Linn. f.)
I. membranacea, (Lindl.) Anderss. in Nov. Act. Upsal. iii. 2. 250 (1856). (*A. membranacea*, Ldl.)
11. *TRAGUS*, Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768).
T. racemosus, (Linn.) Hall. Hist. Stirp. Helv. ii. 203 (1768). (*Lappago racemosa*, Willd.)
12. *NEURACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
N. alopecuroides, R.Br. Prodr. 196 (1810).
N. Muelleri, Hack in Oest. Bot. Zeit. xlv. 329 (1895).
N. Mitchelliana, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 410 (1843).
N. multiculmis, R. Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 68 (1904).
13. *PEROTIS*, Ait. Hort. Kew ed. I. i. 85 (1789).
P. rara, R.Br. Prodr. 172 (1810). (*P. latifolia*, Ait.)
14. *ARUNDINELLA*, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. 1. (1823).
A. brasiliensis, Raddi. Agrost. Bras. 37. t. i. Fig. 3 (1823). (*A. nepalensis*, Trin.)
15. *PASPALUM*, Linn. Syst. ed. x. 855 (1759).
P. serobiculatum, Linn. Mant. i. 29 (1767).
**P. distichum*, Linn. Syst. Nat. ed. x. 855 (1759).
**P. ditatatum*, Poir (Bras.).
16. *ERIOCHLOA*, Humb. in H.B. et. K. Nov. Gen. et sp. i. 94. t. 30 & 31 (1815).
E. punctata, (Linn.) Hamilt. Prodr. Pl. Ind. oec. 5 (?).
17. *ISACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
I. australis, R.Br. Prodr. 196 (1810).
18. *DIGITARIA*, Hall. Hist. Stirp. ii. 244 (1768). (*Panicum*, Benth. p.p.)
D. etenantha, (F.v.M.) Hughes, Kew Bull. Misc. 310 (1923). (*P. etenan-
thum*, F.v.M.)
D. longiflora, (Retz.) Pers. Syn. i. 85 (1805). (*Paspalum longiflorum*, Retz.)
D. marginata, Link. Hort. Berol. i. 229 (1827). (*Panicum sanguinale*, Benth. p.p.)
D. sanguinalis (Linn.) Scop. Fl. Carn. ed. ii. i. 52 (1772). (*P. sanguinalis*, Linn. p.p.)
D. Brownii, (Roem et Schultz) Hughes, Kew Bull. Misc. 313 (1923). (*P. leucophleum*, Benth.)
D. ammophila, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. divaricatissimum*, var.)
D. coenicola, (F.v.M.) Hughes, l. c. 313. (*P. coenicolum*, F.v.M.)
19. *BRACHLARIA*, Griseb. in Ledeb. Fl. Ross. iv. 469 (1853). (*Panicum*, Benth. p.p.)
B. holsericea, (R.Br.) Hughes, in Kew Bull. Misc. 315 (1923). (*P. holsericum*, R.Br.)
B. piligera, (F.v.M.) Hughes, l. c. 315.
B. distachya (Linn.) A. Camus. Fl. Indo-China vii. 437 (1922). (*P. distachyum*, Linn.)
20. *PASPALIDIUM*, Stapf. in Prain. Fl. Trop. Afr. ix. 582 (1920). (*Panicum*, Benth. p.p.)
P. jubiflorum, (Trin.) Hughes, Kew Bull. Misc. 317 (1923). (*P. flavidum* & *P. gracile*, p.p.)
P. basi cladum, Hughes, l. c. 318.
P. gracile, (R.Br.) Hughes, l. c. 318. (*Panicum gracile*, R.Br.)
**ECHINOCHLOA*, Beauv. Agrost. 53. ii. f. 2 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
**E. colona*, (Linn.) Link. Reg. calid. (*Panicum colonum*, Linn.)
**E. Crus-Galli*, (Linn.) Beauv. Reg. calid. (*P. Crus-Galli*, Linn.)
21. *PARACTAENUM*, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
P. Novae-Hollandiae, Beauv. Agrost. 47. t. x. f. 6 (1812). (*Panicum reversum*, F.v.M.)

22. *PANICUM*, Linn. Sp. Pl. 55 (1753).
P. cymbiforme, Hughes, in Kew Bull. Misc. 323 (1923). (*P. antidotale*, Benth. p.p.)
P. capillipes, Benth. Fl. Austr. vii. 484 (1878).
P. Queenslandicum, Domin in Fedde. Repert. x. 59 (1911).
P. decompositum, R.Br. Prodr. 191 (1810).
P. effusum, R.Br. Prodr. 191 (1810).
23. *ICHNANTHUS*, Beauv. Agrost. 56. t. xii. f. 1 (1812). (*Panicum*, Benth. p.p.)
I. australiensis, (Domin) Hughes, Kew Bull. Misc. 329 (1923). (*P. australiense*, Domin.)
I. Muelleri, Hughes, l. c. 329.
24. *SACCOLEPIS*, Nash. in Britton. Man. Bot. 89 (1901). (*Panicum*, Benth. p.p.)
S. myosuroides, (R.Br.) Hughes in Kew Bull. Misc. 330 (1923). (*P. myosuroides*, R.Br.)
25. *SETARIA*, Beauv. Fl. Owar. ii. 80 (1807). (*Chectochloa*, Scribn. (1897).)
S. glauca, (Linn.) Beauv. Agrost. 51 (1812).
S. verticillata, (Linn.) Beauv. l. c. 51.
S. viridis, (Linn.) Beauv. l. c. 51.
S. Buchanani, A. S. Hitchc. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. lii. (ii.) 185 (1927).
S. Carnei, H. S. Hitchc. l. c. 185.
S. macrostachya, H.B. et K. Nov. Gen. et Sp. i. 110 (1815).
26. *CENCHRUS*, Linn. Coroll. Gen. 20 (1737).
**C. tribuloides*, Linn. Am. bor.
C. elymoides, F.v.M. Fragm. viii. 107 (1874).
27. *PSEUDOCHAETOCHELOA*, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).
P. australiensis, A. S. Hitchc. in Journ. Washgtn. Acad. Sci. xiv. 21. 492 (1924).
28. *PENNISETUM*, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).
P. villosum, R.Br. in Salt. Abyss. App. 62 (1818).
P. Basedowii, Summerhayes & Hubbard, Kew. Bull. Misc. 440 (1926).
P. cenchroides, Rich. in Pers. Syn. i. 72 (1805).
P. arnhemicum, F. v. M. Fragm. viii. 109 (1873).
29. *PLAGIOSETUM*, Benth. in Hook. Ic. Pl. xiii. 33 (1877).
P. refractum, (F.v.M.) Benth. in Hook. Ic. Pl. t. 1242 (1877).
30. *CHAMAERAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 193 (1810).
C. spinescens, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 189 (1817).
31. *XEROCHLOA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 196 (1810).
X. imberbis, R.Br. Prodr. 197 (1810).
X. barbata, R.Br. l. c. 197.
X. laniflora, (F. v. M.) Benth. Fl. Austr. vii. 502 (1878).
**STENOTAPHRUM*, Trin. Fund. Agrost. 175 (1820).
**S. dimidiatum*, (Linn.) Brongn. (Trop. et. Sub. Trop. Reg.).
32. *SPINIFEX*, Linn. Mant. ii. 163 (1771).
S. hirsutus, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 81. t. 230 (1806).
S. longifolius, R.Br. Prodr. 198 (1810).
33. *ORYZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
O. sativa, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).
**EHRHARTA*, Thunb. in Vet. Acad. Handl. Stockh. 216 t. 8 (1779).
**E. longiflora*, Sm. (Africa aust.).
**E. brevifolia*, Schrad. (Africa aust.).
**E. calycina*, Sm. (Africa aust.).
34. *MICROLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 210 (1810).
M. stipoides, (Labill) R.Br. Prodr. 210 (1810).
35. *TETRARRHENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 209 (1810).
T. laevis, R.Br. Prodr. 210 (1810).
**PHALARIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. minor*, Retz. Reg. Medit.
**P. canaricensis*, Linn. Reg. Medit.
**ANTHOXANTHUM*, Linn. Gen. ed. I. 18 (1837).
**A. odoratum*, Linn. Europ. As. bor. Afr. bor.

36. *AMPHIPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 175 (1810).
A. debilis, R.Br. Prodr. 175 (1810).
A. strictus, R.Br. l. c. 175.
A. laguroides, R.Br. l. c. 175.
A. cygnorum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 100 (1846).
A. turbinatus, R.Br. Prodr. 175 (1810).
A. restionaceus, R. Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).
37. *ARISTIDA*, Linn. Sp. Pl. I. 82 (1753).
A. hygrometrica, R.Br. Prodr. 174 (1810).
A. stipoides, R.Br. l. c. 174.
A. Browniana, Henr.
A. arenaria, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 407 (1826).
A. calycina, R.Br. Prodr. 173 (1810).
38. *STIPA*, Linn. Sp. Pl. ed. II. 78 (1753).
S. elegantissima, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 24 t. 29 (1804).
S. juncifolia, Hughes, in Kew Bull. Misc. 11 (1921).
S. eriopus, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).
S. tenuifolia, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).
S. leptophylla, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).
S. trichophylla, Benth. Fl. Austr. vii. 570 (1878).
S. falcata, Hughes, in Kew Bull. Misc. 14 (1921).
S. arachnopus, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).
S. variabilis, Hughes, in Kew Bull. Misc. 15 (1921).
S. Drummondii, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1855).
S. incurva, Hughes, in Kew Bull. Misc. 16 (1926).
S. platychaeta, Hughes, in l. c. 16.
S. scabra, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 31 (1848).
S. pycnostachya, Benth. Fl. Aust. vii. 568 (1878).
S. hemipogon, Benth. l. c. 569.
S. nobilis, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 70 (1904).
S. semibarbata, R.Br. Prodr. 174 (1810).
S. eremophila, Reader, in Vict. Nat. xvii. 154 (1901).
S. hirsuta, Hughes, in Kew Bull. Misc. 22 (1921).
S. tenuiglumis, Hughes, l. c. 22.
S. elatior, Hughes, l. c. 24.
S. puberula, Steud. Syn. Glum. i. 128 (1848).
S. crinita, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 407 (1826).
S. compressa, R.Br. Prodr. 174 (1810).
S. Mc Alpinei, Reader, in Vict. Nat. xv. 143 (1899).
**ORYZOPSIS*, Mich. Fl. Bor. Am. i. 51. t. 9 (1803).
**O. miliacea*, (Linn.) Aschers. et Schweinf. (Reg. Medit.)
39. *ECHINOPOGON*, Beauv. Agrost. 42 t. 9. f. 5 (1812).
E. ovatus, (Forst.) Beauv. Agrost. 42. t. 9. f. 5 (1812).
**PHLEUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. pratense*, Linn. (Reg. bor. temp.)
40. *ALOPECURUS*, Linn. Syst. ed. i. 8 (1735).
A. geniculatus, Linn. Sp. Pl. 60 (1753).
41. *SPOROBOLUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 169 (1810).
S. virginicus, (Linn.) Kunth. Rev. Gram. i. 68 (1832).
S. indicus, R.Br. Prodr. 170 (1810).
S. pulchellus, R.Br. l. c. 170.
S. Lindleyi, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 623 (1878).
S. actinocladus, F.v.M. Fragm. viii. 140 (1874).
42. *POLYPOGON*, Desf. Fl. Atlant. i., 66 (1798).
P. monspeliensis, Desf. Fl. Atlant. i. 66 (1798).
P. fugax, Nees in Steud. Syn. Glum. i. 184 (1855).
P. tenellus, R.Br. Prodr. 173 (1810).
**AGROSTIS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. alba*, Linn. (Europ.)
**A. venusta*, Trin. (Reg. Medit.)
43. *CALAMAGROSTIS*, Adans. Fam. ii. 31 (1763).
C. aemula, Steud. Nom. ed. ii. i. 249 (1821). (*Deyeuxia Forsteri*, Kunth.)
C. quadriseta, (Labill.) Spreng. Syst. i. 253 (1825). (*Deyeuxia cylindrica*, R.Br.)

44. *DICHELACHNE*, Endl. Prodr. Fl. Norf. 20 (1838).
D. crinita, (Linn. f.) Hook. f. Fl. New Zeal. i. 293 (1853).
D. sciurea, (R.Br.) Hook. f. l. c. 294.
 **AMMOPHILA*, Host. Gram Austr. iv. t. 41 (1809).
 **A. arenaria*, (Linn.) Link. (Europ. Amer. bor.).
45. *DIPLOPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 176 (1810).
D. setaceus, R.Br. Prodr. 176 (1810).
46. *PENTAPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 173 (1810).
P. quadrifidus, (Labill.) Baill. Hist. des pl. xii. 280 (1894). (*P. Billardiari*, R.Br.)
 **LAGURUS*, Linn. Gen. ed. i. 353 (1737).
 **L. ovatus*, Linn. (Europ.).
47. *ERIACHNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 183 (1810).
E. squarrosa, R.Br. Prodr. 183 (1810).
E. pauciflora, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 115 (1918).
E. glauca, R.Br. Prodr. 183 (1810).
E. ciliata, R.Br. l. c. 184.
E. aristidea, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).
E. festucacea, F.v.M. l. c. 205.
E. ovata, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 416 (1843).
E. meliacea, F.v.M. Fragm. v. 205 (1866).
E. nana, Pilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).
E. pallida, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 631 (1878).
E. scleranthoides, F.v.M. Fragm. viii. 233 (1874).
E. inermis, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 75 (1904).
E. obtusa, R.Br. Prodr. 184 (1810).
 **AIRA*, Linn. Fl. Lapp. 27 (1737).
 **A. caryophyllea*, Linn. (Europ. Oriens.).
 **A. minuta*, Linn. (Europ. Oriens.).
48. *DESCHAMPSIA*, Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).
D. caespitosa, (Linn.) Beauv. Agrost. 91. t. 8 (1812).
 **AVENA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **A. sativa*, Linn. (Terr. temp.)
 **A. fatua*, Linn. (Europ. Oriens. As. bor.).
 **A. barbata*, Brotero. (Reg. Mediterr. As. Min, Arab.).
HOLCUS, Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **H. lanatus*, Linn. (Europ.).
49. *AMPHIBROMUS*, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 420 (1843).
A. nervosus, (R.Br.) Hook. f. Fl. Tasm. ii. pl. cxliii. (1860).
50. *DANTHONIA*, D. C. Fl. Franc. iii. 32 (1805).
D. bipartita, F.v.M. Fragm. i. 160 (1859).
D. penicillata, (Labill.) F.v.M. Fragm. viii. 135 (1873).
 **PENTASCHISTIS*, Stapf. in Dyer Fl. Cap. vii. 480 (1899).
 **P. Thunbergii*, (Kunth.) Stapf. (Afr. aust.).
51. *PAPPOPHORUM*, Schreb. Gen. Pl. ii. 787 (1791).
P. nigricans, R.Br. Prodr. 185 (1810).
52. *TRIRAPHIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).
T. mollis, R.Br. Prodr. 185 (1810).
T. pungens, R.Br. l. c. 185.
T. bromoides, F.v.M. Fragm. viii. 108 (1874).
T. rigidissima, Pilger in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 72 (1904).
T. danthonioides, F.v.M. Fragm. viii. 125 (1874).
53. *ELYTROPHORUS*, Beauv. Agrost. 67 (1812).
E. articulatus, Beauv. Agrost. 67 (1812).
54. *TRIODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 182 (1810).
T. Mitchelli, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).
T. pungens, R.Br. Prodr. 182 (1810).
T. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. vii. 606 (1878).
T. irritans, R.Br. Prodr. 182 (1810).
T. procera, R.Br. l. c. 182.
T. microstachya, R.Br. l. c. 182.
55. *DIPLACHNE*, Beauv. Agrost. 9 (1812).
D. loliformis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 618 (1878).
D. fusca, (Linn.) Beauv. Agrost. 163 (1812).
D. parviflora, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 620 (1878).

56. *PHRAGMITES*, Trin. Fund. Agrost. 134 (1820).
P. vulgaris, (Lam.) Druce, List. Brit. Pl. 51 (1908). (*P. phragmites*
(Linn.) Karst); (*P. communis*, Trin.)
**LAMARCKIA*, Moench. Meth. 201 (1794).
**L. aurea*, (Linn.) Moench. (Reg. Mediterr.)
**CYNOSURUS*, Linn. Gen. ed. i. 13 (1737).
**C. echinatus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
**KOELERIA*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).
**K. phleoides*, Pers. (Reg. Mediterr.)
**AVELLINIA*, Parlât. Pl. Nov. 59 (1842).
**A. Michellii* (Savi.) Parlât. (Italia.)
**TRisetum*, Pers. Syn. Glum. i. 97 (1805).
**T. pumilum*, Kunth. (Af. austr.).
**BRIZA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**B. maxima*, Linn. (Reg. Mediterr.; Af. austr.)
**B. minor*, Linn. (Europ. Oriens; As. bor.)
**DACTYLIS*, Linn. Gen. ed. II. 29 (1742).
**D. glomerata*, Linn. (Europ.; As. bor.)
57. *ERAGROSTIS*, Beauv. Agrost. 70 (1812).
E. tenella, (Linn.) Roem et Schultz. Syst. Veg. ii. 576 (1817).
E. leptocarpa, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).
E. pilosa, (Linn.) Beauv. Agrost. 71 (1812).
E. trichophylla, Benth. Fl. Austr. vii. 644 (1878).
E. diandra, Steud. Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).
E. Brownii, Nees in Steud. Nomencl. Bot. i. 562 (1841).
E. speciosa, Steud. in Synops. Pl. Glum. i. 279 (1855).
E. eriopoda, Benth. Fl. Austr. vii. 648 (1878).
E. setifolia, Nees in Hook. Lond. Journ. ii. 419 (1843).
E. faleata, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 408. t. 25 (1826).
E. Dielsii, Pilger, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 76 (1904).
58. *ECTROSLA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 185 (1810).
E. Schultzii, Benth. Fl. Austr. vii. 633 (1878).
E. leporina, R.Br. Prodr. 186 (1810).
SCHISMUS, Beauv. Agrost. 73. t. 15. f. 4 (1812).
**S. calycinus*, (Linn.) Coss. et Dur. (Reg. Mediterr; Afr. austr.).
59. *POA*, Linn. Gen. Pl. 20 (1737).
P. caespitosa, Forst. Prodr. 89 (1786).
P. Maxwellii, Benth. Fl. Austr. vii. 653 (1878).
P. Drummondiana, Nees in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 418 (1842). (*P.*
nodosa, Nees.)
**P. bulbosa*, Linn. (Europ.)
**P. annua*, Linn. (Cosmop.)
60. *GLYCERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 179 (1810).
G. fluitans, (Linn.) R.Br. Prodr. 179 (1810).
G. stricta, Hook. fil. Fl. Nov. Zeal. i. 304 (1855).
G. ramigera, F.v.M. Fragm. viii. 131 (1874).
G. australasica, Steud. Syn. Glum. i. 286 (1855).
61. *FESTUCA*, Linn. Syst. ed. i. (1735).
F. scirpoidea, F.v.M. Fragm. viii. 129 (1874). (*Schedonorus scirpoideus*,
Benth.)
F. littoralis, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 22. t. 27 (1804). (*S. littoralis*, Beauv.)
**F. elatior*, Linn. (Europ.; As. bor.)
**F. Myuros*, Linn. (Europ.; Am. et As. bor.)
**F. bromoides*, Linn. (Reg. temp.)
**F. rigida*, (Linn.) Kunth. (Europ. Austr.; Afr. bor.)
62. *BROMUS*, Linn. Syst. Nat. 8 (1735).
**B. maximus*, Desf. (Europ.; Reg. Mediterr. et Cauc.)
**B. Madritensis*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
**B. unioloides*, H.B. et K. (Am. calid.)
B. arenarius, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 23. t. 28 (1804).
**B. mollis*, Linn. (Europ.; Afr. et As. bor.)
BRACHYPODIUM, Beauv. Agrost. 100 (1812).
**B. distachyum*, Roem et Schultz. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
63. *CYNODON*, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85. (1805).
C. Dactylon, Rich. in Pers. Syn. Glum. i. 85 (1805).
C. tenellus, R.Br. Prodr. 187 (1810).
C. convergens, F.v.M. Fragm. viii. 113 (1874).

64. *CHLORIS*, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Plant. 25 (1788).
C. pectinata, Benth. Fl. Austr. vii. 612 (1878).
C. divaricata, R.Br. Prodr. 186 (1810).
C. acicularis, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 33 (1848).
C. truncata, R.Br. Prodr. 186 (1810).
C. barbata, Swartz. Nov. Gen. et Sp. Pl. 25 (1788).
C. scariosa, F.v.M. Fragm. vi. 85 (1868).
C. pallida, Hack. in Engler's Botan. Jahrb. vi. 244 (1885).
65. *ASTREBLA*, (F.v.M.) Benth. Flora Australiensis, vii. 602 (1878).
A. pectinata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).
A. elymoides, Bail et F.v.M. Illustr. Queensland Grasses (1878).
A. triticoides, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vii. 602 (1878).
66. *DACTYLOCTENIUM*, Willd. Enum. Hort. Berol. 1029 (1809).
D. australiense, Scribn. (*D. aegyptium*, (L.) Willd.)
67. *ELEUSINE*, Gaertn. Fruct. i. 7 (1788).
E. racemosa, Heyne, in Roth. Nov. Sp. Pl. 80 (1817). (*E. verticillata*, Roxb.)
68. *LEPTOCLOA*, Beauv. Agrost. 71. t. 15 (1812).
L. digitata, (R.Br.) Domin, in Biblioth. Bot. lxxxv. 379 (1915). (*L. subdigitata*, Trin.)
**LOLIUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**L. temulentum*, Linn. (Europ.; As. bor.).
**L. perenne*, Linn. (Europ.; As. temp.).
**L. rigidum*, Gaud. (Europ.).
69. *LEPTURUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 207 (1810).
L. cylindricus, Trin. Fund. Agrost. 123 (1820).
70. *AGROPYRON*, Gaertn. in Nov. Comm. Petrop. xiv. I. 539 (1770), (*Agropyrum*, (Beauv.))
A. scabrum, (Labill.) Beauv. Agrost. 102 (1812).
**A. repens*, (Linn.) Beauv. (Reg. temp.).
**HORDEUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**H. murinum*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.).
**H. maritimum*, With. (Europ. Afr. bor.; Oriens.).

Cyperaceae.

1. *LIPOCARPHA*, R.Br. in Tuckey's Narrative of an Exped. to Congo 459 (1818).
L. microcephala, (R.Br.) Kunth. Enum. ii. 268 (1837).
2. *CARPHA*, Banks et Soland. in R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 230 (1810).
C. gracilipes, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 91 (1904).
3. *CYPERUS*, (Mich.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
Subgenus i. Pycreus.
C. flavescens, Linn. Sp. Pl. 46 (1753). (*Pycreus flavescens*, (Linn.) Nees.)
C. polystachyus, Rottb. descr. et Icon. pl. 39 (1773). (*P. polystachyus* (R.Br.) Beauv.)
C. Hochstetteri, Nees, in Regensb. Fl. 755 (1845). (*P. albomarginatus*, Nees.)
- Subgenus ii. Juncellus*.
C. pygmaeus, Rottb. descr. et Icon. pl. 20 (1773). (*Juncellus pygmaeus*, (Rottb.) C. B. Clarke.)
C. laevigatus, Linn. Mant. 179 (1771). (*J. laevigatus*, (Linn.) C. B. Clarke.)
- Subgenus iii. Eucyperus*.
C. trinervis, R.Br. Prodr. 213 (1810).
C. tenellus, Linn. f. Suppl. 103 (1781).
C. difformis, Linn. Amoen. Acad. iv. 302 (1759).
C. Haspan, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).
C. leucecephalus, Retz. observ. v. 11 (1788).
C. vaglaatus, R.Br. Prodr. 213 (1810).
C. Iria, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).
C. aristatus, Rottb. Deser. et Ic. Pl. 23. t. 6. f. i. (1773) (*C. squarrosus*, Benth.)
C. distans, Linn. fil. Suppl. 103 (1781).
C. subulatus, R.Br. Prodr. 217 (1810).
C. sporobolus, R.Br. l. c. 215.
C. stenostachyus, Benth. Fl. Austr. vii. 280 (1878).
C. rotundus, Linn. Sp. Pl. 45 (1753).

Subgenus iv. Mariscus.

- C. pennatus*, Lam. Illustr. Gen. i. 144 (1799). (*Mariscus albescens*, Gaud.)
C. conicus, (R.Br.) Boeckl. in Schlecht. Linnaea. xxxviii. 371 (1874). (*M. cornutus*, R.Br.)
C. alterniflorus, R.Br. Prodr. 216 (1810). (*M. alterniflorus*, C. B. Clarke.)
C. lucidus, R.Br. l. c. 218. (*M. lucidus*, C. B. Clarke.)
C. Cunninghamii, (C. B. Clarke) Gardner, n. comb. (*M. Cunninghamii*, C. B. Clarke.)
C. fulvus, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. fulvus*, C. B. Clarke.)
C. Holoschoenus, R.Br. Prodr. 215 (1810). (*M. Holoschoenus*, C. B. Clarke.)
C. carinatus, R.Br. l. c. 216. (*M. carinatus*, C. B. Clarke.)
4. *FUIRENA*, Rottb. Descr. et Icon. 70 (1773).
F. glomerata, Lam. Illustr. Gen. i. 150 (1791).
F. umbellata, Rottb. Descr. et Icon. Pl. 70. t. 19. f. 3 (1773).
5. *SCIRPUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
S. fluitans, Linn. Sp. Pl. 48 (1753).
S. cernuus, Vahl. Enum. ii. 245 (1806). (*S. riparius*, Benth.)
S. Isdellensis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 123 (1918).
S. antarcticus, Linn. Mant. ii. 181 (1771). (*S. cartilagineus*, Poir.)
S. arenarius, Benth. Fl. Austr. vii. 325 (1878).
S. multicaulis, (F.v.M.) C. B. Clarke, Kew Bull. Misc. Add. ser. vii. 25 (1908).
S. setaceus, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).
S. nodosus, Rottb. descr. et Icon. Pl. 52. t. 8 (1773).
S. supinus, Linn. Sp. Pl. 49 (1753).
S. erectus, Poir. Encycl. vi. 761.
S. articulatus, Linn. Sp. Pl. 47 (1753).
S. mucronatus, Linn. l. c. 50.
S. americanus, Pers. Syn. Pl. i. 68 (1805).
S. lacustris, Linn. Sp. Pl. 51 (1753).
S. maritimus, Linn. l. c. 51.
S. littoralis, Schrad. Fl. Germ. i. 142 (1806).
S. Kochii, Maiden et Betche, in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxxiii. 318 (1908).
6. *CROSSLANDIA*, W. V. Fitzgerald, in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).
C. setifolia, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 122 (1918).
7. *ELEOCHARIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 224 (1810).
E. compacta, R.Br. Prodr. 224 (1810).
E. atropurpurea, Kunth. Enum. ii. 151 (1837).
E. Dietrichiana, (Boeckel) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 105 (1908).
E. gracilis, R.Br. Prodr. 224 (1810).
E. acuta, R. Br. Prodr. 224 (1810).
8. *FIMBRISTYLIS*, Vahl. Enum. ii. 285 (1806).
F. tetragona, R.Br. Prodr. 226 (1810).
F. pilifera, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 118 (1918).
F. pterygosperma, R.Br. Prodr. 226 (1810).
F. pauciflora, R.Br. l. c. 225.
F. semilevis, (F.v.M.) C. B. Clarke. Kew. Bull. Misc. Add ser. viii. 24 (1908).
F. cardiocarpa, F.v.M. Fragm. i. 194 (1859).
F. denudata, R.Br. Prodr. 227 (1810).
F. caespitosa, R.Br. l. c. 228.
F. diphylla Vahl. Enum. ii. 289 (1806).
F. aestivalis, Vahl. l. c. ii. 289.
F. ferruginea, Vahl. l. c. ii. 291.
F. subaristata, Benth. Fl. Austr. vii. 314 (1878).
F. solidifolia, F.v.M. Fragm. i. 198 (1859).
F. miliacea, Vahl. Enum. ii. 287 (1806).
F. quinqueangularis, Kunth. Enum. ii. 229 (1837).
F. rara, R.Br. Prodr. 227 (1810).
F. capitata, R.Br. l. c. 228.
F. Schultzii, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 391 (1874).
F. oligocephala, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).

- F. barbata*, (Rottb.) Benth. Fl. Austr. vii. 321 (1878).
F. capillaris, (Linn.) A. Gray Man. of Bot. N.U.S. ed. 5. 567 (1867).
F. arthrostyleoides, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 121 (1918).
9. *SCHOENUS*, Linn. Corroll. Gen. 2 (1737).
S. cruentus, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 357 (1878).
S. Benthami, F.v.M. Syst. Cens. Austr. pl. 127 (1882). (*S. compressus*, Benth.)
S. lanatus, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 19. t. 20 (1806).
S. flavus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 278 (1874).
S. barbatus, Boeckl. in l. c. 277.
S. curvifolius, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 358 (1878).
S. capitatus, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 58 (1875). (*S. subbulbosus*, Benth.)
S. aphyllus, Boeckl. in Linnaea xxxviii. 279 (1874).
S. sesquispiculus, C. B. Clarke Kew Bull. Misc. Add. Ser. viii. 43 (1908).
S. Drummondii, (Steud.) Benth. Fl. Austr. vii. 359 (1878). (*S. microstachyus*, Nees).
S. nitens, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).
S. cygneus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 81 (1846).
S. unispiculatus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 365 (1878).
S. breviculmis, Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).
S. pleiostomonus, F.v.M. Fragm. ix. 52 (1875).
S. trachycarpus, F.v.M. l. c. 33.
S. nanus, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 364 (1878).
S. Rodwayanus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1903).
S. minutulus, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).
S. obtusifolius, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 281 (1874).
S. grammatophyllus, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).
S. asperocarpus, F.v.M. l. c. 29.
S. grandiflorus, (Nees) F.v.M. l. c. 30.
S. calostachyus, (R.Br.) Poir. Encyc. Meth. Suppl. ii. 251 (1811).
S. efoliatus, F.v.M. Fragm. ix. 22 (1875).
S. multiglumis, Benth. Fl. Austr. vii. 368 (1878).
S. acuminatus, R.Br. Prodr. 231 (1810).
S. falcatus, R.Br. l. c. 232.
S. laevigatus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 111 (1904).
S. caespititius, W. V. Fitzg. l. c. 110.
S. punctatus, R.Br. Prodr. 232 (1810).
S. bifidus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 282 (1874).
S. laxus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales xxviii. 111 (1904).
S. Jamsonianus, W. V. Fitzg. l. c. xxvii. 245 (1903).
S. brevifolius, R.Br. Prodr. 231 (1810).
S. pedicellatus, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 369 (1878).
S. fascicularis, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. vi. 48 (1842).
S. indutus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 372 (1878).
S. odontocarpus, F.v.M. Fragm. ix. 32 (1875).
S. sculptus, (Nees) Boeckl. in Linnaea xxxviii. 286 (1874).
S. humilis, Benth. Fl. Austr. vii. 374 (1878).
S. axillaris, (R.Br.) Poir. Encycl. Suppl. ii. 251 (1811).
S. natus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 375 (1878).
10. *GYMNOSCHOENUS*, Nees in Ann. Hist. Ser. i. vi. 47 (1841).
G. anceps, (R.Br.) C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 92 (1908).
11. *MESOMELAENA*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 88 (1846).
M. stygia, (R.Br.) Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 89 (1846).
M. Preissii, Nees in l. c. 88.
M. uncinata, (Nees) C. B. Clarke in Kew Bull. Add. ser. viii. 48 (1908).
M. tetragona, (R.Br.) F.v.M. Fragm. ix. 36 (1875).
12. *LEPIDOSPERMA*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 14 (1804).
L. gladiatum, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 15. t. 12 (1804).
L. effusum, Benth. Fl. Austr. vii. 387 (1878).
L. rupestre, Benth. l. c. 388.
L. tetraquetrum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).
L. longitudinale, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 16. t. 13 (1804).
L. exaltatum, R.Br. Prodr. 234 (1810).
L. angustatum, R.Br. l. c. 235.
P. resinatum, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 392 (1878).

- L. viscidum*, R.Br. Prodr. 234 (1810).
L. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vii. 391 (1878).
L. tuberculatum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 90 (1846).
L. Brunonianum, Nees. l. c. 92.
L. costale, Nees. l. c. 92.
L. aphyllum, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. Benthamianum, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).
L. pubisquamatum, Steud. Syn. Glum. ii. 158 (1855).
L. scabrum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 92 (1846).
L. gracile, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. tenue, Benth. Fl. Austr. vii. 397 (1878).
L. leptostachyum, Benth. l. c. 397.
L. leptophyllum, Benth. l. c. 398.
L. striatum, R.Br. Prodr. 235 (1810).
L. Exsul, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 47 (1908).
L. carphoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 400 (1878).
13. *TRICOSTULARIA*, Nees in Lehm. Pugill. viii. 50 (1844).
T. compressa, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 83 (1846).
T. Neesii, Lehm. in l. c. 83.
14. *REEDIA*, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).
R. spathacea, F.v.M. Fragm. i. 240. t. 10 (1859).
15. *CLADIUM*, P. Br. Hist. Jamaica. 114 (1756).
C. Drummondii, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 91 (1908).
C. Preissii, (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 405 (1878).
C. laxum, (Nees) Benth. l. c. 405.
C. riparium, (Nees) Benth. l. c. 405.
C. schoenoides, R.Br. Prodr. 237 (1810).
C. arthrophyllum, (Nees) F.v.M. Fragm. ix. 14 (1875).
C. glomeratum, R.Br. Prodr. 237 (1810).
C. elynanthoides, F.v.M. Fragm. ix. 31 (1875).
C. vaginale, Benth. Fl. Austr. vii. 408 (1878).
C. junceum, R.Br. Prodr. 237 (1810).
16. *RHYNCHIOSPORA*, Vahl. Enum. ii. 229 (1806).
R. affinis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 124 (1918).
R. tenuifolia, Benth. Fl. Austr. vii. 350 (1878).
17. *CYATHOCHAETE*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 86 (1846).
C. clandestina, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. vii. 351 (1878).
C. australis, (Steud.) Gardner n. comb.
C. teretifolia, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 109 (1904).
18. *TETRARIA*, P. Beauv. in Mem. Inst. Fr. (Acad. Sc. Par.) 1812 ii. 54 (1816).
T. australiensis, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 80 (1904).
19. *TETRARIOPSIS*, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. ser. viii. 45 (1908).
T. octandra, (Nees) C. B. Clarke in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 81 (1904).
20. *GAHNIA*, R et G Forst. Char. Gen. 51 (1776).
G. trifida, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 89. t. 116 (1804).
G. polyphylla, Benth. Fl. Austr. vii. 415 (1878).
G. deusta, (R.Br.) Benth. l. c. 416.
G. aristata, (F.v.M.) Benth. l. c. 416.
G. lanigera, (R.Br.) Benth. l. c. 415.
21. *CAUSTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).
C. pentandra, R.Br. Prodr. 240 (1810).
C. dioica, R. Br. l. c. 239.
C. squamellata, C. B. Clarke, Kew Bull. Add. Ser. viii. 48 (1908).
22. *ELANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 239 (1810).
E. aristata, R.Br. Prodr. 239 (1810).
E. pauciflora, R.Br. l. c. 239.
23. *CHRYSITHRIX*, Linn. Mant. ii. 165 (1771).
C. distigmatica, C. B. Clarke, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 32 (1904).
24. *CHORISANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 221 (1810).
C. enodis, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 73 (1846).
C. multiarticulata, Nees in Ann. Nat. Hist. ser. i. iv. 48.
C. cymbaria, R.Br. Prodr. 221 (1810).

25. *CAREX*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. inversa, R.Br. Prodr. 242 (1810).
C. paniculata, Linn.
C. appressa, R.Br. Prodr. 242 (1810).
C. tereticaulis, F.v.M. Fragm. viii. 256 (1874).
C. Preissii, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 94 (1846).
C. pseudocyperus, Linn. Sp. Pl. 978 (1753).
SCHOENUS Andrewsii, W. V. Fitzg. This species, if a valid *Schoenus*, is not sufficiently described to place it in the sequential list given for that genus.

PRINCIPES.

Palmae.

1. *LIVISTONA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 267 (1810).
L. Alfredi, F.v.M. in Viet. Nat. ix. 112 (1892).
L. Eastoni, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 36 (1923).
L. inermis, R.Br. Prodr. 268 (1810).

SPATHIFLORAE.

Araceae.

1. *COLOCASIA*, Schott, Meletem. i. 18 (1832).
C. antiquorum, Schott, Meletem. bot. 18 (1832).
ZANTEDESCHIA, Spreng. Syst. iii. 765. (1826). (*Richardia*, Kunth.)
**Z. aethiopica*, Spreng. l. c. (Afr. austr.). (*R. africana*, Kunth.)
2. *TYPHONIUM*, Schott, in Wien. Zeitschr. iii. 72 (1829).
T. angustilobium, F.v.M. Fragm. x. 66 (1876).

Lemnaceae.

1. *LEMNA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
L. trisulea, Linn. Sp. Pl. 970 (1753).
L. minor, Linn. l. c. 970.
L. gibba, Linn. l. c. 970.
L. disperma, Hegelm. in Engler's Botan. Jahrb. xxi. 290 (1895).

FARINOSAE.

Flagellariaceae.

1. *FLAGELLARIA*, Linn. Amoen. Acad. 396 (1747).
F. indica, Linn. Sp. Pl. 333 (1753).

Restionaceae.

1. *LYGINIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).
L. tenax, (Labill) Gardner n. comb. (*L. barbata*, R.Br.)
2. *ECDEIOCOLEA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. viii. 236 (1874).
E. monostachya, F.v.M. Fragm. viii. 236 (1874).
3. *ANARTHRIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 248 (1810).
A. scabra, R.Br. Prodr. 249 (1810).
A. laevis, R.Br. l. c. 249.
A. gracilis, R.Br. l. c. 249.
A. prolifera, R.Br. l. c. 249.
A. polyphylla, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 63 (1846).
4. *LEPYRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 247 (1810).
L. hermaphrodita, R.Br. Prodr. 248 (1810).
L. monoica, F.v.M. Fragm. viii. 76 (1873).
L. Muirii, F.v.M. l. c. 78.
L. heliocharoides, Gilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 87 (1904).
L. stricta, R.Br. Prodr. 248 (1810).
L. macra, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 60 (1846).
L. Drummondiana, Steud. Syn. Glum. ii. 248 (1855).
L. glauca, (Nees) F.v.M. Fragm. viii. 77 (1873).
L. anaectocolea, F.v.M. Fragm. viii. 78 (1873).

5. *RESTIO*, Linn. Syst. Nat. ed. 12. ii. 735 (1767).
R. megalotheca, F.v.M. Fragm. viii. 99 (1873).
R. applanatus, Spreng. Syst. i. 185 (1825).
R. confertospicatus, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).
R. sphaclatus, R.Br. Prodr. 246 (1810).
R. deformis, R.Br. l. c. 245.
R. stenostachyus, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).
R. crispatus, R.Br. Prodr. 246 (1810).
R. nitens, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 59 (1846).
R. gracilior, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 226 (1878).
R. chaunocoleus, F.v.M. Fragm. viii. 64 (1873).
R. laxus, R. Br. Prodr. 245 (1810).
R. ornatus, Steud. Syn. Glum. ii. 256 (1855).
R. leucoblephara, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
R. leptocarpoides, Benth. Fl. Austr. vii. 229 (1878).
R. amblycoleus, F.v.M. Fragm. viii. 65 (1873).
R. Dielsii, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
R. tremulus, R.Br. Prodr. 245 (1810).
6. *DIELSLIA*, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
D. cygnorum, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 88 (1904).
7. *HOPKINSIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 33 (1904).
H. calovaginata, (Gilg.) Pilger in Engler's Pflanzenfam. Nachtrage iii. zu. ii. 4. 35 (1908). (*H. scabrida*, W. V. Fitzg.)
8. *LEPTOCARPUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 250 (1810).
L. scariosus, R.Br. Prodr. 250 (1810).
L. tenax, (Labill) R. Br. Prodr. 250 (1810).
L. Brownii, Hook. f. Fl. Tasm. ii. 73. t. 136 (1860).
L. canus, Nees in Ann. Hist. ser. 1. vi. 50 (1843).
L. coangustatus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 65 (1846).
L. humilis, Gilg. in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).
L. aristatus, R.Br. Prodr. 250 (1810).
L. erianthus, Benth. Fl. Austr. vii. 235 (1878).
9. *LOXOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 249 (1810).
L. myrioclada, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 90 (1904).
L. densa (Nees) Benth. Fl. Austr. vii. 241 (1878).
L. vestita, Benth. l. c. 241.
L. virgata, Benth. l. c. 242.
L. pubescens, (R.Br.) Benth. l. c. 242.
L. fasciculata, (R.Br.) Benth. l. c. 242.
L. flexuosa, (R.Br.) Benth. l. c. 243.
L. cinerea, R.Br. Prodr. 249 (1810).
10. *HARPERIA*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 34 (1904).
H. lateriflora, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 35 (1904).
11. *LEPIDOBOLUS*, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).
L. Preissianus, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 66 (1846).
L. chaetocephalus, F.v.M. Fragm. viii. 84 (1873).
L. deserti, Gilg in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 91 (1904).
12. *CHAETANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
C. leptocarpoides, R.Br. Prodr. 251 (1810).
13. *ONYCHOSEPALUM*, Steud. Syn. Pl. Glum. ii. 249 (1855).
O. laxiflorum, Steud. Syn. Glum. ii. 249 (1855).
14. *HYPOLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
H. ramosissima, Gilg, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 89 (1904).
H. fasciculata, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 108 (1904).
H. gracillima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 239 (1878).
H. exsulca, R.Br. Prodr. 251 (1810).

Centrolepidaceae.

1. *HYDATELLA*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 93 (1904).
H. australis Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 93 (1904).
H. leptogyne, Diels, in l. c. 93.
2. *TRITHURIA*, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 137 (1860).
H. submersa, Hook. fil. Fl. Tasm. ii. 79. t. 138 (1860). (*T. occidentalis*,
 Benth.)
T. bibracteata, Stapf.
T. micranthera, Stapf.
3. *BRIZULA*, Hieron. in Bot. Zeit. xxx. 206 (1872).
B. nutans, (Hook. f.) Gardner. n. comb.
B. gracilis, (Sond.) Hieron. in Abb. Naturf. Ges. Halle xii. 92 (1873).
 (*Aphelia gracilis*, Sond.)
B. Drummondii, Hieron. l. c. 92.
B. Muelleri, Hieron. l. c. 93.
4. *APHELLIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 251 (1810).
A. cyperoides, R.Br. Prodr. 252 (1810).
5. *CENTROLEPIS*, Labill. Nov. Holl. Pl. i. 7 (1804).
C. humillima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vii. 203 (1878).
C. polygyna, (R.Br.) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle. xii. 96 (1873).
C. alepyroides, (Nees) Hieron. l. c. 96.
C. mutica, (R.Br.) Hieron. l. c. 96.
C. glabra, (F.v.M.) Hieron. l. c. 96.
C. aristata, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).
C. basiflora, Ostf. Det. Kgl. Danske Vidensk. Selskab. iii. 2. 13 (1921).
C. inconspicua, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 107 (1904).
C. Drummondii, (Nees) Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle. xii. 98
 (1873).
C. Banksii, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 44 (1817).
C. pilosa, Hieron. Centrop. in Abh. Nat. Ges. Halle 102 (1873).
C. strigosa, (R.Br.) Roem. et Schultz. Syst. Veg. i. 43 (1817).
C. exserta, (R.Br.) Roem. et Schultz. l. c. 44.

Xyridaceae.

1. *XYRIS*, Linn. Gen. Pl. ii. (1737).
X. complanata, R.Br. Prodr. 256 (1810).
X. pauciflora, Willd. Phyt. 2. t. 1 (1794).
X. lacera, R.Br. Prodr. 257 (1810).
X. flexifolia, R.Br. l. c. 256.
X. lanata, R.Br. l. c. 257.
X. laxiflora, F.v.M. Fragm. viii. 203 (1874).
X. gracillima, F.v.M. l. c. 203.

Eriocaulaceae.

1. *ERIOCAULON*, Linn. Gen. Pl. ed. 2. 35 (1742).
E. setaceum, Linn. Sp. Pl. 87 (1753).
E. quinquangulare, Linn. l. c. 87.
E. cinereum, R.Br. Prodr. 254 (1810).
E. nigricans, R.Br. l. c. 254.
E. lividum, F.v.M. Fragm. i. 92 (1858).

Commelinaceae.

1. *CYANOTIS*, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 45 (1825).
C. axillaris, D. Don. Prodr. Fl. Nep. 46 (1825).
2. *COMMELINA*, (Plum.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. ensifolia, R.Br. Prodr. 269 (1810).
C. lanceolata, R.Br. l. c. 269.
3. *ANEILEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 270 (1810).
A. gramineum, R.Br. Prodr. 270 (1810).
4. *CARTONEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 271 (1810).
C. philydroides, F.v.M. Fragm. i. 62 (1858).
C. spicatum, R.Br. Prodr. 271 (1810).
C. parviflorum, Hassk. Flora Regensb. 365 (1869).

Pontederiaceae.

1. *MONOCHORIA*, Presl. Reliq. Haenk. i. 127 (1827).
M. cynea, F.v.M. Fragm. viii. 44 (1872).

Philydraceae.

1. *PHILYDRUM*, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).
P. lanuginosum, Banks in Gaertn. Fruct. i. 62 (1788).
2. *PRITZELIA*, F.v.M. Papuan Plants. 13 (1875).
P. pygmaea, (R.Br.) F.v.M. Papuan Plants 13 (1875).

Juncaceae.

1. *JUNCUS*, Linn. Gen. Pl. ed. i. 104 (1737).
J. gracilis, R.Br. Prodr. 259 (1810).
J. planifolius, R.Br. l. c. 259.
J. caespititius, E. Mey. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 47 (1846).
J. bufonius, Linn. Sp. Pl. 328 (1753).
J. plebius, R.Br. Prodr. 259 (1810). (*J. homalocaulis*, F.v.M.)
J. effusus, Linn. Sp. Pl. ed. i. 326 (1753). (*J. communis*, E. Mey.)
J. pallidus, R.Br. Prodr. 258 (1810).
J. radula, Buchenau Krit. Verzeichn. aller Juncae. 38 (1880).
J. maritimus, Lam. Encycl. Meth. iii. 264 (1789).
J. polyanthemus, Buchenau, in Engler's Botan. Jahrb. xx. 261 (1895).
J. holoschoenus, R.Br. Prodr. 259 (1810).
2. *LUZULA*, D. C. Fl. France, iii. 158 (1805).
L. campestris, D. C. Fl. France, iii. 161 (1805).

Liliaceae.

1. *BURCHARDIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 272 (1810).
B. umbellata, R.Br. Prodr. 273 (1810).
B. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
2. *WURMBAEA*, Thunb. Nov. Gen. i. 18. t. 1 (1781). (*Anguillaria*, R.Br. p.p.)
W. tubulosa, Benth. Fl. Austr. vii. 28 (1878).
W. pygmaea (Endl.) Benth. l. c. 28.
W. dioica, (R.Br.) F.v.M. Fragm. x. 119 (1877).
3. *IPHIGENIA*, Kunth, Enum. Pl. iv. 212 (1843).
I. indica, Kunth. enum. Pl. iv. 213 (1843).
**ASPHODELUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. fistulosus*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
4. *BULBINE*, Linn. Hort. Cliff. 122 (1737).
B. semibarbata, (R.Br.) Haw. Rev. Pl. Succul. 33 (1821).
5. *THYSANOTUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 282 (1810).
T. multiflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).
T. triandrus, (Labill) R.Br. l. c. 284.
T. Bentianus, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxi. 546 (1909).
T. glaucus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 38 (1846).
T. Drummondii, Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 341 (1876).
T. pauciflorus, R.Br. Prodr. 285 (1810).
T. asper, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
T. gageoides, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 99 (1904).
T. chinensis, Benth. Fl. Hong kong. 37 (1861). (*T. chrysantherus*, F.v.M.)
T. isantherus, R.Br. Prodr. 283 (1810).
T. tenellus, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 37 (1846).
T. scaber, Endl. in l. c. 37.
T. tuberosus, R.Br. Prodr. 282 (1810).
T. thyrsoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 336 (1876).
T. Patersoni, R.Br. Prodr. 284 (1810).
T. dichotomus, (Labill) R.Br. l. c. 284.
T. arbusecula, Baker, in Journ. Linn. Soc. xv. 339 (1876).
T. anceps, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
6. *DICHOPOGON*, Kunth, Enum. Pl. iv. 622 (1843).
D. strictus, (R.Br.) J. G. Baker in Journ. Linn. Soc. xv. 319 (1876).
D. fimbriatus (R.Br.) Macbride in Contr. Gray Herb. in. s. lvi. 2 (1918).
(*D. Sieberianus*, Kunth.)

7. *ARTHROPODIUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 276 (1810).
A. capillipes, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 34 (1846).
A. Preissii, Endl. in l. c. 35.
8. *CHAMAESCILLA*, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. corymbosa, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. spiralis, (Endl.) F.v.M. l. c. 68.
9. *TRICORYNE*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).
T. clatior, R.Br. Prodr. 278 (1810).
T. humilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 36 (1846).
10. *AGROSTOCRINUM*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 95 (1866).
A. seabrum (R.Br.) Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. 1119 (1893). (*A. stypandroides*, F.v.M.)
11. *CAESIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 277 (1810).
C. vittata, R.Br. Prodr. 277 (1810).
C. parviflora, R.Br. l. c. 277.
C. rigidifolia, F.v.M. Fragm. x. 48 (1876).
12. *CORYNOTHECA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 68 (1870).
C. lateriflora, (R.Br.) F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
C. micrantha, (Lindl.) Macbride, Contr. Grey. Herb. lvi. 3 (1918). (*C. dichotoma*, F.v.M.)
C. acanthoclada, F.v.M. Fragm. vii. 68 (1870).
13. *HODGSONIOLA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. ii. 176 (1861).
H. junciformis, F.v.M. Fragm. ii. 176 (1861).
14. *STYPANDRA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 278 (1810).
S. imbricata, R.Br. Prodr. 279 (1810).
S. grandiflora, Lindl. Swan Riv. App. 57 (1839).
15. *DIANELLA*, Lam. Encycl. Mèth. ii. t. 250 (1786).
D. revoluta, R.Br. Prodr. 280 (1810).
D. coerulea, Sims. Bot. Mag. t. 505 (1799).
16. *BARTLINGIA*, F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870). (*Laxmannia*, R.Br. non Forst.)
B. grandiflora, (Lindl.) F.v.M. Cens. Austr. Pl. 118 (1882).
B. squarrosa, (Lindl.) F.v.M. l. c. 118.
B. minor, (R.Br.) F.v.M. l. c. 118.
B. ramosa, (Lindl.) F.v.M. Fragm. vii. 88 (1870).
B. sessiliflora, (Dene) F.v.M. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 116 (1877).
B. brachyphylla, F.v.M. Cens. Austr. P. 119 (1882).
B. sessilis, (Lindl.) F.v.M. l. c. 119.
17. *SOWERBAEA*, Smith. in Trans. Linn. Soc. v. 159 (1800).
S. multicaulis, E. Pritzel, in Engler's Jahrb. xxxv. 99 (1904).
S. laxiflora, Lindl. Bot. Reg. t. 10 (1841).
18. *STAWELLIA*, F.v.M. Fragm. Phyt. Austr. vii. 85 (1870).
S. dimorphantha, F.v.M. Fragm. vii. 85 (1870).
S. gymnocephala, Diels, in Engler's Jahrb. xxxv. 100 (1904).
19. *BORYA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81 t. 107 (1804).
B. nitida, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 81. t. 107 (1804).
B. subulata Gardner Bull. For. Dep. xxxii. 38 (1923).
20. *JOHNSONIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 287 (1810).
J. lupulina, R.Br. Prodr. 287 (1810).
J. pubescens, Lindl. Swan. Riv. App. 57 (1839).
J. acaulis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
21. *HENSMANIA*, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 105 (1903).
H. turbinata, (Endl.) W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1903).
22. *ARNOCRINUM*, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
A. Drummondii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 41 (1846).
A. Preissii, Lehm. in l. c. 42.
23. *DASYPOGON*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).
D. bromeliaefolius, R.Br. Prodr. 263 (1810).
D. Hookeri, Drum. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 168 (1843).

24. *ACANTHOCARPUS*, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).
A. Preissii, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 274 (1847).
A. serra, (Endl.) Ewart, Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 220 (1916).
A. fimbriata, (F.v.M.) Ewart, l. c. 220.
25. *LOMANDRA*, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 92 (1804). (*Xerotes*, R.Br.)
L. rigida, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 93. t. 120 (1804).
L. Drummondii, (F.v.M.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. Sonderi, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.
L. odora, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. multiflora, (R.Br.) J. Britt. in Bot. Cook's Voy. 95 (1905).
L. Ordii, (F.v.M.) Ewart in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. Endlicheri, (F.v.M.) Ewart, l. c. 219.
L. sericea, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. purpurea, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. Preissii, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. effusa, (Lindl.) Ewart, l. c. 219.
L. micrantha, (Endl.) Ewart, l. c. 219.
L. caespitosa, (Benth.) Ewart, l. c. 220.
L. hermaphrodita, (C. Andrews) Gardner. n. comb.
L. pauciflora, (R.Br.) Ewart, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxviii. n. s. 219 (1916).
L. glauca, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. rupestris, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. collina, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. suaveolens, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. sparteae, (Endl.) Ewart, l. c. 220.
L. leucocephala, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
L. hastilis, (R.Br.) Ewart, l. c. 220.
26. *XANTHORRHOEA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 219 (1798).
X. gracilis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).
X. reflexa, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vi. pt. i. 33 (1920).
X. brevistyla, Herbert, l. c. vii. 82 (1921).
X. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 39 (1847).
X. nana, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. vii. 83 (1921).
27. *KINGIA*, R.Br. in King's Narr. and Surv. Austr. Coasts, ii. 529 (1827).
K. australis, R.Br. in l. c. ii. 535, t. c. (1827).
28. *BAXTERIA*, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).
B. australis, R.Br. in Hook. Lond. Journ. Bot. ii. 492. t. 13-15 (1843).
29. *CALECTASIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 263 (1810).
C. cyanea, R.Br. Prodr. 264 (1810).
30. *ASPARAGUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. racemosus, Willd. Sp. Pl. ii. 152 (1799).
31. *RHIPOGONUM*, Forst. Char. Gen. 49. t. 25 (1776).
R. album, R.Br. Prodr. 293 (1810).

Haemodoraceae.

1. *HAEMODORUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. 213 (1798).
H. sparsiflorum, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).
H. spicatum, R.Br. Prodr. 300 (1810).
H. brevisepalum, Benth. Fl. Austr. vi. 420 (1873).
H. paniculatum, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
H. laxum, R.Br. Prodr. 300 (1810).
H. simplex, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
H. simulans, F.v.M. Fragm. vii. 117 (1870).
H. longifolium, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 127 (1918).
H. flaviflorum, W. V. Fitzg. in l. c. 128.
H. parviflorum, Benth. Fl. Austr. vi. 423 (1873).
2. *PHLEBOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 301 (1810).
P. ciliata, R.Br. Prodr. 301 (1810).
P. pilosissima, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 425 (1873).
P. filifolia, (F.v.M.) Benth. l. c. 425.

Amaryllidaceae.

1. *CRINUM*, Linn. Gen. Pl. 97 (1737).
C. asiaticum, Sp. Pl. 292 (1753).
2. *HYPOXIS*, Linn. Syst. ed. x. 986 (1759).
H. glabella, R.Br. Prodr. 289 (1810).
H. occidentalis, Benth. Fl. Austr. vi. 451 (1873).
H. leptantha, Benth. l. c. 451.
3. *MACROPIDIA*, Drumm. e. Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 57 (1855).
M. fuliginosa, (Hook) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 1916, 634 (1917). (*M. fumosa*, Drumm.)
4. *TRIBONANTHES*, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).
T. brachypetala, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
T. uniflora, Lindl. l. c. 44.
T. australis, Endl. Nov. Stirp. dec. i. 27 (1839).
T. variabilis, Lindl. Swan Riv. App. 44 (1839).
T. longipetala, Lindl. l. c. 44.
5. *BLANCOA*, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
B. canescens, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
6. *CONOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 300 (1810).
C. Androstenma, F.v.M. Fragm. viii. 19 (1873). (*A. junceum*, Lindl. 1839.)
C. Bealiana, F.v.M. Fragm. ix. 50 (1875).
C. filifolia, F.v.M. l. c. viii. 18 (1873).
C. spinuligera, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 438 (1873).
C. bromelioides, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. phathyrantha, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 111 (1904).
C. aculeata, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. laxiflora, Benth. Fl. Austr. vi. 439 (1873).
C. cymosa, (F.v.M.) Benth. l. c. 439.
C. Harperiana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxviii. 106 (1904).
C. serrulata, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. caricina, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
C. gladiata, Benth. Fl. Austr. vi. 434 (1873).
C. seorsiflora, F.v.M. Fragm. i. 158 (1859).
C. teretiusecula, F.v.M. l. c. viii. 18 (1872).
C. stylidioides, F.v.M. l. c. 17.
C. prolifera, Benth. Fl. Austr. vi. 436 (1873).
C. racemosa, Benth. l. c. 436.
C. candicans, Endl. Nov. Stirp. dec. 20 (1839).
C. dealbata, Lindl. Swan Riv. App. 45 (1839).
C. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. robusta, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 109 (1904).
C. bracteata, Engl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 16 (1846).
C. involuerata, Endl. l. c. 23.
C. juncea, Endl. Nov. Stirp. dec. 19 (1839).
C. vaginata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 23 (1846).
C. petrophiloides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 431 (1873).
C. setosa, Lindl. Swan Riv. App. 44 t. 6 (1839).
C. aurea, Lindl. l. c. 44.
C. melanopogon, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 18 (1846).
C. setigera, R.Br. Prodr. 300 (1810).
C. psyllium, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 1 (1846).
C. Dielsii, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. n. 11 82 (1903).
C. villosa, Benth. Fl. Austr. vi. 433 (1873).
C. Drummondii, Benth. l. c. 433.
C. breviscapa, R.Br. Prodr. 301 (1810).
7. *ANIGOZANTHOS*, Labill. Voy. i. 409, t. 22 (1798).
A. rufa, Labill. Voy. i. 411. t. 22 (1798).
A. pulcherrima, Hook. Bot. Mag. t. 4186 (1845).
A. flavida, Redoute et D.C. Lil. t. 176 (1807).
A. Preissii, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1846).
A. humilis, Lindl. Swan Riv. App. 46. t. 6b (1839). (*A. Dorricenii*, Domin.)
A. viridis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 25 (1846).
A. Mangesii, D. Don in Sweet Brit. Fl. Gard. ser. ii. t. 265 (1836).
A. bicolor, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 26 (1846). (*A. Gabrielae*, Domin.)

Taccaceae.

1. *TACCA*, Forst Char. Gen. 65 (1776).
T. pinnatifida, R. et G. Forst, Char. Gen. 65 (1776).

Dioscoreaceae.

1. *DIOSCOREA*, (Plum.) Linn. Gen. ed. i. 306 (1737).
D. hastifolia, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 33 (1846).

Iridaceae.

- **ROMULEA*, Maratti, Diss. Romul. et. Saturn. Romae. 13. t. 1 (1772).
 - **R. rosea*, (Linn.) Eckl. (Afr. austr.)
 - **R. parviflora*, (Salisb.) J. Britten. (Europ. occ.)
 - **HOMERIA*, Vent. Dec. Gen. Nov. 5 (1808).
 - **H. collina*, (Thunb.) Vent. (Afr. austr.).
 - **H. miniata*, Sweet. (Afr. austr.)
1. *PATERSONIA*, R.Br. in Bot. Mag. t. 1041 (1807).
P. occidentalis, R.Br. Prodr. 304 (1810).
P. umbrosa, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 31 (1846).
P. xanthina, F.v.M. Fragm. i. 214 (1859).
P. limbata, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).
P. juncea, Lindl. Swan River App. 58 (1839).
P. Maxwelli, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 405 (1873).
P. pygmaea, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
P. lanata, R.Br. Prodr. 303 (1810).
P. rudis, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 29 (1846).
P. macrantha, Benth. Fl. Austr. vi. 407 (1873).
P. Drummondii, (F.v.M.) Benth. l. c. 407.
P. inaequalis, Benth. l. c. 408.
P. graminea, Benth. l. c. 408.
P. babianoides, Benth. l. c. 408.
 2. *ORTHROSANTHUS*, Sweet, Fl. Austral. t. 11 (1827).
O. multiflorus, Sweet, Fl. Austr. t. 11 (1827).
O. Muelleri, Benth. Fl. Austr. vi. 411 (1873).
O. laxus, (Endl.) Benth. l. c. 411.
O. gramineus, (Endl.) Benth. l. c. 411.
O. polystachyus, Benth. l. c. 411.

MICROSPERMAE.

Burmanniaceae.

1. *BURMANNIA*, Linn. Syst. Nat. 8 (1737).
B. disticha, Linn. Sp. Pl. 287 (1753).

Orchidaceae.

II. Monandrae-Aerotonae.

a.--Aeranthae-Convolvutae.

Thelymitreae.

1. *THELYMITRA*, Forst. Char. Gen. 97 (1776).
T. ixioides, Swartz, in K. Acad. Stoeckh. Handl. 228, t. 3 (1800).
T. canaliculata, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. crinita, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).
T. fasciculata, Fitzg. Austr. Orch. ii. t. 29 (1888).
T. aristata, Lindl. Gen. et. sp. Orch. 521 (1840).
T. longifolia, Forst. Char. Gen. 98, t. 49 (1776).
T. pauciflora, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. mucida, Fitz. in Gard. Chron. ii. 497 (1882).
T. villosa, Lindl. Swan Riv. App. 49, t. 8c (1839).
T. tigrina, R.Br. Prodr. 315 (1810).
T. stellata, Lindl. Swan Riv. App. 49 (1839).
T. fusco-lutea, R.Br. Prodr. 315 (1810).
T. flexuosa, Endl. Nov. Stirp. Dec. 23 (1839).
T. antennifera, (Lindl.) Hook, f. Fl. Tasm. ii. 4, t. 101a (1860).
T. psammophila, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).
T. carnea, R.Br. Prodr. 314 (1810).
T. Macmillani, F.v.M. Fragm. v. 93 (1865).
T. variegata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. vi. 323 (1873).

2. *EPIBLEMA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 315 (1810).
E. grandiflorum R.Br. Prodr. 315 (1810).
Diurideae.
3. *DIURIS*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 122 (1798).
D. laevis Fitzg. in Gard. Chron. xvii. pt. i. 495 (1882).
D. Purdei, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. ii. 79 (1903).
D. setacea, R.Br. Prodr. 316 (1810).
D. emarginata, R.Br. l. c. 316.
D. longifolia, R.Br. l. c. 316.
D. pauciflora, R.Br. l. c. 316.
D. carinata, Lindl. Gen et Sp. Orch. 510 (1840).
4. *MICROTIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).
M. porrifolia, R.Br. Prodr. 320 (1810).
M. truncata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 326 (1920).
M. parviflora, R.Br. Prodr. 321 (1810).
M. media, R.Br. l. c. 321.
M. alba, R.Br. l. c. 321.
M. orbicularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxi. 63 (1907).
M. atrata, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
M. pulchella, R.Br. Prodr. 321 (1810).
M. gymnadenoides, Diels, in Journ. Muell. Bot. Soc. ii. 79 (1903).
5. *GOADBYELLA*, Rogers, in Trans. Roy. Soc. South Australia, li. 294 (1927).
G. gracilis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. li. 294 (1927).
6. *PRASOPHYLLUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).
P. australe R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. elatum, R.Br. l. c. 318.
P. Muelleri, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. Ser. I. ix. 19 (1906).
P. regium, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlii. 27 (1918).
P. lanceolatum, Rogers, in l. c. xlv. 325 (1920).
P. ellipticum, Rogers, in l. c. 325.
P. fimbria, Reichb. fil. Beitr. 60 (1871).
P. hians, Reichb. f. l. c. 59.
P. cyphochilum, Benth. Fl. Austr. vi. 340 (1873).
P. ovale, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
P. macrostachyum, R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. attenuatum, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 495 (1882).
P. plumaeforme, R. Fitzg. l. c. 495.
P. triangulare, R. Fitzg. l. c. 495.
P. parvifolium, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
P. gibbosum, R.Br. Prodr. 318 (1810).
P. cucullatum, Reichb. fil. Beitr. 59 (1871).
- Pterostylideae.*
7. *CALEANA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 329 (1810).
C. nigrita, Lindl. Swan Riv. App. 54 (1839).
8. *SPICULAEA*, Lindl. Swan Riv. Append. 56 (1839).
S. ciliata, Lindl. Swan Riv. App. 56 (1839).
9. *DRAKAEA*, Lindl. Bot. Reg. xxv. App. 55 (1834).
D. elastica, Lindl. Swan Riv. App. 55 (1839).
D. Fitzgeraldii, Schltr. in Fedde, Repert. Spec. Nov. xvii. 81 (1921).
D. glyptodon, Fitzg. in Gard. Chron. i. 494 (1882).
D. Jeanensis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S.A. xlv. 322. t. 13 (1920).
10. *PTEROSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 326 (1810).
P. nana, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. pyramidalis, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
P. reflexa, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. robusta, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 296 (1927).
P. constricta, O. H. Sargent, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. iv. 24 (1907).
P. recurva, Benth. Fl. Austr. vi. 360 (1873).
P. turfosa, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 5 (1846).
P. rufa, R.Br. Prodr. 327 (1810).
P. Sargentii, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 57 (1905).
P. vittata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).

Caladeniæ.

11. *ACIANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 321 (1810).
A. exsertus, R.Br. Prodr. 321 (1810)—A species stated to occur in Western Australia, but no authentic record seen by me.
12. *CYRTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 322 (1810).
C. reniformis, R.Br. Prodr. 322 (1810).
13. *CALOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 320 (1810).
C. Robertsoni, Benth. Fl. Austr. vi. 315 (1873).
14. *ERIOCHILUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).
E. scaber Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
E. tenuis, Lindl. l. c. 53.
E. dilatatus, Lindl. l. c. 53.
E. multiflorus Lindl. l. c. 53.
15. *LYPERANTHUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).
L. nigricans R.Br. Prodr. 325 (1810).
L. serratus, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 393 (1840).
L. Forrestii, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 55 (1882).
16. *LEPTOCERAS*, Lindl. Swan Riv. App. 58 (1839).
L. fimbriata, Lindl. Swan Riv. App. 53 (1839).
17. *CALADENIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 323 (1810).
C. Menziesii, R.Br. Prodr. 325 (1810).
C. Bryceana, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xxxviii. 359. t. 18 (1914).
C. discoidea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. Cairnsiana, F.v.M. Fragm. vii. 31 (1869).
C. multiclavia, Reichb. fil. Beitr. 64 (1871).
C. reticulata, R. Fitzg. Austr. Orch. II. ix. 2 (1883).
C. filamentosa, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. Dorricnii, Domin, in Journ. Linn. Soc. xli. 251 (1913).
C. tentaculata, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xii. 130 (1889).
C. Patersoni, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 324 (1810) v. Longicauda, (Lindl.) Rogers.
C. pectinata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xlv. 352 (1920).
C. lobata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).
C. dilatata, R.Br. Prodr. 325 (1810).
C. radialis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 296 (1927).
C. clavigera, A. Cunn. ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. 422 (1840).
C. plicata, R. Fitzg. in Gard. Chron. vii. i. 461 (1882).
C. cristata, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xvii. 337 (1923).
C. macrostylis, Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).
C. Drummondii, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).
C. triangularis, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 10 (1927).
C. hirta, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. lavandulacea, Rogers, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. li. 11 (1927).
C. Roei, Benth. Fl. Austr. vi. 383 (1873).
C. Douthae, O. H. Sargent, in Journ. Bot. lix. 175 (1921).
C. Barbarossae, Reichb. fil. Beitr. 64 (1871).
C. flava, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. paniculata, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 461 (1882).
C. Purdieana, C. Andrews, in Journ. Proc. Muell. Bot. Soc. i. 39 (1902).
C. unita, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 461 (1882).
C. latifolia, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. reptans, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. nana, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 7 (1846).
C. tenuis, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. i. 462 (1882).
C. carnea, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. aphylla, Benth. Fl. Austr. vi. 387 (1873).
C. saccharata, Reichb. fil. Beitr. 63 (1871).
C. deformis, R.Br. Prodr. 324 (1810).
C. sericea, Lindl. Swan Riv. App. 52 (1839).
C. gemmata, Lindl. l. c. 52. (*C. Gertrudae*, Ostf.)
C. ixioides, Lindl. l. c. 52.
18. *GLOSSODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 325 (1810).
G. Brunonis, Endl. Nov. Stirp. Dec. 16 (1839).
G. intermedia, R. Fitzg. in Gard. Chron. xvii. I. 462 (1882).
G. emarginata, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 424 (1840).

Pogoniaceae.

19. *CORYSANTHES*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 328 (1810).
C. fimbriata, R.Br. Prodr. 328 (1810).
20. *CRYPTOSTYLIS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 317 (1810).
C. ovata, R.Br. Prodr. 317 (1810).

Gastrodinaceae.

21. *GASTRODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 330 (1810).
G. sesamoides, R.Br. Prodr. 330 (1810).

Rhizanthellinae.

22. *RHIZANTHELLA*, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).
R. Gardneri, Rogers, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiv. 1. (1929).

Pleuranthae.

*Convolvutae.**Cyrtopodiinae.*

23. *EULOPHIA*, R.Br. (ex. Lindl.) in Bot. Reg. t. 686 (1823).
E. venosa, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 300 (1873).

II.—DUPLICATE.—Sympodiales.

Dendrobiinae.

24. *DENDROBIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 82 (1799).
D. dieuphum, F.v.M. Fragm. viii. 28 (1871).

Cymbidiinae.

25. *CYMBIDIUM*, Swartz, in Nov. Act. Upsal. vi. 70 (1799).
C. canaliculatum, R.Br. Prodr. 331 (1810).

DICOTYLEDONEAE.

ARCHICHLAMYDEAE.

Casuarinaceae.

1. *CASUARINA*, (Rumph.) Linn. Amoen. Acad. iv. 143 (1759).
C. Stowardi, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 193 (1920).
C. acutivalvis, F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).
C. glauca, Sieber, in Spreng. Syst. Veg. iii. 803 (1826).
C. Prinsepiana, C. Andrews, in Journ. W. Austr. Nat. Hist. Soc. i. 43 (1904).
C. lepidophloia, F.v.M. Fragm. x. 115 (1877).
C. Huegeliana, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 640 (1845). (*C. Dorrienii*,
 Domin.)
C. campestris, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 126 (1904).
C. Fraseriana, Miq. Rev. Crit. Cas. 59, t. 6d (1848).
C. Baxteriana, Miq. Rev. Cas. 37. t. 3e (1848).
C. bicuspidata, Benth. Fl. Austr. vi. 202 (1873).
C. trichodon, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 639 (1845).
C. corniculata, F.v.M. Fragm. x. 62 (1876). (*C. horrida*, Herbert; *C. spinosissima*, Gardn.)
C. decussata, Benth. Fl. Austr. vi. 200 (1873).
C. Decaisneana, F.v.M. Fragm. i. 61 (1858).
C. Helmsii, Ewart et Gordon, in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxxii, 192 (1920).
C. humilis, Otto et Dietr. Allg. Gartenz., ix. 163 (1841). (*C. leptotrema*, S.
 Moore.)
C. Drummondiana, Miq. Rev. Crit. Casuar., xxvi. t. 1d (1848).
C. microstachya, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 642 (1845).
C. thuyoides, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 641 (1845).
C. acuarina, F.v.M., in Journ. Bot. v. 212 (1868).
C. fibrosa, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 61 (1928).
C. grevilleoides, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 130 (1904).

URTICALES.

Ulmaceae.

1. *CELTIS*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. I. 337 (1737).
C. philippinensis, Blanco, Fl. Philip. ed. i. 197 (1837).
2. *TREMA*, Lour. Fl. Cochinchin. 562 (1790).
T. aspera, Blume, Mus. Bot. Ludg. Batav. ii. 58 (1851).

Moraceae.

1. *FICUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
F. nesophila, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 286 (1867).
F. eugenioides, F.v.M. Docum. Intern. Exhib. 26 (1866).
F. leucotricha, Miq. in Ann. Mus. Lugd. Bat. iii. 285 (1867).
F. puberula, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vi. 562 (1847).
F. platypoda, A. Cunn. l. c. 561.
F. coronulata, F.v.M. in Journ. Bot. Neerland. 241 (1861).
F. scabra, Forst. f. Prodr. 76 (1786).
F. orbicularis, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. vii. 426 (1848).
F. aculeata, A. Cunn. l. c. 426.
F. scobina, Benth. Fl. Austr. vi. 176 (1873).
F. hispida, Linn. fil. Suppl. 442 (1781).
F. glomerata, Willd. Sp. Pl. iv. 1148 (1806).

Urticaceae.

**URTICA*, (Thorn.) Linn. Syst. ed. I. (1753).

**U. urens*, Linn. (Cosmop.)

1. *POUZOLSIA*, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 503 (1826).
P. indica, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 503 (1826).
2. *PARIETARIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
P. debilis, Forst. fil. Prodr. 73 (1786).

PROTEALES.

Proteaceae.

I.—Persoonioideae.

1. *PERSOONIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 215 (1798).
P. hakeiformis, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
P. teretifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
P. saccata, R.Br. Prodr. Suppl. 12 (1830).
P. Saundersiana, Kipp. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
P. diadema, F.v.M. Fragm. x. 46 (1876).
P. comata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).
P. brachystylis, F.v.M. Fragm. vi. 221 (1868).
P. falcata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
P. trinervis, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
P. tortifolia, Meissn. l. c. 185.
P. angustiflora, Benth. Fl. Austr. v. 386 (1870).
P. rudis, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
P. microcarpa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 160 (1810).
P. sulcata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 185 (1852).
P. acicularis, F.v.M. Fragm. vi. 220 (1868).
P. scabrella, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
P. dillwynioides, Meissn. l. c. iv. 185 (1852).
P. striata, R.Br. Prodr. Suppl. 13 (1830).
P. quinquenervis, Hook. Ic. Pl. t. 425 (1842).
P. rufiflora, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 72 (1855).
P. scabra, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 162 (1810).
P. graminea, R.Br. l. c. 164.
P. longifolia, R.Br. l. c. 164.
P. articulata, R.Br. l. c. 164.
P. elliptica, R.Br. l. c. 164.
P. leucopogon, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 220 (1898).
P. pungens, W. V. Fitzg., Journ. Bot. l. 23 (1912).
2. *FRANKLANDIA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
F. fucifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 157 (1810).
F. triaristata, Benth. Fl. Austr. v. 377 (1870).
3. *ISOPOGON*, R.Br. ex Knight, Prot. 93 (1809).
I. latifolius, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
I. cuneatus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. linearis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
I. polycephalus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. attenuatus, R.Br. l. c. 73.
I. sphaerocephalus, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
I. uncinatus, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).

- I. buxifolius*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. axillaris, R.Br. l. c. 74.
I. tridens, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).
I. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).
I. roseus, Lindl. Bot. Reg. 37 (1842).
I. adenanthoides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
I. trilobus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810).
I. tripartitus, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
I. longifolius, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 73 (1810).
I. Drummondii, Benth. Fl. Austr. v. 344 (1870).
I. heterophyllus, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 504 (1844).
I. villosus, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
I. aleicornis, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 134 (1904).
I. teretifolius, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 71 (1810).
I. asper, R.Br. Prodr. Suppl. 8 (1830).
I. crithmifolius, F.v.M. Fragm. vi. 239 (1868).
I. formosus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 72 (1810). (*I. occidentalis*, Herbert.)
I. divergens, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).
I. scabriusculus, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).
- 4. PETROPHILA**, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 67 (1810).
P. teretifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 68 (1810).
P. longifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. media R.Br. l. c. 5.
P. acicularis R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).
P. megalostegia F.v.M. Fragm. x. 61 (1876).
P. linearis R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. anceps, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. heterophylla, Lindl. Swan Riv. App. 35 (1839).
P. biloba, R.Br. Prodr. Suppl. 7. (1830).
P. propinqua, R.Br. l. c. 7.
P. squamata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. colorata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).
P. striata, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. divaricata, R.Br. l. c. 7.
P. serruriae, R.Br. l. c. 6.
P. inconspicua, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).
P. trifida, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. carduacea, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 182 (1852).
P. Shuttleworthiana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 246 (1847).
P. macrostachya, R.Br. Prodr. Suppl. 7 (1830).
P. diversifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 70 (1810).
P. biternata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 69 (1855).
P. plumosa, Meissn. l. c. 69.
P. glabriflora, Domin. New Add. Flora W.A. 3 (1923).
P. ericifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 5 (1830).
P. scabriuscula, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 495 (1844).
P. chrysantha, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 68 (1855).
P. fastigiata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 76 (1810).
P. seminuda, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
P. circinata, Kippist, ex. Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).
P. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 496 (1844).
P. erispata, R.Br. Prodr. Suppl. 6 (1830).
P. rigida, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 69 (1810).
P. conifera, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 67 (1855).
P. semifurcata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 335 (1870).
P. incurvata, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. 1. 22 (1912).
- 5. ADENANTHOS**, Labill. Nov. Holl. Pl. sp. i. 28. t. 36 (1804).
A. Detmoldi, F.v.M. Fragm. viii. 149 (1874).
A. barbiger, Lindl. Swan Riv. App. 36 n. 182 (1839). (*A. intermedius*, Ostf.)
A. obovata, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 37 (1804).
A. euneata, Labill. l. c. 28. t. 36.
A. Cunninghamii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 513 (1845).
A. pungens, Meissn. l. c. 515.

- A. venosa*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
A. Dobsoni, F.v.M. Fragm. vi. 204 (1868).
A. Forrestii, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 230 (1882).
A. linearis, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 183 (1852).
A. sericea, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 29. t. 33 (1804).
A. cygnorum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904).
A. Meissneri, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 512 (1845).
A. filifolia, Benth. Fl. Austr. v. 355 (1810).
A. flavidiflora, F.v.M. Fragm. i. 157 (1859).
A. argyrea, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 138 (1904). (*A. intricata*, Gardner).
A. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 514 (1845).
A. apiculata, R.Br. Prodr. Suppl. 9 (1830).
6. *STIRLINGIA*, Endl. Gen. 339 (1838). (*Simsia*, R.Br. 1810.)
S. simplex, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
S. abrotonoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 517 (1845).
S. teretifolia, Meissn. in l. c. 515.
S. tenuifolia, (R.Br.) Steud. Nom. ed. II. ii. 644 (1821).
S. latifolia, (R.Br.) Steud. l. c. 644.
7. *SYNAPHAEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
S. polymorpha, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. reticulata, (Sm.) Gardner, n. comb. (*S. dilatata*, R.Br.)
S. favosa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 529 (1845).
S. acutiloba, Meissn. in l. c. 528.
S. petiolaris, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 156 (1810).
S. decorticans, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
S. pinnata, Lindl. l. c. 32.
8. *CONOSPERMUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 213 (1798).
C. capitatum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. petiolare, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. teretifolium, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. flexuosum, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. acerosum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. amoenum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 522 (1845). (*C. Dorrieni*, Domin.)
C. Croniniae, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 143 (1904).
C. nervosum, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 71 (1855).
C. diffusum, Benth. Fl. Austr. v. 367 (1870).
C. glumaceum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. ephedroides, (Kipp) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).
C. Todii, F.v.M. Fragm. x. 20 (1876).
C. polycephalum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 249 (1847).
C. leianthum, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 141 (1904).
C. Etoniae, E. Pritzel, in l. c. 141.
C. caeruleum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 154 (1810).
C. debile, (Kipp.) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 70 (1855).
C. scaposum, Benth. Fl. Austr. v. 369 (1870).
C. Huegelii, R.Br. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 58 (1839).
C. densiflorum, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
C. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 248 (1847).
C. distichum, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 155 (1810).
C. floribundum, Benth. Fl. Austr. v. 373 (1870).
C. incurvum, Lindl. Swan Riv. App. 30 (1839).
C. brachyphyllum, Lindl. l. c. 31.
C. stoekhadis, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. 208 (1838).
C. triplinervium, R.Br. Prodr. Suppl. 11 (1830).
C. bracteosum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 518 (1845).
C. crassinervium, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 184 (1852).

II.—Grevilloideae.

9. *GREVILLEA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 167 (1810).
G. pinaster, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).
G. obtusifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 187 (1852).

- G. sparsiflora*, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).
G. macrostylis, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).
G. tripartita, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. platypoda, F.v.M. Fragm. vi. 205 (1868).
G. patentiloba, F.v.M. l. c. i. 137 (1859).
G. pectinata, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. plurijuga, F.v.M. Fragm. iv. 84 (1864).
G. oncogyne, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 149 (1904).
G. nudiflora, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. stenomera, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).
G. Thelemanniana, Hueg. in Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 6 (1839).

Hebecgyne, Benth.

- G. concinna*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).
G. Pritzellii, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 150 (1904).
G. apiciloba, F.v.M. Fragm. x. 45 (1876).
G. Hookeriana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 546 (1845).
G. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 22 (1830).
G. eriobotrya, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).
G. pterosperma, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 22 (1854).
G. stenobotrya, F.v.M. Fragm. ix. 3 (1875).
G. eriostachya, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).
G. excelsior, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 151 (1904).
G. thyrsoides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 77 (1855).
G. chrysodendron, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).
G. cirsiifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. 253 (1847).
G. bipinnatifida, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. armigera, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. asparagoides, Meissn. l. c. 186.

Plagiopoda, Benth.

- G. Treueriana*, F.v.M. Fragm. ix. 123 (1875).
G. juncifolia, Hook. in Mitch. Trop. Austr. 341 (1848).
G. Wilsoni, A. Cunn. in Wils. Voy. round the World, 273 (1835).
G. erectiloba, F.v.M. Fragm. x. 44 (1876).
G. asteriscosa, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 151 (1904).
G. insignis, Kippist, ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).
G. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 537 (1845).
G. crassifolia, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 10 (1923).
G. fasciculata, R.Br. Prodr. Suppl. 20 (1830).
G. aspera, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 172 (1810).
G. brachystylis, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 538 (1845).
G. saccata, Benth. Fl. Austr. v. 450 (1870).
G. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 536 (1845). (*G. pinelioides*
 W. V. Fitzg.)
G. deflexa F.v.M. in Melb. Chem. p. 72 (1883).
G. disjuncta, F.v.M. Fragm. vi. 206 (1868).
G. Yorkrakinensis, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. ix. pt. i. 34 (1923).
G. haplantha, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 451 (1870).
G. extorris, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 221 (1898).
G. pinifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. acuaria, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 452 (1870).
G. Jamesoniana, W. V. Fitzg. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xxvii. 243 (1904).
G. aculeolata, S. Moore in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).
G. pauciflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 174 (1810).
G. cynanchioides, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).

Calothyrsus, Benth.

- G. quercifolia*, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. angulata, R.Br. l. c. 24.
G. Wickhami, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 186 (1852).
G. agrifolia, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 24 (1830).
G. Victori, Morrison, in Journ. Bot. l. 276 (1912). (*G. miniata*, W. V.
 Fitzg.)
G. Cunninghamii, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. Huegelii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 543 (1845).
G. Sarissa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 222 (1898).
G. dimidiata, F.v.M. Fragm. iii. 146 (1863).

- G. heliosperma*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 176 (1810).
G. refracta, R.Br. l. c. 176.

Cycladenia, Benth.

- G. annulifera*, F.v.M. Fragm. iv. 85 (1864).
G. leucopteris, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 76 (1855).

Cycloptera, Benth.

- G. pyramidalis*, A. Cunn. in R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830). (*G. leucadendron*, A. Cunn.)
G. simulans, A. Morrison, in Journ. Bot. l. 277 (1912).
G. Berryana, Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. xxii. 14 (1909).
G. erythroclada W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 132 (1918).
G. viscidula, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 44 (1923).
G. striata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 177 (1810).
G. mimosoides, R.Br. in l. c. 177.
G. latifolia, Gardner, in Bull. For. Dep. xxxii. 43 (1923).

Eriostylis.

- G. occidentalis*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 173 (1810).
G. acerosa, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).
G. umbellulata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 252 (1847).
G. pilulifera, (Lindl.) Gardner n. comb. (*G. oxystigma*, Meissn.)
G. uncinulata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904). (*G. lycopodina*, S. Moore.)
G. Candolleana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 541 (1845).
G. scabra, Meissn. in l. c. 541.

Lissostylis.

- G. commutata*, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).
G. stenophylla, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).
G. pinnatisecta, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 473 (1870).
G. argyrophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 75 (1855).
G. brachystachya, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).
G. Endlicheriana, Meissn. in l. c. i. 546 (1845).
G. Manglesioides, Meissn. in l. c. i. 547. (*G. Loboana*, Domin.)
G. diversifolia, Meissn. in l. c. i. 547.
G. filifolia, Meissn. in l. c. i. 547.
G. hakeoides, Meissn. in l. c. ii. 252 (1847).
G. inconspicua, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 153 (1904).
G. teretifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 255 (1847).
G. eryngioides, Benth. Fl. Austr. v. 476 (1870).
G. bracteosa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 254 (1847).
G. crithmifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
G. trachythea, F.v.M. Fragm. vi. 207 (1868).
G. brachyclada, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 30 (1905).

Conogyne.

- G. monticola*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 259 (1847).
G. Muelleri, Benth. Fl. Austr. v. 479 (1870).
G. trifida, (R.Br.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 553 (1845).
G. synapheae, R.Br. Prodr. Suppl. 23 (1830).
G. flexuosa, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 533 (1845).
G. leptobotrya, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).
G. brevicuspis, Meissn. in l. c. ii. 256.
G. intricata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. didymobotrya, (Endl.) Meissn. in l. c. iv. 186 (1852).
G. polybotrya, Meissn. in l. c. iv. 185.
G. nematophylla, F.v.M. Fragm. i. 136 (1859).
G. Purdieana, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 154 (1904).

Anadenia.

- G. paradoxa*, F.v.M. Fragm. vi. 246 (1868).
G. petrophiloides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 257 (1847).
G. tenuiflora, (Lindl.) Meissn. in l. c. i. 554 (1845).
G. pulchella, (R.Br.) Meissn. in l. c. i. 553.
G. rudis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 73 (1855).
G. cordata, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. iv. pt. i. 35 (1923).
G. Shuttleworthiana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 258 (1847).
G. integrifolia, (Endl.) Meissn. in D. C. Prodr. xiv. 385 (1856).

- G. incrassata*, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 156 (1904).
G. ceratocarpa, Diels in l. c. 157.
G. stenocarpa, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 485 (1870).

Manglesia.

- G. acrobotrya*, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. glabrata, (Lindl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 549 (1845).
G. ornithopoda, Meissn. in l. c. ii. 256 (1847).
G. paniculata, Meissn. in l. c. i. 550 (1845).
G. biternata, Meissn. in l. c. i. 549.
G. triloba, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).
G. amplexans, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 488 (1870).
G. vestita, (Endl.) Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 548 (1845).
G. tridentifera, (Endl.) Meissn. in l. c. i. 549.
G. phanerophlebia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 157 (1904).
G. erinacea, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 74 (1855).

10. *HAKKEA*, Schrader, Sert. Hannov. 27. t. 17 (1797).

Grevilleoides.

- H. chordophylla*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 23 (1857).
H. Cunninghamii, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).
H. suberea, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 223 (1898).
H. lorea, R.Br. Prodr. Suppl. 25 (1830).
H. macrocarpa, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).
H. arborescens, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).
H. Morrisoniana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 134 (1918).
H. stenophylla, A. Cunn. ex R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830)

Euhakea.

- H. cyclocarpa*, Lindl. Swan Riv. App. 36 (1839).
H. crassifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 570 (1845).
H. Brooksiana, F.v.M. in Austr. Journ. Pharm. i. 430 (1886).
H. pandanicarpa, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. Roei, Benth. Fl. Austr. v. 499 (1870).
H. adnata, R.Br. Prodr. Suppl. 26 (1830).
H. obliqua, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).
H. polyanthema, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 161 (1904).
H. Hookeriana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).
H. inerassata, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. flabellifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).
H. Brownii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 569 (1845).
H. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. ceratophylla, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. lasiantha, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. eriantha, R.Br. l. c. 29
H. megalosperma, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 177 (1855).
H. clavata, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 31. t. 41 (1804).
H. orthorrhyncha, F.v.M. Fragm. v. 214 (1868).
H. Candolleana, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 262 (1847).
H. trifurcata, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).
H. erinacea, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 559 (1845).
H. platysperma, Hook. Ic. Plant. t. 433 (1842).
H. brachyptera, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).
H. Kippistiana, Meissn. in l. c. vii. 115 (1855).
H. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. amplexicaulis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. Pritzelli, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 163 (1904).
H. prostrata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810). (*H. glabella*, R.Br.)
H. auriculata, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 116 (1855).
H. cristata, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. linearis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 183 (1810).
H. stenocarpoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 511 (1870).
H. ruseifolia, Labill. Nov. Holl. Pl. Sp. i. 30. t. 39 (1804).
H. verrucosa, F.v.M. Fragm. v. 25 (1865).
H. rhombalis, F.v.M. l. c. x. 90 (1876).
H. purpurea, Hook. in Mitch. Trop. Austr. 348 (1848).
H. arida, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 162 (1904).

- H. recurva*, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 207 (1852).
H. circumalata, Meissn. in l. c. vii. 114 (1855).
H. commutata, F.v.M. Fragm. v. 26 (1865).
H. strumosa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 208 (1852).

Conogynoides.

- H. multilineata*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 261 (1847).
H. laurina, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830). (*H. cucalyptoides*, Meissn.)
H. obtusa, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).
H. cinerea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 186 (1810).
H. corymbosa, R.Br. Prodr. Suppl. 28 (1830).
H. undulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. petiolaris, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. neurophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).
H. loranthifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 574 (1845).
H. cucullata, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830). (*H. Victoriae*, Drumm.)
H. ferruginosa, Sweet, Fl. Austr. t. 45 (1828).
H. smilacifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 567 (1845).
H. elliptica, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 187 (1810).
H. ambigua, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 260 (1847).
H. falcata, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. pycnoneura, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 117 (1855).
H. stenocarpa, R.Br. Prodr. Suppl. 29 (1830).
H. marginata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. myrtoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 577 (1845).
H. costata, Meissn. in l. c. 575.
H. oleifolia, (Sm.) R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 185 (1810).
H. florida, R.Br. in l. c. 183.
H. varia, R.Br. in l. c. 183.
H. dolichostyla, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 166 (1904).
H. sulcata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 180 (1810).
H. Meissneriana, Kippist ex Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 114 (1855).
H. subsulcata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 555 (1845).
H. Lehmanniana, Meissn. in l. c. i. 557.

Manglesioides.

- H. nitida*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 184 (1810).
H. Oldfieldii, Benth. Fl. Austr. v. 530 (1870).
H. suaveolens, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 182 (1810).
H. lissoearpha, R.Br. in Prodr. Suppl. 27 (1830).
H. bipinnatifida, R.Br. l. c. 28.
11. *XYLOMELUM*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214 (1798).
X. occidentale, R.Br. Prodr. Suppl. 31 (1830).
X. angustifolium, Kippist in Hook. Kew Journ. iv. 209 (1852).
12. *LAMBERTIA*, Smith, in Trans. Linn. Soc. iv. 214. t. 20 (1798).
L. uniflora, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).
L. rariflora, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 263 (1847).
L. inermis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 188 (1810).
L. ericifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 30 (1830).
L. multiflora, Lindl. Swan Riv. App. 32 (1839).
L. echinata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 189 (1810).
L. ilicifolia, Hook. Ic. Plant. t. 553 (1843).
13. *STENOCARPUS*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 201 (1810).
S. salignus, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).
S. Cunninghamii, R. Br. Prodr. Suppl. 34 (1830).
14. *BANKSIA*, Linn. fil. Suppl. 15 et 126 (1781).
Oncostylis.
B. pulchella, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 202 (1810).
B. Meissneri, Lehm. in Lehm. Pl. Preiss. i. 582 (1845).
B. nutans, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).
B. violacea, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 62 (1927).
B. sphaerocarpa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 203 (1810).
B. tricuspis, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 118 (1855).
B. occidentalis, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 204 (1810).
B. littoralis, R.Br. in l. c. 204.

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE OCCIDENTALIS

Auctore

CHARLES A. GARDNER.

PART II.

(Proteaceae - Papilionaceæ)

Published June 1930.

- B. verticillata, R.Br. in l. c. 207.
 B. dryandroides, Baxter in Sweet Hort. Brit. 350 (1827).
 B. Brownii, Baxter ex R.Br. Prodr. Suppl. 37 (1830).

Cyrtostylis.

- B. attenuata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 209 (1810).
 B. Elderiana, F.v.M. et Tate, Bot. Centralbl. lv. 317 (1893).
 B. media, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).
 B. audax, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927)
 B. Solandri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. Goodii, R.Br. l. c. 36.
 B. petiolaris, F.v.M. Fragm. iv. 109 (1864).
 B. repens, Labill. Voy. i. 412. t. 23 (1798).
 B. prostrata, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. grandis, Willd. Sp. Pl. i. 535 (1797).
 B. quercifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).
 B. Baueri, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).

Eubanksia.

- B. dentata, Linn. fil. Suppl. 127 (1781).

Orthostylis.

- B. coccinea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 207 (1810).
 B. spectrum, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).
 B. Menziesii, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. laevigata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 B. Hookeriana, Meissn. in l. c. vii. 119 (1855).
 B. prionotes, Lindl. Swan Riv. App. 34 (1839).
 B. Victoriae, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 119 (1855).
 B. speciosa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 210 (1810).
 B. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 36 (1830).
 B. praemorsa, Andrews, in Bot. Rep. t. 258 (1802). (*B. marccscens*, R.Br.)
 B. Lemanniana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 B. Caleyi, R.Br. Prodr. Suppl. 35 (1830).
 B. Lindleyana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 120 (1855).
 B. elegans, Meissn. in l. c. 119.
 B. Candolleana, Meissn. in l. c. 118.

Isostylis.

- B. ilicifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211 (1810).

15. *DRYANDRA*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 211. t. 3 (1810).
 D. quercifolia, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
 D. praemorsa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 265 (1847).
 D. cuneata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).
 D. falcata, R.Br. in l. c. 213. (*D. Dorrienii*, Domin.)
 D. armata, R.Br. in l. c. 213.
 D. longifolia, R.Br. l. c. 215.
 D. Fraseri, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
 D. floribunda, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 212 (1810).
 D. carduacea, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
 D. carlinoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 267 (1847).
 D. polyccephala, Benth. Fl. Austr. v. 570 (1870).
 D. Kippistiana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 122 (1855).
 D. squarrosa, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
 D. serra, R.Br. l. c. 38.
 D. concinna, R.Br. l. c. 38.
 D. foliolata, R.Br. l. c. 38.
 D. stuppeosa, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
 D. nobilis, Lindl. l. c. 33.
 D. mucronulata, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 213 (1810).
 D. formosa, R.Br. l. c. 213. t. 3.
 D. Baxteri, R.Br. Prodr. Suppl. 38 (1830).
 D. nivea, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
 D. aretotidis, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
 D. nana, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).
 D. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 599 (1845).
 D. sclerophylla, Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 123 (1855).
 D. pulchella, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).

- D. plumosa*, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
D. seneciifolia, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830).
D. erythrocephala, Gardner, in Journ. Roy. Soc. W. Austr. xiii. 63 (1927).
D. vestita, (Kippist) Meissn. in Hook. Kew Journ. vii. 121 (1855).
D. cirsioides, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. Purdieana, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 174 (1904).
D. Gilbertii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 211 (1920).
D. Hewardiana, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
D. patens, Benth. Fl. Austr. v. 578 (1870).
D. conferta, Benth. l. c. 578.
D. horrida, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 211 (1852).
D. serratuloides, Meissn. in l. c. vii. 123 (1855).
D. comosa, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. Shuttleworthiana, Meissn. l. c. vii. 122 (1855).
D. speciosa, Meissn. in l. c. iv. 211 (1852).
D. tridentata, Meissn. in l. c. vii. 120 (1855).
D. tenuifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).
D. proteoides, Lindl. Swan Riv. App. 33 (1839).
D. runcinata, Meissn. in Hook. Kew Journ. iv. 210 (1852).
D. obtusa, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 214 (1810).
D. bipinnatifida, R.Br. Prodr. Suppl. 39 (1830). → *Mb. Lesueur.*
D. pteridifolia, R.Br. in Trans. Linn. Soc. x. 215 (1810).
D. calophylla, R.Br. Prodr. Suppl. 40 (1830).

SANTALALES.

Santalaceae.

1. *ANTHOBOLUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 357 (1810).
A. foveolatus, F.v.M. Fragm. i. 212 (1859).
A. exocarpoides, F.v.M. Fragm. ix. 3 (1875).
2. *EXOCARPUS*, Labill. Voy. i. 155 t. 14 (1798).
E. latifolia, R.Br. Prodr. 356 (1810).
E. odorata (Miq.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 689 (1857).
E. cupressiformis, Labill. Voy. i. 155. t. 14 (1798).
E. spartea, R.Br. Prodr. 356 (1810).
E. aphylla, R.Br. Prodr. 357 (1810).
3. *CHORETRUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 354 (1810).
C. glomeratum, R.Br. Prodr. 354 (1810).
C. pendulum, Tovey et Morris, in Proc. Roy. Soc. Vict. n.s. xxxiv. 209 (1922).
C. Pritzellii, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 177 (1904).
C. lateriflorum, R.Br. Prodr. 354 (1810).
4. *LEPTOMERIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 353 (1810).
L. spinosa, (Lehm.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 678 (1857).
L. pachyclada, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 178 (1904).
L. Preissiana, (Miq.) D.C. in D.C. Prodr. xiv. 678 (1857).
L. pauciflora, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. serobiculata, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. squarrulosa, R.Br. l. c. 354.
L. Rohlenae, Domin, Zolastni Olisk 2 Vestnika Kral. Spol. t. ii. 21 (1923).
L. Cunninghamii, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 611 (1845).
L. empetriformis, Miq. l. c. 610.
L. axillaris, R.Br. Prodr. 354 (1810).
L. laxa, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 612 (1845).
L. obovata, Miq. l. c. 613.
5. *SANTALUM*, Linn, Gen. ed. II. 165 (1742). (*Fusanus*, R.Br. p.p.;
Eucarya, (Mitch.) Sprague et Summerhayes, p.p.)
S. lanceolatum, R.Br. Prodr. 356 (1810).
S. Murrayanum, (L. T. Mitch.) Gardn. comb. nov. (*F. persicarius*, F.v.M.)
S. acuminatum, (R.Br.) D.C. Prodr. xiv. 684 (1856). (*F. acuminatus*, R.Br.)
S. spicatum, (R.Br.) D.C. l. c. 685. (*F. spicatus*, R.Br.)

Opiliaceae.

1. *OPILIA*, Roxb. Pl. Corom. ii. 31. t. 158 (1799).
O. amentacea, Roxb. Pl. Corom. ii. 31. t. 158 (1799).

Olacaceae.

1. *OLAX*, Linn. Diss. Dass. 3 (1747).
O. phyllanthi, (Labill.) R.Br. Prodr. 358 (1810).
O. Benthamiana, Miq. in Lehm. Pl. Preiss. i. 228 (1844).

Loranthaceae.

1. *NUYTSIA*, R.Br. in Journ. Geogr. Soc. i. 17 (1831).
N. floribunda, (Labill.) R.Br. in Journ. Geogr. Soc. i. 17 (1831).
2. *AMYEMA*, Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr., xli. 483, 488 (1894). (*Loranthus* p.p.)
A. gibberula, (Tate) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
L. gibberulus, Tate.
A. bifurcata, (Benth.) V. Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894).
(L. bifurcatus, Benth.)
A. ferruginiflora, (W. V. Fitzg.) Dans. Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
(L. ferruginiflorus, W. V. Fitzg.)
A. sanguinea, (F.v.M.) Danser, l. c. 298. (*L. sanguineus, F.v.M.*)
A. Miquelii, (Lehm.) V. Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894). (*L. Miqueli, Lehm.*)
A. Cyenei-Sinus, (Blakely) Dans. Bull. Jard. Bot. Buit. x. 295 (1929).
(L. Cyneus-Sinus, Blakely.)
A. miraculosa, (Miq.) Van Tiegh. Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 94 (1894).
(L. miraculosus, Miquel.)
A. Preissii, (Miq.) van Tiegh l. c. 84. (*L. Preissii, Miq.*)
A. linophylla (Fenzl.) Van Tiegh l. c. 65. (*L. linophyllus, Fenzl.*)
A. Nestor, (S. Moore) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 297 (1929). (*L. Nestor, S. Moore.*)
A. Quandang, (Lindl.) Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 507 (1894).
(L. Quandang, Lindl.)
A. Benthami, (Blakely) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 294 (1929).
(L. Benthami, Blakely.)
A. Fitzgeraldii, (Blakely) Dans. l. c. 295. (*L. Fitzgeraldii, Blakely.*)
A. acacioides, (A. Cunn.) Danser, l. c. 293. (*L. acacioides, (A. Cunn.) Benth.*)
3. *LYSIANA*, Van Tiegh. Bull. Soc. Bot. France, xli. 599 (1894). (*Loranthus*, Linn. p.p.)
L. Murrayi, (Tate) Van Tiegh, Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 603 (1894). (*L. Murrayi, F.M. et Tate.*)
L. linearifolia, (Hook.) Van Tiegh. l. c. 603. (*L. Mitchellianus, Blakely.*)
L. Casuarinae, (Miq.) Van Tiegh. l. c. 601. (*L. Casuarinae, Miq.*)
L. Exocarpi, (Behr.) Van Tiegh. l. c. 603. (*L. Exocarpi, Behr.*)
4. *AMYLOTHECA*, Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. France xli. 261 (1894). (*Loranthus*, p.p.)
A. triflora, (Span.) Danser, Bull. Jard. Bot. Buit. x. 302 (1929). (*L. signatus, F.v.M.*)
A. amplexans, (Van Tiegh) Dans. in. l. c. 300. (*L. amplexans, Van Tiegh.*)
A. biangulata, (W. V. Fitzg.) Danser. in l. c. 300. (*L. biangulatus, W. V. Fitzg.*)
5. *DIPLATIA*, Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. France, xli. 501 (1894). (*Loranthus*, p.p.)
D. Maidenii, (Blakely) Danser in Bull. Jard. Bot. Buit. x. 312 (1929).
(L. Maidenii, Blakely.)
D. grandibracteata, (F.v.M.) Van Tiegh., Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 502 (1894).
(L. grandibracteatus, F.v.M.)
6. *DENDROPHITHUS*, Mart., Flora, 1830, l. 109 (1830). (*Loranthus*, Linn. p.p.)
D. curvata, (Blume) Miq. Fl. Ind. Bat. l. 1. 820 (1855). (*L. vitellinus, F.v.M.*)

7. *KORTHALSELLA*, Van Tiegh., in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. 83 (1896).
 (*Viscum*, Linn. p.p.)
K. articulata, (Benth.) Blakely in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, liii. 33
 (1928). (*Viscum articulatum*, Benth.)

POLYGONALES.

Polygonaceae.

- **EMEX*, Necker, Elem. Bot. ii. 214 (1790).
 **E. australis*, Steinh. (Afr. Austr.) "Double Gee."
1. *RUMEX*, Linn. Syst. ed. I. (1733).
 **R. pulcher*, Linn. (Europ. Asia.) "Fiddle Dock."
R. Brownii, Campd. Monogr. Rum. 81 (1819).
 **R. conglomeratus*, Murray. (Cosmop.) "Clustered Dock."
 **R. crispus*, Linn. (Reg. temp.) "Curled Dock."
 **R. Acetosella*, Linn. (Reg. temp.) "Sheep Sorrel."
2. *POLYGONUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **P. aviculare*, Linn. (Cosmop.) "Wireweed," "Hogweed."
P. prostratum, R.Br. Prodr. 419 (1810).
P. serratulatum, Lag. Gen. et Sp. Nov. 14 (?). (1816) - ?
P. attenuatum, R.Br. Prodr. 429 (1810).
3. *MUEHLENBECKIA*, Meissn, Gen. 316, Comm. 227 (1843).
M. adpressa, (Labill.) Meissn. Gen. Comm. 227 (1843).
M. polybotrya, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss, i. 623 (1845).
M. Cunninghamii, (Meissn.) F.v.M. Fragm. v. 91 (1865).
M. dielina, (F.v.M.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 636 (1917).
 (*M. polygonoides*, F.v.M.)

CENTROSPERMAE.

Chenopodiaceae.

1. *RHAGODIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 408 (1810).
R. baccata, (Labill.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 50 (1849).
R. parabolica, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. dioica, Nees in Lehm. Pl. Preiss, i. 636 (1845).
R. Preissii, Moq. in. D.C. Prodr. xiii. ii. 49 (1849).
R. Gaudichaudiana, Moq. Chenop. Enum. 11 (1840).
R. spinescens, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. obovata, Moq. Chenop. Enum. 10 (1840).
R. crassifolia, R.Br. Prodr. 408 (1810).
R. coralliocarpa, S. Moore, in Journ. Bot. 168 (1897).
R. nutans, R.Br. Prodr. 408 (1810).
2. *CHENOPODIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. nitrariaceum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 158 (1870).
 **C. ambrosioides*, Linn. (Cosmop.) "Ant weed."
C. rhadinostachyum, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 98 (1880).
C. simulans, F.v.M. et Tate, in Proc. Roy. Soc. S.A. viii. 71 (1885).
C. carinatum, R.Br. Prodr. 407 (1810).
C. cristatum, F.v.M. Fragm. vii. 11 (1869).
C. auricomum, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 94 (1848).
 **C. album*, Linn. (fere Cosmop.) "Mexican Spinach."
 **C. murale*, Linn. (fere Cosmop.) "Nettle-leaved Goosefoot."
C. glaucum, Linn. Sp. Pl. 220 (1753).
3. *DYSPHANIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 411 (1810).
D. plantaginella, F.v.M. Fragm. i. 61 (1858).
D. littoralis, R.Br. Prodr. 412 (1810). (*D. myriocephala*, Benth.)
4. *ATRIPLEX*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. stipitatum, Benth. Fl. Austr. v. 168 (1870).
A. Moquinianum, Webb, in D.C. Prodr. xiii. 97 (1849).

- A. Drummondii, Moq. in D.C. Prodr. xiii. 102 (1849).
 A. isatidium, Moq. Chemop. Enum. 63 (1840).
 A. nummularium, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 64 (1848).
 A. paludosum, R.Br. Prodr. 406 (1810).
 A. angulatum, Benth, Fl. Austr. v. 174 (1870).
 A. velutinellum, F.v.M. Rep. Babb. Exped. 20 (1858).
 A. vesicarium, (Heward) Benth. Fl. Austr. v. 172 (1870).
 A. hymenothecum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 101 (1849).
 A. cinereum, Poir, Encl. suppl. i. 471 (1810).
 A. rhagodioides, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. 74 (1857).
 A. quadrivalvatum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 182 (1904).
 A. patulum, Linn. Sp. Pl. 1053 (1735).
 A. semibaccatum, R.Br. Prodr. 406 (1810).
 A. prostratum, R.Br. l. c. 406.
 A. Muelleri, Benth, Fl. Austr. v. 175 (1870).
 A. elachophyllum, F.v.M. Fragm. vii. 8 (1870).
 A. halimoides, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 282 (1838).
 A. spongiosum, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Vict. ii. 74 (1857).
5. *BASSIA*, Allioni, Mel de Phil. Soc. Roy. Turin, iii. 177. t. 4 (1766).
 B. astrocarpa, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. Muelleri, (Benth.) F.v.M. l. c. 13.
 B. eurotioides, F.v.M. Fragm. xii. 13.
 B. densiflora, W. V. Fitzg. in Muell. Bot. Soc. Perth, 31 (1904).
 B. sclerolaenoides, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. ericantha, (F.v.M.) R. H. Anderson in Proc. Linn. Soc. N.S.W. xlviii. 328 (1925).
 B. uniflora, (R.Br.) F.v.M. First Census (1882).
 B. recurviuspis, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. Perth 32 (1904).
 B. glabra, F.v.M. First Census (1882).
 B. divaricata, (R.Br.) F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882). (*B. hostilis*, Diels.)
 B. lanicuspis, F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882).
 B. Drummondii, (Benth.) F.v.M. Cens. of Austr. pl. 30 (1882).
 B. patentiuspis, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii. 338 (1923).
 B. obliquiuspis, R. H. Anderson, in l. c. 337.
 B. intricata, R. H. Anderson, in l. c. 340.
 B. Forrestiana, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
 B. bicornis, (Lindl.) F.v.M. l. c. 13.
 B. Cornishiana, F.v.M. Aust. Chem. 1885.
 B. microcarpa, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii, 348 (1923).
 B. parviflora, R. H. Anderson, in l. c. 347.
 B. convexula, R. H. Anderson, in l. c. 346.
 B. costata, R. H. Anderson, in l. c. 347.
 B. paradoxa, (R.Br.) F.v.M. Fragm. xii. 13 (1882).
 B. tridens, F.v.M. Fragm. xii. 12 (1882).
6. *MALACOCERA*, R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. New South Wales, li. 382 (1926).
 M. tricornis, (Benth.) R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S.W. li. 382 (1926). (*Bassia tricornis*, F.v.M.)
7. *KOCHIA*, Roth. in Schrad. Journ. Bot. 1800, i. 307, t. 2 (1801).
 K. lobiflora, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 184 (1870).
 K. lanosa, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 88 (1848).
 K. prosthocochata, F.v.M. Fragm. xii. 14 (1882).
 K. Atkinsiana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 31 (1904).
 K. melanocoma, F.v.M. Fragm. xii. 14 (1882).
 K. polypterygia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 183 (1904).
 K. triptera, Benth. Fl. Austr. v. 185 (1870).
 K. Ostenfeldi, Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 60 (1918).
 K. oppositifolia, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. i. 134 (1855).
 K. amoena, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 183 (1904).
 K. brevifolia, R.Br. Prodr. 409 (1810).
 K. pyramidata, Benth. Fl. Austr. v. 186 (1870).

- K. spongiocarpa*, F.v.M. in Vict. Natl. iii. 92 (1886).
K. Georgei, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 184 (1904).
K. Stowardi, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 189 (1920).
K. aphylla, R.Br. Prodr. 409 (1810).
K. villosa, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 91 (1848).
K. Murrayana, Ewart et Rees, in Proc. Roy. Soc. Vict. (n. s.) xxiii. 16 (1909).
K. planifolia, F.v.M. Fragm. i. 213 (1859).
K. sedifolia, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. i. 134 (1855).
K. glomerifolia, F.v.M. et Tate, in Trans. Roy. Soc. S.A. xvi. 345 (1896).
K. Massoni, A. J. Ewart in Proc. Roy. Soc. Vict. (n. s.) xx. 82 (1907).
K. carnosa, (Miq.) R. H. Anderson, in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, xlviii. 353 (1923).
8. *ENCHYLAENA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 407 (1810).
E. micrantha, Benth. Fl. Austr. v. 181 (1870).
E. tomentosa, R.Br. Prodr. 408 (1810).
E. marginata, Benth. Fl. Austr. v. 182 (1870).
9. *DIDYMANTHUS*, Endl. Nov. Stirp. Dec. 7 (1839).
D. Roei, Endl. Nov. Stirp. Dec. 8 (1839).
10. *THRELKELDIA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 409 (1810).
T. diffusa, R.Br. Prodr. 410 (1810).
T. drupata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 187 (1904).
T. haloragoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 198 (1870).
11. *ARTHROCNEMUM*, Moq. Chenop. Enum. 111 (1841) partim.
A. arbusculum, (R.Br.) Moq. Chenop. Enum. 113 (1841).
A. Donaldsoni, Ewart et White, in Journ. Roy. Soc. N.S.W. xlii. 194 (1909).
A. leiostachyum, (Benth.) Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 61 (1918).
A. Benthami, Paulsen, in l. c. 62.
A. bidens, Nees ab Essenbach in Lehm. Pl. Preiss. i. 633 (1845).
A. halocnemoides, Nees l. c. 632.
A. pruinatum, Paulsen, in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 63 (1918).
A. brachystachyum, Paulsen, in l. c. 64.
A. Lylei, (Ewart) J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xliii. 359 (1919).
12. *PACHYCORNIA*, Hook. fil. in Benth. et Hook. f. Gen. Plant. iii. 65 (1880).
P. triandra, (F.v.M.) Black, Fl. S. Austr. 206 (1924).
13. *SALICORNIA*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 357 (1737).
S. australis, Banks et Soland. in Forst. Fl. Insul. Austr. Prodr. 88 (1786).
14. *SUAEDA*, Forsk. Fl. Ægypt. Arab. 69 t. 1813 (1775).
S. australis, (R.Br.) Moq. in Ann. Sc. Nat. ser. I. xxiii. 318 (1831)
(*S. maritima*, R.Br.)
15. *SALSOLA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
S. Kali, Linn. Sp. Pl. 222 (1753).

Amarantaceae.

1. *HEMICHROA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 409 (1810).
H. pentandra, R.Br. Prodr. 409 (1810).
H. diandra, R.Br. l. c. 409.
2. *AMARANTUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. retroflexus*, Linn. (Amer. bor.)
**A. patulus*, Bertoli. (Amer. bor.)
A. pallidiflorus, F.v.M. Fragm. i. 140 (1859).
A. viridis, Linn. Sp. Pl. ed. II. 1405 (1753).
3. *TRICHINIUM*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 414 (1810).
i. *Astrotricha*.
T. obovatum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
T. Elderi, Farmar, in Bull. Herb. Boiss, ser. II. v. 1088 (1905).
T. incanum, R.Br. Prodr. 415 (1810).

- T. Roci, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 240 (1870). (*T. Scwelliae*, F.v.M.)
 T. astrolasium, (F.v.M.) Benth. l. c. 222.
- ii. *Straminea*.
 T. distans, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. longistachyum, (W. V. Fitzg.) Gardn. comb. nov. (*Ptilotus longistachyus*, W.V.F.)
 T. alopecuroideum, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 13 (1839).
 T. polystachyum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
 T. macrocephalum, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. Clementi, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1087 (1905).
 T. rotundifolium, F.v.M. Fragm. iii. 122 (1863).
 T. corymbosum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 444 (1826) = *T. Gaudichaudii Steud*
 T. eremita, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 218 (1898).
- iii. *Rhodostachya*, Benth.
 T. parvifolium, F.v.M. Rep. Babb. Exped. 19 (1858).
 T. Polakii, (F.v.M.) Diels et Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 191 (1904).
 T. exaltatum, (Nees) Benth. Fl. Austr. v. 227 (1870).
 T. Manglesii, Lindl. Bot. Reg. t. 28 (1839).
 T. gomphrenoides, Moq. in. D.C. Prodr. xiii. ii. 287 (1849)
 T. esquamatum, Benth. Fl. Austr. v. 229 (1870).
- iv. *Incurva*, Benth.
 T. declinatum, (Nees) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 293 (1849).
- v. *Polycephala*, Benth.
 T. divaricatum, Gaud. in Freye. Voy. Bot. 445 (1826).
 T. helipteroides, F.v.M. Fragm. iii. 122 (1863).
 T. Stirlingii, Lindl. Bot. Reg. t. 28 (1839).
 T. laxum, Benth. Fl. Austr. v. 232 (1870).
 T. depressum, (W. V. Fitzg.) Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1088 (1905).
 T. axillare, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 232 (1870).
 T. striatum, (Moq.) Benth. l. c. 233.
 T. auriculifolium, (A. Cunn.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 287 (1849).
 (*T. siphonandrum*, Diels.)
 T. sericostachyum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 627 (1845).
 T. roseum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 284 (1849).
 T. fusiforme, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. gracile, R.Br. l. c. 415.
- vi. *Squamigera*.
 T. Dummondii, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 292 (1849).
 T. procerum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 191 (1904).
 T. calostachyum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 236 (1870).
 T. Carlsoni, F.v.M. in Viet. Nat. v. 74 (1888).
 T. Fraseri, (A. Cunn.) Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 295 (1849).
- vii. *Spathulata*.
 T. spathulatum, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 T. pyramidatum, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 288 (1849).
 T. holsericeum, Moq. in. l. c. 287.
- viii. *Parviflora*.
 T. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. v. 238 (1870). (*P. lanatus* (A. Cunn.) Moq.)
 T. villosum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 628 (1845).
 T. brachyanthum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 239 (1870).
 T. arthrolasium, (F.v.M.) Benth. l. c. 239.
 T. Forrestii, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*Ptilotus Forrestii*, F.v.M.)
 T. aervoides, F.v.M. Fragm. iii. 123 (1863).
 T. caespitosum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 240 (1870).
- ix. *Helichrysoidea*.
 T. helichrysoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 241 (1870).
4. *PTILOTUS*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 415 (1810).
 P. capitatus, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*P. psilotrichoides*, F.v.M.)
 P. corymbosus, R.Br. Prodr. 415 (1810).
 P. grandiflorus, F.v.M. Fragm. i. 237 (1859).
 P. Johnstonianus, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 138 (1918).

- P. spicatus*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 243 (1870).
P. petiolatus, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1089 (1905).
P. Murrayi, (F.v.M.) Fragm. iii. 145 (1863).
P. decipiens, (Benth.) Gardn. comb. nov. (*P. Hoodii*, F.v.M.)
P. roseo-albus, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1090 (1905).
P. gomphrenoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 244 (1870).
P. latifolius, R.Br. in App. Sturt's Exped. ii. 88 (1849).
P. chamaecladus, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 193 (1904).
P. villosiflorus, F.v.M. Fragm. iii. 125 (1863). (*P. macrotrichus*, F.v.M.)
(*Alternanthera polycephalus*, Benth.)
P. humilis, (Nees) F.v.M. Fragm. vi. 229 (1868).
5. *DIPTERANTHEMUM*, F.v.M. in Wing's Southern Science Record, iii. 281 (1884).
D. Crosslandi, F.v.M. in Wing's S. Sei. Rec. iii. 281 (1884).
6. *ACHYRANTHES*, Linn. Gen. ed. I. 34 (1737).
A. aspera, Linn. Sp. Pl. 204 (1753).
7. *ALTERNANTHERA*, Forsk. Fl. Ægypt-Arab. 28 (1775). --
A. triandra, Lamarek, Encycl. Meth. i. 95 (1783). (*A. nodiflora*, R.Br.)
A. nana, R.Br. Prodr. 417 (1810).
A. leptophylla, Benth. Fl. Austr. v. 251 (1870).
A. longipes, (Moq.) Benth. l. c. 252.
8. *GOMPHRENA*, Linn. Gen. ed. I. 69 (1737).
G. canescens, R.Br. Prodr. 416 (1810).
G. flaccida, R.Br. l. c. 416.
G. affinis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. v. 254 (1870).
G. platandra, F.v.M. in Trans. Roy. Soc. Viet. xxiii. 52 (1886).
G. brachystylis, F.v.M. Fragm. iii. 124 (1862).
G. alba, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1090 (1905).
G. leptoclada, Benth. Fl. Austr. v. 255 (1870).
G. Cunninghamii, (Moq.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 625 (1917). (*G. Maitlandi*, F.v.M.)
G. tenella, (Moq.) Benth. Fl. Austr. v. 256 (1870).
G. conica, (R.Br.) Spreng. Syst. i. 824 (1825).
G. conferta, (Moq.) Benth. Fl. Austr. v. 257 (1870).
G. sordida, Farmar, in Bull. Herb. Boiss. ser. II. v. 1091 (1905).
G. parviflora, Benth. Fl. Austr. v. 257 (1870).

Nyctaginaceae.

1. *BOERHAAVIA*, (Vaill.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
B. diffusa, Linn. Fl. Zeyl. 4 (1747).
B. repandra, Willd. Sp. Pl. i. 22 (1816).

Phytolaccaceae.

- **PHYTOLACCA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **P. octandra*, Linn. (Japon.)
1. *DIDYMOTHECA*, Hook. fil. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. 278 (1747).
D. thesioides, Hook. fil. in Hook. Lond. Journ. Bot. vi. 279 (1847).
2. *GYROSTEMON*, Desf. in Mem. Mus. Par. vi. 16. t. 6 (1820).
G. subnudus, (Nees) Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 195 (1904).
(*G. brachystigma*, F.v.M.)
G. Sheathii, W. V. Fitzg. in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. no. ii. 81 (1903).
G. australasicus, (Moq.) Hiermerl. in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenfam. iii. 1B. 12 (1889). (*G. cyclothea*, Benth.)
G. ramulosus, Desf. in Mem. Mus. Par. vi. 17. t. 6 (1820).
G. Brownii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 190 (1920).
3. *CODONOCARPUS*, A. Cunn. ex Hook. in Hook. Bot. Misc. i. 244 (1830).
C. cotinifolius, (Desf.) F.v.M. Pl. Viet. i. 200 (1862).

4. *TERSONIA*, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 40 (1849).
T. brevipes, Moq. in D.C. Prodr. xiii. ii. 40 (1849).
T. subvolubilis, Benth, Fl. Austr. v. 150 (1870).

Aizoaceae.

1. *MOLLUGO*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 336 (1737).
M. molluginis, (F.v.M.) Druce, Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916. 636
 (1917). (*M. trigastrothecca*, F.v.M.)
M. cerviana, Ser. in D.C. Prodr. i. 392 (1824).
M. hirta, Thunb. Prodr. Fl. Cap. i. 24 (1794). (*M. glinus*, A. Rich.)
 (*Glinus lotoides*, Loef.)
M. Spergula, Linn. Sp. Pl. ed. alt. 131 (1762). (*Glinus Spergula* (L.)
 Pax.)
2. *MACARTHURIA*, Hueg. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 11 (1837).
M. apetala, Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 55 (1855).
M. australis, Hueg. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 11 (1837).
3. *SESUVIUM*, Linn. Syst. ed. X. 1058 (1759).
S. portulacastrum, Linn. Syst. ed. X. 1058 (1759).
4. *TRIANTHEMA*, (Sauv.) Linn. Sp. Pl. ed. I. 223 (1753).
T. decandra, Linn. Mant. i. 70 (1771).
T. crystallina, Vahl. Symb. Bot. i. 32 (1790). (*T. glaucifolia*, F.v.M.)
T. pilosa, F.v.M. Fragm. i. 174 (1859).
T. oxycalyptra, F.v.M. l. c. 173.
T. turgidifolia, F.v.M. l. c. x. 83 (1786).
T. glossostigma F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. iii. 282 (1864).
5. *GUNNIA*, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 9 (1858).
G. Drummondii, Benth, Fl. Austr. iii. 327 (1866).
6. *GUNNIOPSIS*, Pax. in Engler et Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iii. IB.
 44 (1889). (*Aizoon*, Linn. p.p.)
G. intermedia, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 197 (1904).
G. quadrifida, (F.v.M.) Pax. in Engl. et Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iii. Ib.
 44 (1889).
G. Rodwayi, (A. J. Ewart) Gardn. comb. nov. (*Aizoon Rodwayi*, Ewart).
G. zygophylloides, (F.v.M.) Maiden et Betché, Cens. N.S. Wales Pl. 74
 (1916).
G. glabra, (Ewart) Gardn. comb. nov. (*Aizoon glabrum*, Ewart).
7. *TETRAGONIA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
T. expansa, Murr. in Com. Gotting. vi. 13 (1783).
T. cremaea, Ostf. in Dansk. Vidensk. Selsk. Biol. Meddel. iii. 2. 59 (1921).
T. diptera, F.v.M. Fragm. xi. 8 (1878).
T. implexicoma, (Miq.) Hook. fil. Fl. Tasm. i. 148 (1854).
8. *MESEMBRYANTHEMUM*, (Breyne) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **M. crystallinum*, Linn. (Graecia; Ins. Canar.; Afr. austr.; Calif.)
M. acquilaterale, Haw. Misc. Nat. 77 (1803).
M. australe, Soland, ex Forst. Prodr. 90 (1786).
 **M. tumidulum*, Haw. (Afr. austr.)

Portulacaceae.

1. *CALANDRINIA*, H.B. et K. Nov. Gen. et. Sp. vi. 77 t. 526 (1823).
C. spergularina, F.v.M. Fragm. i. 175 (1859).
C. ptychosperma, F.v.M. l. c. iv. 137 (1864).
C. strophiolata, F.v.M. l. c. xi. 82 (1880).
C. Lehmanni, Endl. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 235 (1847).
C. schistorrhiza, A. Morrison, in Journ. Bot. l. 164 (1912).
C. primuliflora, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 198 (1904).
C. uniflora, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Viet. iii. 41 (1859).
C. Tepperiana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy Soc. W.A. iii. 141 (1918).
C. balonensis, Lindl. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 148 (1848).
C. polyandra, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 172 (1863).
C. quadrivalvis, F.v.M. Fragm. i. 176 (1859).
C. liniflora, Fenzl. in Enum. Pl. Hueg. 57 (1837).

- C. polypetala*, Fenzl. in l. c. 51.
C. volubilis, Benth. Fl. Austr. i. 174 (1863).
C. Maryonii, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 164 (1920).
C. calyptrata, Hook. fil. in Icones Pl. t. 296 (1840).
C. cygnorum, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 199 (1904).
C. pumila, F.v.M. Fragm. x. 68 (1876).
C. composita, Benth. Fl. Austr. i. 175 (1863).
C. corrigiolooides, (F.v.M.) Benth. l. c. 175.
C. brevipedata, F.v.M. Fragm. x. 69 (1876).
C. granulifera, Benth. Fl. Austr. i. 176 (1863).
C. pygmaea, F.v.M. Fragm. i. 175 (1859).
C. Creethae, Tratman ex Morrison in Journ. Bot. l. 165 (1912).
2. *CLAYTONIA*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 339 (1737).
C. australasica, Hook. fil. Icones Pl. t. 293 (1840).
 3. *PORTULACA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
P. oleracea, Linn. Sp. Pl. 445 (1753).
P. napiformis, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 169 (1863).
P. australis, Endl. Atakta. 7 t. 6 (1833).
P. tuberosa, Roxb. Hort. Beng. (91) Fl. Ind. ii. 464 (?).
P. digyna, F.v.M. Fragm. i. 170 (1859).
P. oligosperma, F.v.M. l. c. 170.
P. bicolor, F.v.M. l. c. 171.

Caryophyllaceae.

- *SILENE*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**S. gallica*, Linn. (Oriens.)
**S. nocturna*, Linn. (Reg. Mediterr.)
**S. vulgaris*, (Moench.) Gareke. (Europ.; Afr. bor.; Reg. Himal.)
**TUNICA*, Hall. Enum. Stirp. Helv. i. 381 (1742).
**T. prolifera*, Scop. (Europ.; Reg. Cauc.)
**SAPONARIA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**S. Vaccaria*, Linn. (Europ.; As. Min.; Sibir.)
1. *STELLARIA*, Linn. Syst. Nat. ed. vi. (1748).
**S. media*, Cyrill. (Geront. temp.)
S. multiflora, Hook. in Comp. Bot. Mag. i. 275 (1835).
**CERASTIUM*, Linn. Syst. Nat. ed. i. (1735).
**C. glomeratum*, Thuill. (Reg. temp. et subtrop.)
 2. *SAGINA*, Linn. Syst. Nat. 8 (1735).
S. apetala, Arduino, Animad. Bot. Sp. alt. 22 (1764).
**SPERGULA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
**S. arvensis*, Linn. (Europ.)
 5. *DRYMARIA*, Willd. in Roem. et Schultz. Syst. v. 406 (1819).
D. filiformis, Benth. Fl. Austr. i. 162 (1863).
 4. *POLYCARPON*, Loef. Inter. Hisp. 7 (1758).
P. tetraphyllum, Loef. in Linn. Syst. ed. x. 881 (1759).
P. alsinaefolium, D.C. Prodr. iii. 376 (1828).
 5. *POLYCARPAEA*, Lamk. Journ. d'Hist. Nat. Par. ii. 8. t. 25 (1792).
P. longiflora, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 8 (1858).
P. synandra, F.v.M. in l. c. 8.
P. violacea, (Mart.) Benth. Fl. Austr. i. 165 (1863).
P. Holtzei, Maiden et Betehe, in Ewart et Davies, Fl. N. Terr. 109 (1917).
P. staminodina, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 8 (1858).
P. breviflora, F.v.M. in l. c. 9.
P. spicata, Wight et Arn. in Ann. Nat Hist, ser. l. iii. 91 (1839).
P. involucrata, F.v.M. in Rep. Babb. Exped. 9 (1858).

RANALES.

Nymphaceae.

1. *NYMPHAEA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
N. stellata, Willd. Sp. Pl. ii. 1153 (1799). (*N. gigantea*, Hook.)

Ranunculaceae.

1. *CLEMATIS*, Linn. Gen. Pl. ed. I. 163 (1737).
C. pubescens, Hueg. Enum. Pl. i. (1837).
C. microphylla, D.C. Prodr. i. 147 (1818).
2. *RANUNCULUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
R. lappaceus, Sm. in Rees Cycl. xxix. n. 61 (1815).
R. hirtus, Banks et Soland in G. Forst. Fl. Ins. Austr. Prodr. 90 (1786).
(R. plebeius, R.Br.)
R. parviflorus, Linn. Sp. Pl. ed. ii. 780 (1762).
**R. muricatus*, Linn. (Europ.; Oriens.)

Menispermaceae.

1. *TINOSPORA*, Miers, in Ann. Nat. Hist. ser. II. vii. 38 (1851).
T. smilacina, Benth. in Journ. Linn. Soc. v. Suppl. ii. 52 (1861).
T. Walcottii (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 56 (1863).

Myristicaceae.

1. *MYRISTICA*, Linn. Gen. Ed. II. 524 (1742).
M. insipida, R.Br. Prodr. 400 (1810).

Lauraceae.

1. *CRYPTOCARYA*, R.Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 402 (1810).
C. glaucescens, R.Br. Prodr. 402 (1810).
2. *CASSYTHA*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 35 (1753).
C. nodiflora, Meissn. in D.C. Prodr. xv. i. 252 (1864).
C. glabella, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. flava, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 620 (1845).
C. pubescens, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. strigosa, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 143 (1918).
C. filiformis, Linn. Sp. Pl. 35 (1753).
C. melantha, R.Br. Prodr. 404 (1810).
C. micrantha, Meissn. in D.C. Prodr. xv. i. 256 (1864).
C. coronata, Nees, in Lehm. Pl. Preiss. i. 620 (1845).
C. racemosa, Nees in l. c. 621.
C. pomiformis, Nees in l. c. 620.

Hernandiaceae.

1. *GYROCARPUS*, Jacq. Select. Ann. 282. t. 178 (1763).
G. americanus, Jacq. Select. Ann. 282. t. 178 (1763).

RHOEADALES.

Papaveraceae.

- *PAPAVER*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**P. hybridum*, Linn. (Europ.; Syria; Afr. bor.)
**P. aculeatum*, Thunb. (Afr. austr. Austr.)
**ARGEMONE*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**A. mexicana*, Linn. (Amer. bor.; Mexic.)

Fumariaceae.

- *FUMARIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**F. capreolata*, Linn. (Europ.; Afr. bor.)
**F. muralis*, Sond. (Europ.)

Capparidaceae.

1. *CLEOME*, Linn. Syst. Nat. 9 (1735).
C. oxalidea, F.v.M. Fragm. i. 69 (1858).
C. tetrandra, Banks, in D.C. Prodr. i. 240 (1824).
C. viscosa, Linn. Sp. Pl. 672 (1753). (*Polanisia viscosa* (Linn.) D.C.)
2. *ROEPERIA*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 15 (1857).
R. cleomoides, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 15 (1857). (*Gynandropsis
Muelleri*, Benth.)

3. *CAPPARIS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. umbellata, R.Br. in D.C. Prodr. i. 247 (1824).
C. lasiantha, R.Br. in l. c. 247.
C. nummularia, R.Br. in l. c. 246.
C. spinosa, Linn. Sp. Pl. 503 (1753).
C. lucida, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 96 (1863).
C. umbonata, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 257 (1848).
4. *EMBLINGIA*, F.v.M. Fragm. ii. 2 (1860).
E. calecoliflora, F.v.M. Fragm. ii. 2. t. 11 (1860).

Cruciferae.

A. THELYPODIEAE.

a. Heliophilinae.

- **HELIOPHILA*, (Burm. fil) Linn. Sp. Pl. ed. II. 926 (1763).
 **H. pusilla*, Linn. (Afr. aust.)

B. SINAPEAE.

a. Lepidiinae.

1. *LEPIDIDIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
L. Merrallii, F.v.M. in Viet. Nat. vii. 114 (1890).
L. linifolium, (Desv.) Benth. Fl. Austr. i. 84 (1863).
L. leptopetalum, F.v.M. Pl. Vict. i. 48 (1860).
L. rotundum, D.C. Syst. Veg. ii. 537 (1818).
L. papillosum, F.v.M. in Linnæa, xxv. 370 (1852).
L. oxytrichum, Sprague, in Kew Bull. Misc. 123 (1915).
L. foliosum, Desv. in Journ. Bot. iii. 164. d. 180 (1813).
L. ambiguum, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 34 (1855).
L. pseudo-rudérale, Thell. in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Nat. Zurich, xli. i. 303 (1906). (*L. rudérale*, Linn. p.p.)
 **L. Draba*, Linn. (Europ.; Oriens.)
 **CORONOPUS*, (Rupp.) Gaertn. Fruct. ii. 293 (1791).
 **C. didymus*, (Linn.) Sm. (Cosmop.)

b. Sisymbriinae.

- **SISYMBRIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **S. officinale*, Linn. (Europ.; Afr. bor.)
 **S. crysimoides*, Desv. (Reg. Meditter.; Afr. trop.; Arab.)
 **S. orientale*, Linn. (Europ.; Oriens.; Reg. Himal.)
2. *BLENNODIA*, R.Br. in Sturt. Exped. ii. App. 67 (1849). (*Sisymbrium* (T) Linn. p.p.) (*Erysimum*, F.v.M. p.p.)
B. trisecta, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 74 (1863).
B. Richardsii, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*Sisymbrium Richardsii*, F.v.M.)
B. Drummondii, (Turez.) Gardn. comb. nov. (*Sisymbrium brachypodum*, F.v.M.)
B. cardaminoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 75 (1863).
 3. *GEOCOCCUS*, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 52 (1855).
G. pusillus, J. Drumm. ex Harv. in Hook. Kew Journ. vii. 52 (1855).
 4. *CAKILE*, (Tourn.) Miller, Gard. Diet. Abridg. Ed. IV. (1754).
C. maritima, Scop. Flor. Carn. ed. ii. 35 (1760).

c. Brassicinae.

5. *DIPLOTAXIS*, D.C. Syst. ii. 628 (1821).
D. tenuifolia, (Linn.) D.C. Syst. Veg. ii. 632 (1821).
 **D. muralis*, (Linn.) D.C. (Europ.)
 **BRASSICA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735). (*Sinapis*, Linn.)
 **B. Tournefortii*, Gouan. (Reg. Meditter.; Oriens.; Ind. or.)
 **B. nigra*, Koch. (Cosmop.)
 **B. sinapistrum*, Boiss. (Europ.) (*Sinapis arvensis*, Linn.)
 **B. campestris*, Linn. (Cosmop.)
 **RAPHANUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **R. raphanistrum*, Linn. (Europ.)

d. Cardamininae.

6. *NASTURTIUM*, (Linn.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 110 (1812).
N. officinale, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 111 (1812).

7. *CARDAMINE*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
C. dictyosperma, Hook. Journ. Bot. i. 246 (1834).
C. hirsuta, Linn. Sp. Pl. 655 (1753).
C. eustylis, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. i. 114 (1854).
- C. SCHIZOPETALEAE.
- a. Schizopetalinae.
8. *STENOPETALUM*, R.Br. in D.C. Syst. Veg. ii. 513 (1821).
S. velutinum, F.v.M. Pl. Vict. i. 49 (1860).
S. lineare, R.Br. in D.C. Syst. Veg. ii. 513 (1821).
S. flifolium, Benth. Fl. Austr. i. 78 (1863).
S. sphaerocarpum, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 35 (1854).
S. nutans, F.v.M. Fragm. iii. 27 (1862).
S. robustum, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 4 (1837).
S. pedicellare, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 79 (1863).
S. croceum, Bunge, in Lehm. Pl. Preiss. i. 258 (1845).
9. *MENKEA*, Lehm. in Sem. Hort. Hamb. 8 (1843).
M. australis, Lehm. in Sem. Hort. Hamb. 8 (1843).
M. Coolgardiensis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxv. 161 (1897).
M. draboides, (Hook. fil.) Benth. Fl. Austr. i. 80 (1863).
M. sphaerocarpa, F.v.M. Fragm. viii. 223 (1874).
- D. HESPERIDEAE.
- a. Capsellinae.
10. *HUTCHINSIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iv. 82 (1812).
H. procumbens, (Linn.) Desv. in Journ. Bot. iii. 163 (1814).
H. Drummondii, (Benth.) J. M. Black, Fl. S. Austr. 254 (1924).
11. *CAPSELLA*, Medicus, Pflanzen. Gattungen 85 (1792).
C. pilosula, F.v.M. Pl. Vict. i. 44 (1860).
**C. bursa-pastoris*, (Linn.) Medic. (Reg. temp.)
- b. Alyssinae.
12. *ALYSSUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
A. minimum, Pallas, Reise Pror. Russ. Reich. iii. 746 (1776). (*A. lini-folium*, Steph.)
- Resedaceae.
- *RESEDA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**R. lutcola*, Linn. (Europ.; Oriens.)
**R. alba*, Linn. (Europ.; Oriens.)
- Droseraceae.
1. *ALDROVANDRA*, (Monti) Linn. Nov. Pl. Gen. 39 (1751).
A. vesiculosa, Linn. Sp. Pl. ed. I 281 (1753).
2. *DROSEREA*, Linn. Gen. ed. I. 253 (1737).
 Subgen. I. *Rorella*, D.C.
 Sect. i. *Lamprolepis*, Planch.
- D. paleacea*, D.C. Prodr. i. 318 (1824).
D. parvula, Planch. in Ann. se. nat. 3 ser. ix. 287 (1848).
D. pycnoblata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 207 (1904).
D. androsaecca, Diels, in l. c. 205.
D. pulchella, Lehmann, Pugill. viii. 38 (1844).
D. leucoblata, Benth. Fl. Austr. ii. 458 (1864).
D. miniata, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 206. t. 25A-D (1904).
D. dichrosepala, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvii. 2, 343 (1854).
D. scorpioides, Planch, in Ann. se. nat. 3 ser. ix. 288 (1848).
D. Drummondii, Lehm. Pl. Preiss. ii. 235 (1847).
D. platystigma, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
D. Sewelliae, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 206. t. 25 (1904).
D. nitidula, Planch. in Ann. se. nat. 3. ser. ix. 285 (1848).
D. omissa, Diels, in Engler's Pflanzenreich Droseraceae iv. 112, 73 (1906).

- Sect. ii. *Thelocalyx*, Planch.
 D. Burmanni, Vahl. Symbol. iii. 50 (1794).
- Sect. iii. *Coelophylla*, Planch.
 D. glanduligera, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
 D. occidentalis, A. Morrison, in Journ. Bot. 1. 166 (1912).
- Sect. iv. *Arachnopus*, Planch.
 D. indica, Linn. Sp. Pl. ed. 1. 282 (1753).
- Sect. v. *Rosolis*, Planch.
 D. petiolaris, R.Br. in D.C. Prodr. i. 318 (1824).
- Sect. vi. *Stelogyne*, Diels.
 D. Hamiltonii, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. West. Austr. Perth 81 (1903).
- Subgen. II. *Ergaleium*, D.C.
 Sect. vii. *Polypeltes*, Diels.
 D. Banksii, R.Br. ex D.C. Prodr. i. 319 (1824).
 D. peltata, Sm. in Willd. Spec. pl. i. 1546 (1797).
 D. Andersoniana, (W.V.F.) Ewart et White in Proc. Roy. Soc. Vict. n. s. xxii. 93 (1909).
 D. modesta, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 209 (1904).
 D. sulphurea, Lehm. Pugill. viii. 37 (1844).
 D. Neesii, Lehm. l. c. 42.
 D. gigantea, Lindl. Swan Riv. App. xx. n. 88 (1839).
 D. myriantha, Planch. in Ann. sc. nat. 3. ser. ix. 291 (1848).
 D. bulbigena, Morrison, in Trans. et Proc. Bot. Soc. Edinburgh xxii. 417 (1903).
 D. pallida, Lindl. Swan Riv. App. xx. n. 87 (1839).
 D. Menziesii, R.Br. in D.C. Prodr. i. 319 (1824). (*D. penicillaris*, Benth.)
 D. macrantha, Endl. Enum. pl. Hueg. 6 (1837).
 D. stricticaulis, (Diels) O. H. Sargent in Journ. Bot. li. 40 (1913).
 D. subhirtella, Planch. in Ann. sc. nat. 3 ser. ix. 292 (1848).
 D. microphylla, Endl. Enum. pl. Hueg. 6 (1837).
 D. thysanosepala, Diels, in Engler's Pflanzenreich Droseraceae iv. 112, 121 (1906).
 D. Huegelii, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 6 (1837).
 D. heterophylla, Lindl. Swan Riv. App. 89 (1839).
- Sect. viii. *Erythrorrhiza*, Planch.
 D. erythrorrhiza, Lindl. Swan Riv. App. xx. 91 (1839).
 D. squamosa, Benth. Fl. Austr. ii. 463 (1864).
 D. macrophylla, Lindl. Swan Riv. App. xx. 91 (1839).
 D. rosulata, Lehm. Pugill. viii. 36 (1844).
 D. bulbosa, Hook. in Icon. pl. t. 375 (1841).
 D. stolonifera, Endl. Enum. pl. Hueg. 5 (1837).
 D. platypoda, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvii. 2. 343 (1854).
 D. ramellosa, Lehm. Pugill. viii. 40 (1844).

ROSALES.

Crassulaceae.

1. *CRASSULA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 C. Miriamae, Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 42 (1918).
 C. intricata, (Nees) Ostf. l. c. 46. (*Tillaca intricata*, Nees.)
 C. colorata, (Nees) Ostf. l. c. 45. (*T. verticillata*, Benth.)
 C. natans, Thunb. Fl. Cap. 54 (1794).
 C. recurva, (Hook. f.) Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 40. (*T. recurva*, Hook. f.)
 C. bonariensis, (D.C.) Cambess in St. Hil. Fl. Bras. Mer. ii.
 C. macrantha, (Hook. f.) Diels et Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 210 (1904).
 C. pedicellosa, (F.v.M.) Ostf. in Dansk. Bot. Arkiv. ii. n. 8. 42 (1918).

Cephalotaceae.

1. *CEPHALOTUS*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 6. t. 145 (1806).
 C. follicularis, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 7. t. 145 (1806).

Saxifragaceae.

1. *EREMOSYNE*, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 53 (1837).
E. pectinata, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 53 (1837).

Pittosporaceae.

1. *PITTIOSPORUM*, Banks, in Gaertn. Fruct. i. 286 (1788).
P. melanospermum, F.v.M. Fragm. i. 70 (1858).
P. phillyræoides, D.C. Prodr. i. 347 (1824).
2. *MARIANTHUS*, Hueg. in Enum. Pl. Hueg. 8 (1837).
M. procumbens, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 117 (1863).
M. microphyllus, (Turez.) Benth. l. c. 117.
M. villosus, (Turez.) Benth. l. c. 117.
M. granulatus, (Turez.) Benth. l. c. 118.
M. parviflorus, F.v.M. Fragm. ii. 144 (1861).
M. Drummondianus, (Putterl.) Benth. Fl. Austr. i. 119 (1863).
M. tenuis, Benth. Fl. Austr. i. 119 (1863). (*Billardiera parviflora*, D.C.)
M. coerulesco-punctatus, Klotzsch in Link. Kl. et Otto Ic. Pl. 28. t. 12 (1841).
M. gracilis, Ostf. in Det. Kgl. Dans. Videns. Selk. iii. 2. 67 (1921).
M. candidus, Hueg. in Enum. Pl. Hueg. 8 (1837).
M. erubescens, Putterl. in Endl. Nov. Stirp. Dec. 60 (1839).
M. ringens, (Drum. et Harv.) F.v.M. Fragm. i. 218 (1859).
M. lineatus, F.v.M. Fragm. i. 217 (1859).
M. pictus, Lindl. Swan Riv. App. 22 (1839).
3. *BURSARIA*, Cav. Ic. et Deser. Pl. iv. 30. t. 350 (1797).
B. spinosa, Cav. Ic. et Deser. Pl. iv. 30. t. 350 (1797).
4. *SOLLYA*, Lindl. in Bot. Reg. t. 1466 (1830).
S. fusiformis, (Labill.) Briq. in Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genev. xx. 423 (1919). (*S. heterophylla*, Lindl.)
S. parviflora, Turez. in Bull. Soc. Mosc. xxvii. 361 (1854).
S. erecta, C. Andrews, in Journ. Muell. Bot. Soc. W.A. i. 38 (1902).
5. *CHEIRANTHERA*, A. Cunn. in Brongn. Bot. Voy. Coq. t. 77 (1829).
C. parviflora, Benth. Fl. Austr. i. 128 (1863).
C. filifolia, Turez. in Bull. Soc. Mosc. xxvii. 364 (1854).
6. *BILLARDIERA*, Sm. Sp. Bot. New Holl. i. t. 1 (1793).
B. latifolia, (Turez.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916. 609 (1917).
(*B. coriacea*, Benth.)
B. gracilis, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 213 (1904).
B. variifolia, D.C. Prodr. i. 346 (1824).
B. angustifolia, (Putterl.) Gardn. comb. nov. (*B. Lehmanniana*, F.v.M.)
B. floribunda, (Putterl.) F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. ii. 1 (1882).
(*M. floribundus*, Putterl.)
7. *CITRIOBATUS*, A. Cunn. in Loudon's Hort. Brit. Suppl. i. 585 (1832).
C. pauciflorus, A. Cunn. in Loudon's Hort. Brit. Suppl. i. 585 (1832).
8. *PRONAYA*, Hueg. Bot. Archiv. t. 6 (1837).
P. elegans, Hueg. Bot. Archiv. t. 6 (1837).

Byblidaceae.

1. *BYBLIS*, Salisb. Parad. Lond. t. 95 (1808).
B. limiflora, Salisb. Parad. Lond. t. 95 (1808).
B. gigantea, Lindl. in Swan Riv. App. 21 (1839).

Cunoniaceae.

1. *APHANOPETALUM*, Endl. Nov. Stirp. Dec. i. 34 (1839).
A. clematideum, (Drumm. et Harv.) Gardn. comb. nov. (*A. occidentale*, F.v.M.)

Rosaceae.

- **RUBUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**R. fruticosus*, Linn. (Europ.)
**ROSA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
**R. rubiginosa*, Linn. (Europ.; Reg. Caucas.)

1. *ACAENA*, Linn. Mantiss. ii. 200 (1771).
A. ovina, A. Cunn. in Field's N.S. Wales 358 (1825).
2. *STYLOBASIUM*, Desf. in Mem. Mus. Par. v. 37. t. 2 (1819).
S. spathulatum, Desf. in Mem. Mus. Par. v. 37. t. 2 (1819).
S. lineare, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 95 (1845).

LEGUMINOSAE.

Mimosaceae.

1. *PITHECOLOBIUM*, Mart. in Fl. xx. (1837).
P. moniliferum, (Hassk.) Benth. in Hook. Lond. Journ. iii. 211 (1844).
2. *ALBIZZIA*, Durazz in Mag. Tosc. III. iv. 11 (1772).
A. distachya, (Vent.) Macbride in Contrib. Gray Herb. n. s. lix. 3 (1919).
(A. lophantha, Benth.)
A. procera, (Willd.) Benth. in Hook. Lond. Journ. iii. 88 (1844).
A. lebbek (Willd.) Benth l. c. 87.
3. *ACACIA*, (Tourn.) Willd. Sp. Pl. iv. 1049 (1805).

PHYLLODINEAE.

Series I. *Alatae*.

- A. glaucoptera, Benth. in Linnæa xxvi. 604 (1854).
- A. alata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 464 (1813).
- A. diptera, Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
- A. stenoptera, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 325 (1842).

Series II. *Continuae*.

- A. incurva, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 325 (1842).
- A. trigonophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss, ii. 199 (1846).
- A. imabilis, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 289 (1904).

Series III. *Pungentes*.

A. *Plurinerves*.

- A. latipes, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 334 (1842).
- A. comans, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 5 (1904).
- A. cochlearis, (Labill.) Wendl. Comm. Acac. Aphyll. 15 (1820).
- A. colletioides, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 336 (1842).
- A. acclerata, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 2 (1927).
- A. periculosa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xiv. 171 (1920).
- A. Mackeyana, Ewart et Jean White, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxii. (n.s.) 6 (1909).
- A. sedifolia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 3 (1927).
- A. striatulata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 336 (1842).
- A. campylophylla, Benth. in Linnæa xxvi. 605 (1853).
- A. teretifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).
- A. sulcata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3 v. 460 (1813).
- A. costata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 339 (1842).
- A. pulviniformis, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 1 (1927).
- A. acuarina, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 7 (1904).
- A. Andrewsii, W. V. Fitzg. in l. c. 6.
- A. acutata, W. V. Fitzg. in l. c. 6.
- A. barbinervis, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).
- A. ataxiphylla, Benth. in Linnæa xxvi. 605 (1853).
- A. Baxteri, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 327 (1842).

B. *Uninerves*.

- A. auronitens, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
- A. quadrisulcata, F.v.M. Fragm. iii. 127 (1863).
- A. Tamminensis, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 290 (1904).
- A. calcarata, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 2 (1927).
- A. collina, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 291 (1904).
- A. erioclada, Benth. in Linnæa xxvi. 606 (1853).
- A. excentrica, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 4 (1927).
- A. patens, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 120 (1858).
- A. laticina, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 6 (1845).
- A. tetragonophylla, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 121 (1858).
- A. genistoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 330 (1864).

- A. *inaequiloba*, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. 1. 18 (1912).
- A. *nigripilosa*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 172 (1920).
- A. *Prainii*, Maiden in l. c. li. 238 (1917).
- A. *sphaecelata*, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 338 (1842).
- A. *ingrata*, Benth. Fl. Austr. ii. 331 (1864).
- A. *inops*, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 4 (1927).

Series IV. Calamiformes.

A. Subaphyllae.

- A. *volubilis*, F.v.M. Fragm. x. 98 (1877).
- A. *tetragonocarpa*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 4 (1844).
- A. *restiacea*, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 379 (1842).

B. Plurinerves.

- A. *squamata*, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
- A. *exocarpioides*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 7 (1904).
- A. *brachyphylla*, Benth. in Linnæa xxvi. 615 (1853).
- A. *Ewartiana*, (W. V. Fitzg.) J. White in Proc. Roy. Soc. Vict. xxiii. (n.s.) 286 (1911).
- A. *Dielsii*, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 294 (1904).
- A. *Bynoëana*, Benth. in Linnæa xxvi. 614 (1853).
- A. *Helmsiana*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 174 (1920).
- A. *triptycha*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 337 (1864).
- A. *fragilis*, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 5 (1927).
- A. *subflexuosa*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales liii. 178 (1920).
- A. *leptoneura*, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 341 (1842).
- A. *eremophila*, (W. V. Fitzg.) Ewart & J. White in Proc. Roy. Soc. Vict. ns. xxiii. 286 (1911).
- A. *Sowdeni*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 180 (1920).
- A. *abrupta*, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 6 (1927).
- A. *viscifolia*, Maiden et Blakely in l. c. 7.
- A. *densiflora*, Morrison, in Scott. Bot. Rev. i. 96 (1912).
- A. *papyrocarpa*, Benth. Fl. Austr. ii. 338 (1864).

C. Uninerves.

- A. *scirpifolia*, Meissn. in Bot. Zeit. 10 (1855).
- A. *extensa*, Lindl. Swan. Riv. App. 15 (1839).
- A. *longispinea*, Morrison, in Scott. Bot. Rev. i. 96 (1912).
- A. *gonophylla*, Benth. in Linnæa xxvi. 613 (1853).
- A. *prismifolia*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 293 (1904).
- A. *polychroa*, E. Pritzel in l. c. 293.
- A. *ericifolia*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 345 (1842).
- A. *psammophila*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 294 (1904).
- A. *Maxwelli*, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 7 (1927).
- A. *uncinella*, Benth. in Linnæa xxvi. 613 (1853).
- A. *enervia*, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 8 (1927).
- A. *Inceana*, Domin, New Add. Fl. W. Austr. ii. 43 (1923). (*A. Inceae*, Maid & Blakely.)
- A. *assimilis*, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 172 (1920).


Series V. Brunioidæ.

- A. *Rossei*, F.v.M. in Vict. Nat. July (1893).
- A. *cedroides*, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 615 (1853).
- A. *lycopodifolia*, A. Cunn. in Hook. Ic. Plant. t. 172 (1837).
- A. *hippuroides*, (Heward) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 344 (1842).
- A. *sorophylla*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 296 (1904).
- A. *cometes*, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 39 (1904).

Series VI. Uninerves.

A. Spinescentes.

- A. *scabra*, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 605 (1853).
- A. *nodiflora*, Benth. l. c. 621.
- A. *oxylada*, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 341 (1864).
- A. *leptaeantha*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 296 (1904).
- A. *ulicina* Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 202 (1847).
- A. *spinosissima*, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 621 (1853). (*A. ferocior*, Maiden.)



- A. Basedowii, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 197 (1920).
 A. erinacea, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 360 (1842).
 A. intricata, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 172 (1920).

B. Armatae.

- A. Huegelii, Benth. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 42 (1837).
 A. nervosa, D.C. Mem. Leg. xii. 444 (1825).
 A. obovata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 329 (1842).
 A. congesta, Benth. l. c. 327.
 A. dermatophylla, Benth. Fl. Austr. ii. 346 (1864).
 A. armata, R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 3. v. 463 (1813).
 A. idiomorpha, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 329 (1842).
 A. Shuttleworthii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 7 (1844).
 A. dubia, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 9 (1904).
 A. Gregorii, F.v.M. Fragm. iii. 47 (1862).
 A. pilosa, Benth. in Linnæa xxvi. 607 (1853).
 A. crispula, Benth. l. c. 607.
 A. crassistipula, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 326 (1842).

C. Triangularares.

- A. Cliftoniana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 10 (1904).
 A. hastulata, Smith in Rees Cyclop. xxxix. Suppl. (1819).
 A. horridula, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 9 (1844).
 A. divergens, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 331 (1842).
 A. biflora, R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 3. v. 463 (1813).
 A. Mooreana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 10 (1904).
 A. decipiens, R.Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 3. v. 463 (1813).
 A. vernicosa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 11 (1904).
 A. cuneata, Benth. in Endl. Enum. Pl. Hueg. 42 (1837).
 A. dilatata, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 608 (1853).
 A. Rendlei, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 241 (1917).
 A. orbifolia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 9 (1927).
 A. bidentata, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 333 (1842).
 A. flabellifolia, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 11 (1904).
 A. acanthoclada, F.v.M. Fragm. iii. 127 (1863).
 A. Forrestiana, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 298 (1904).

D. Brevifoliae.

- A. lachnophylla, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 150 (1882).
 A. triquetra, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 358 (1842).
 A. chrysopoda, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 10 (1927).
 A. ligustrina, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 203 (1847).
 A. saxatilis, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 173 (1920).
 A. glabriflora, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 12 (1927).
 A. Meissneri, Lehm. Del. Sem. Hort. Bot. Hamb. 1842.
 A. Merriekae, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 13 (1927).
 A. sericocarpa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 9 (1904).
 A. Merrallii, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, 2nd. ser. v. 18 (1890).
 A. oblonga, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 10 (1927).
 A. Tysoni, Luchmann in Viet. Nat. xiii. 112 (1897).
 A. pallidiramosa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 12 (1927).
 A. aneeps, D.C. Mem. Leg. 446 (1825).
 A. undulifolia, Fraser, in Lodd. Bot. Cab. xvi. 1544 (1829).
 A. brachyelada, W. V. Fitzg. in Journ. Bot. l. 20 (1912).
 A. dura, Benth. in Schlecht. Linnæa xxvi. 622 (1853).
 A. spathulata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 356 (1864).
 A. porphyrochila, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 290 (1904).

E. Angustifoliae.

- A. glutinosissima, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 13 (1927).
 A. acutifolia, Maiden et Blakely l. c. 14.
 A. ramosissima, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 356 (1842).
 A. cupularis, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 45 (1923).
 A. Dempsteri, F.v.M. Fragm. xi. 65 (1879).
 A. sentis, F.v.M. Gen. Rep. 11 (1854).
 A. dentifera, Benth. in Maund. Bot. iv. t. 179 (1839).

F. Racemosae.

- A. amblyphylla*, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 149 (1882).
A. subglaucua, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 14 (1927).
A. microbotrya, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 353 (1842).
A. aestivalis, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 300 (1904).
A. chrysellia, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 16 (1927).
A. saligna, Wendl. Comm. Aeac. 26 (1820).
A. cyanophylla, Lindl. Bot. Reg. 49 (1835).
A. notabilis, F.v.M. Fragm. i. 6 (1858).
A. validinervia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 15 (1927).
A. Steedmani, Maiden et Blakely in l. c. 16.
A. hakeoides, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 354 (1842).
A. salicina, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 20 (1838).
A. Blakelyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 246 (1917).
A. rostellifera, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 356 (1842).
A. sclerosperma, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. July, 1882. (*A. spodioperma*, F.v.M., and *A. leucosperma*, F.v.M.)
A. crassiuscula, Wendl. Comm. Aeac. 31. t. 8 (1820).
A. Harveyi, Benth. Fl. Austr. ii. 368 (1864).
A. iteaphylla, F.v.M. in Schlecht. Linnaea xxvi. 617 (1853).
A. bracteata, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 18 (1927).
A. subcaerulea, Lindl. Bot. Reg. t. 1075 (1827).
A. Graffiana, F.v.M. in Melb. Chem. n.s. ii. 118 (1887).
A. Lindleyi, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 14 (1844).
A. leptopetala, Benth. in Schlecht. Linnaea, xxvi. 619 (1853).
A. pyrifolia, D.C. Mem. Leg. 447 (1825).
A. myrtifolia, Willd. Sp. Pl. iv. 1054 (1805).

*Series VII. Plurinervcs.**A. Armatae.*

- A. dictyoneura*, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 303 (1904).
A. scalpelliformis, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 200 (1847).
A. urophylla, Benth. in Bot. Reg. 24 (1841).

B. Triangulares.

- A. adnata*, F.v.M. in Melb. Chemist July, 1882.
A. deltoidea, A. Cunn. in G. Don. Syst. ii. 401 (1832). (*A. stipulosa*, F.v.M.)
A. Luehmanni, F.v.M. Fragm. xi. 116 (1881).
A. Froggattii, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 204 (1920).

C. Brevifoliae.

- A. loxophylla*, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 625 (1853).
A. setulifera, Benth. in l. c. 625.
A. translucens, A. Cunn. in Hook. Ic. Plant. t. 160 (1837).
A. impressa, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 133 (1858).

D. Oligoneurac.

- A. bivenosa*, D.C. Prodr. ii. 452 (1825).
A. nitidula, Benth. Fl. Austr. ii. 381 (1864).
A. deflexa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 18 (1927).
A. Kingiana, Maiden et Blakely, l. c. 19.
A. heteroclita, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 318 (1845).
A. Ridleyana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 12 (1904).
A. Benthamii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 11 (1844).
A. obtecta, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 20 (1927).
A. eremaea, Cecil Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 40 (1904).

E. Microneurac.

- A. ancistrophylla*, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 40 (1904).
A. resinostipulea, W. V. Fitzg. in l. c. i. 12.
A. leptospermoides, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 626 (1853).
A. Osswaldi, F.v.M. Pl. of Vict. ii. 27 (1860).
A. Loderi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 209 (1919).
A. pachyacra, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 21 (1927).
A. subangularis, Maiden et Blakely in l. c. 21.
A. lineolata, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 626 (1853).

- A. coriacea*, D.C. Mem. Leg. 446 (1825).
A. stenophylla, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 366 (1842).

F. Nervosae.

- A. hemignosta*, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 134 (1858).
A. sclerophylla, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 138 (1838).
A. heteroneura, Benth. in Schlecht. Linnaea. xxvi. 624 (1853).
A. ixiophylla, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 364 (1842).
A. duriuscula, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. multilincata, W. V. Fitzg. in l. c. 13.
A. dictyophleba, F.v.M. Fragm. iii. 128 (1863).
A. cyclopis, A. Cunn. in Loudon Hort. Brit. 407 (1830).
A. implexa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 368 (1842).

G. Dimidiatae.

- A. platycarpa*, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 145 (1858).
A. sericata, A. Cunn. ex Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 380 (1842).
 (*A. flavescens*, A. Cunn.)
A. retivenia, F.v.M. Fragm. iii. 128 (1863).
A. dineura, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 130 (1858).

Series VIII. Juliflorae.

A. Spicatae.

- A. Kochii*, (W. V. Fitzg.) Ewart et J. White, in Proc. Roy. Soc. Vict. n.s. xxiii. 285 (1911).

B. Rigidulae.

- A. craspedocarpa*, F.v.M. in Melb. Chemist. n.s. ii. 73 (1887). (*A. euphleba*, W. V. Fitz.)
A. Wickhami, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 379 (1842).
A. lysiphloca, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 137 (1858).
A. linarioides, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 371 (1842).
A. Kelleri, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales xvi. 468 (1891).
A. stipuligera, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 144 (1858).
A. ptychophylla, F.v.M. in l. c. 142.
A. sphaerostachya, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 305 (1904).
A. xiphophylla, E. Pritzel, in l. c. 305.
A. stigmatophylla, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 377 (1842).
A. Chisholmi, Bail. in Queensland Agric. Journ. iv. 47 (1899).
A. aeradenia, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 142 (1858).
A. curvicarpa, W. V. Fitzg. in Proc. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 114 (1917).
A. leptophleba, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 143 (1858).
A. megalantha, F.v.M. in l. c. 143.

C. Tetramerae.

- A. neurophylla*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 13 (1904).
A. malloclada, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 23 (1927).
A. cochliocarpa, Meissn. in Bot. Zeit. 10 (1855).

D. Stenophyllae.

- A. Coolgardiensis*, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, liii. 211 (1919).
A. aciphylla, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 627 (1853).
A. filifolia, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 369 (1842).
A. ephedroides, Benth. in l. c. 370.
A. Tratmaniana, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 8 (1904).
A. hynesiana, W. V. Fitzg. Journ. Bot. i. 20 (1912).
A. merinthophora, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 307 (1904).
A. Burkittii, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864). (*A. Randelliana*, W. V. Fitzg.)
A. micronera, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 19 (1844).
A. Jutsoni, Maiden, in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 262 (1917).
A. resinomarginea, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. palustris, Luehmann in Viet. Nat. Dec. 1896.
A. Grasbyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 251 (1917).
A. cyperophylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864).
A. longiphyllodinea, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 254 (1917).
A. inophloia, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 25 (1927).
A. sessilispica, Maiden et Blakely in l. c. 23.

- A. multispicata*, Benth. Fl. Austr. ii. 400 (1864).
A. pityoides, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 135 (1858).
A. xylocarpa, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 370 (1842).
A. Kimberleyensis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 112 (1917).
A. ramulosa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 15 (1904).
A. linophylla, W. V. Fitzg. in l. c. 16.
A. Websteri, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 25 (1917).
A. Jibberdingensis, Maiden et Blakely in l. c. 29.
A. oncinophylla, Lindl. (Bot. Reg. xxv.) Swan Riv. App. 15 (1839).
A. Fauntleroyi, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 26 (1927).
A. Tanumbirincense, Maiden in Ewart & Davies, Flora, N. Terr. 338 (1917).
A. arida, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 370 (1842).
A. trachycarpa, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 308 (1904).
A. aneura, F.v.M. in Schlecht. Linnæa xxvi. 627 (1853).
A. sibirica, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 189 (1898).
A. brachystachya, Benth. Fl. Austr. ii. 403 (1864).
A. cibaria, F.v.M. in Melb. Chemist. July, 1882.

E. Falcatae.

- A. Clementi*, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 26 (1927).
A. Cuthbertsoni, Luehmann in Vict. Nat. xiii. 117 (1897).
A. cognata, Maiden et Blakely, in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 28 (1927).
A. lasiocalyx, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 41 (1904).
A. doratoxylon, A. Cunn. in Field's N.S.W. 345 (1825).
A. proxima, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 105 (1917). (*A. camptoclada*, E.P.)
A. adsurgens, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 28 (1927).
A. eriopoda, Maiden et Blakely in l. c. 27.
A. numerosa, Maiden et Blakely in l. c. 27.
A. acuminata, Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 373 (1842). (*A. Oldfieldii*, Benth.)
A. signata, F.v.M. Fragm. iv. 7 (1864).
A. Stowardi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 269 (1917).
A. Beauverdiana, Ewart & Sharman in Proc. Roy. Soc. Vict. n.s. xxvii. 230 (1916).
A. stereophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 203 (1847).
A. delibrata (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 374 (1842).
A. quadrimarginea F.v.M. Fragm. x. 31 (1876).
A. Helmsleyi, Maiden in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 87 (1917).
A. plectocarpa, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. i. 375 (1842).
A. lentiginea, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 30 (1927).
A. pachycarpa, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 129 (1858).
A. anastrocarpa, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 31 (1927).
A. Cunninghamii, Hook. Ic. Plant. t. 165 (1837).
A. Gardneri, Maiden et Blakely in Journ. Roy. Soc. W.A. xiii. 32 (1927).
A. tumida, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 144 (1858).
A. oncinocarpa, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 378 (1842).
A. aulacocarpa, (A. Cunn.) Benth. l. c. 378.
A. retinervis, Benth. in l. c. 379.

F. Dimidiatae.

- A. latifolia*, Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 382 (1842).
A. holsericea, A. Cunn. in G. Don. Gen. Syst. ii. 407 (1832).
A. denticulosa, F.v.M. Fragm. x. 32 (1876).
A. humifusa, A. Cunn. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 382 (1842).

BIPINNATAE.

Series IX. Botryocephalae.

- A. pachyphloia*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales li. 116 (1917).

Series X. Pulchellae.

- A. pulchella*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 464 (1813). (*A. Goadbyi*, Domin.)
A. pentadenia, Lindl. Bot. Reg. t. 1521 (1832).
A. Gilberti, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 204 (1847).

- A. nigricans, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 3. v. 465 (1813).
 A. Taylorina, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. July. 1882.
 A. Drewiana, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, li. 273 (1917).
 A. obscura, D.C. Not. 6 Pl. Rar. Jard. Genev. 23. t. 3 (1829)
 A. insolita, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 310 (1904).
 A. strigosa, Link. Enum. Pl. Hort. Berol. 444 (1822).
 A. Drummondii, Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
 A. Moirii, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 312 (1904).
 A. grisea, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xlv. 174 (1920).

Series XI. Gumniferae.

- A. Farnesiana, Willd. Sp. Pl. iv. 1083 (1805).
 A. suberosa, (A. Cunn.) Benth. in Hook. Lond. Journ. Bot. i. 499 (1842).
 A. Bidwilli, Benth. in Schlecht. Linnaea xxvi. 629 (1853).
 A. pallida, F.v.M. in Journ. Linn. Soc. iii. 147 (1858).
4. *NEPTUNIA*, Lour. Fl. Cochinch. ii. 653 (1790).
 N. gracilis, Benth. in Hook. Journ. Bot. iv. 355 (1842).
 N. monosperma, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 300 (1864).
5. *DICHOSTACHYS*, Wight et Arnott Prodr. 271 (1834).
 D. spicata, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*D. Muelleri*, Benth.)

Caesalpinaceae.

1. *ERYTHROPHLEUM*, Afzel ex R.Br. in Tuckey's Narr. Congo. 430 (1818).
 E. chlorostachys, (F.v.M.) Hennings ex Taub. in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam. iii. 3. 127 (1892). (*E. Laboucherii*, F.v.M.)
2. *BAUHINIA*, Linn. Gen. ed. I. 126 (1736).
 B. Cunninghamii, Benth. Fl. Austr. ii. 295 (1864).
3. *LABICHEA*, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 507 (1825).
 L. cassioides, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 507 (1825).
 L. lanceolata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 41 (1837).
 L. punctata, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 15 (1839).
4. *PETALOSTYLES*, R.Br. in Sturt Exped. Central Austr. App. ii. 79 (1849).
 P. labicheoides, R.Br. in App. Sturt Exped. 80 (1849).
 P. millefolium, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 275 (1904).
5. *CASSIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 C. sophera, Linn. Sp. Pl. 379 (1753).
 C. venusta, F.v.M. Fragm. i. 165 (1859).
 C. notabilis, F.v.M. l. c. iii. 28 (1862).
 C. pleurocarpa, F.v.M. l. c. i. 223 (1859)
 C. neurophylla, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 147 (1918).
 C. retusa, Solaud, in Linnaea, xi. 72 (1842).
 C. australis, Sims, in Bot. Mag. t. 2676 (1826).
 C. Chatelainiana, Gaud. in Freyc. Voy. Bot. 485. t. 111 (1826).
 C. glutinosa, D.C. Prodr. ii. 495 (1825).
 C. cladophylla, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 147 (1918).
 C. pruinosa, F.v.M. Fragm. iii. 48 (1862).
 C. phyllodinea, R.Br. in App. Sturt Exped. 15 (1849).
 C. eremophila, A. Cunn. in T. Vog. Gen. Cass. Synops. 47 (1837).
 C. artemisioides, Gaud. in D.C. Prodr. ii. 495 (1825).
 C. Sturtii, R.Br. in App. Sturt Exped. 77 (1849).
 C. desolata, F.v.M. in Linnaea xxv. 389 (1852).
 C. oligophylla, F.v.M. Fragm. iii. 49 (1862).
 C. oligoclada, F.v.M. l. c. 49.
 C. cardiosperma, F.v.M. Fragm. x. 50 (1877).
 C. pumila, Lam. Encycl. Meth. i. 620 (1783).
 C. concinna, Benth. Fl. Austr. ii. 291 (1864).
 C. mimosoides, Linn. Sp. Pl. 379 (1753).
6. *CAESALPINIA*, Linn. Sp. Pl. 380 (1753).
 C. Bonducella, (Linn.) Fleming in Asiat. Research xi. 159 (1801).

Papilionaceae.

I. Podalyriaceae.

1. *JANSONIA*, Kipp. in Proc. Linn. Soc. i. 330 (1847).
J. pimeleoides, (Meissn.) Gardn. comb. nov. (*J. formosa*, Kipp.)
2. *BRACHYSEMA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
B. praemorsum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 25 (1844).
B. lanceolatum, Meissn. in l. c. i. 24.
B. latifolium, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
B. sericeum, (Sm.) Domin. New Add. Fl. W. Austr. 25 Prague, (1923)
(*B. undulatum*, Ker.)
B. subcordatum, Benth. Fl. Austr. ii. 11 (1864).
B. bracteolosum, F.v.M. Fragm. iv. 10 (1864).
B. aphyllum, Hook, Bot. Mag. t. 4481 (1849).
B. macrocarpum, Benth. Fl. Austr. ii. 13 (1864).
B. tomentosum, Benth. l. c. 13.
B. Chambersii, (F.v.M.) Benth. l. c. 13.
B. daviesioides, (Turez.) Benth. l. c. 13.
3. *OXYLOBIUM*, Andrews, Bot. Rep. t. 492 (1809). (*Callistachys*, Vent.)
O. lanceolatum, (Vent.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916 638
(1917).
O. ellipticum, (Labill.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 10 (1811).
O. linearifolium, (Don.) Domin, New Add. Fl. W. Austr. 26, Prague (1923).
(*O. lineare*, Benth.)
O. carinatum, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 18 (1864).
O. spathulatum, (Meissn.) Benth. l. c. 18.
O. obtusifolium, Sweet, Fl. Austral. t. 5 (1827).
O. microphyllum, Benth. Fl. Austr. ii. 19 (1864).
O. tricuspdatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 30 (1844).
O. spectabile, Endl. Nov. Stirp. Dec. 2 (1839).
O. atropurpureum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. 250 (1853). (*Nemcia*
atropurpurea (Turez.) Domin.)
O. coriaceum, (Sm.) Gardn. comb. nov. (*O. retusum*, R.Br.)
O. graniticum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. xxxiv. 185 (1898).
O. virgatum, Benth. Fl. Austr. ii. 22 (1864).
O. reticulatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 29 (1844).
O. capitatum, Benth. in Enum. pl. Hueg. 28 (1837).
O. cuneatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
O. melinocaule, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 224 (1904).
O. acutum, Benth. Fl. Austr. ii. 24 (1864).
O. parviflorum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
O. Kelsoi, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 4 (1904).
O. heterophyllum, (Turez.) Benth. Fl. Austr. ii. 25 (1864).
O. tetragonophyllum, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 226 (1904).
O. emarginatum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 167 (1920).
3. *CHORIZEMA*, Labill. Voy. I. 405 (1799).
C. Dicksonii, Grah. in Maund. Botanist, t. 106 (1841).
C. nervosum, T. Moore in Gard. Comp. 1852 (1852).
C. varium, Benth. in Lindl. Bot. Reg. 1839. t. 49 (1839).
C. cordatum, Lindl. Bot. Reg. 1838. t. 10 (1838).
C. ilicifolium, Labill. Voy. i. 405. t. 21 (1799).
C. rhombeum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 9 (1811).
C. diversifolium, D.C. Pl. Rar. Jard. Gen. 7c. 44 (1836).
C. glycinifolium, (Sm.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 1916, 615
(1917). (*C. angustifolium*, Benth.)
C. reticulatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 34 (1844).
C. trigonum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1853. i. 254 (1853).
C. genistoides, (Meissn.) Gardn. comb. nov. (*C. humile*, Turez.)
C. cytisoides, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 1853. i. 256 (1853).
C. uncinatum, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 38 (1904).
C. aciculare, (D.C.), Gardn. comb. nov. (*C. Henchmanni*, R.Br.)
C. ericifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 209 (1847).
5. *MIRBELIA*, Sm. in Koenig. et Sims Ann. Bot. i. 511 (1805).
M. dilatata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 21 (1811).

- M. racemosa*, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. i. 282 (1853).
M. subcordata, Turcz. in l. c. 282.
M. ovata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 77 (1844).
M. floribunda, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 12 (1839).
M. spinosa, Benth. Fl. Austr. ii. 36 (1864).
M. trichocalyx, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 28. Prague (1923).
M. depressa, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 230 (1904).
M. microphyloides, S. Moore, in Journ. Bot. 164 (1897).
M. microphylla, (Turcz.) Benth. Fl. Austr. ii. 37 (1864).
M. multicaulis, (Turcz.) Benth. l. c. 37.
M. ramulosa, (Benth.) Gardn. comb. nov. (*M. daviesioides*, Benth.)
M. viminalis, (A. Cunn.) Gardn. comb. nov. (*M. oxyclada*, F.v.M.)
- 6. ISOTROPIS**, Benth. in Enum. pl. Hueg. 28 (1837).
I. cuneifolia, (Sm.) Domin, New Add. Fl. W. Austr. 28, Prague (1923).
 (*I. striata*, Bth.)
I. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 31 (1844).
I. juncea, Turcz. in Bull. Mosc. i. 251 (1853).
I. canescens, F.v.M. Fragm. x. 51 (1876).
I. atropurpurea, F.v.M. l. c. iii. 16 (1862).
I. Forrestii, F.v.M. in Wing's S. Sc. Rec. ii. 252 (1882).
- 7. GOMPHOLOBIUM**, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 220 (1798).
G. ovatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 35 (1844).
G. amplexicaule, Meissn. in l. c. i. 36.
G. polymorphum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 11 (1811).
G. obcordatum, Turcz. in Bull. Soc. Mosc. i. 258 (1853).
G. marginatum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 11 (1811).
G. Eatoniae, F.v.M. in Viet. Natur. vi. 38 (1889).
G. Baxteri, Benth. Fl. Austr. ii. 46 (1864).
G. aristatum, Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. 72 (1838).
G. burtonioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 37 (1844).
G. capitatum, A. Cunn. in Lindl. Bot. Reg. i. 1563 (1839).
G. tomentosum, Labill. in pl. Nov. Holl. i. 106. t. 134 (1804).
G. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 40 (1844).
G. viscidulum, Meissn. in l. c. i. 39.
G. Shuttleworthii, Meissn. in l. c. i. 39.
G. venustum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 12 (1811).
G. Knightianum, Lindl. in Bot. Reg. t. 1468 (1837).
- 8. BURTONIA**, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 13 (1811).
B. subulata, Benth. Fl. Austr. ii. 50 (1864).
B. polyzyga, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 51 (1864).
B. villosa, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 41 (1844).
B. Hendersoni, (Paxt.) Benth. Fl. Austr. ii. 51 (1864).
B. asperula, S. Moore in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 167 (1920).
B. viscida, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 234 (1904).
B. gompholobioides, F.v.M. Fragm. x. 34 (1876).
B. scabra, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. II. iii. 12 (1811).
B. conferta, D.C. Prodr. ii. 106 (1825).
B. simplicifolia, F.v.M. et Tate in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xvi. 348 (1896).
- 9. JACKSONIA**, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 12 (1811).
J. floribunda, Endl. in Ann. des Wien. Mus. ii. 197 (1838).
J. carduacea, Meissn. in Bot. Zeit. 1855, 25 (1855).
J. decumbens, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 238 (1904).
J. eremodendron, E. Pritzel. in l. c. 239.
J. argentea, Gardn. in Bull. Forests Dep. xxxii. 54 (1923).
J. grevilleoides, Turcz. in Bull. Mosc. xxvi. i. 259 (1853).
J. petrophiloides, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 148 (1918).
J. aculeata, W. V. Fitzg. in l. c. 149.
J. foliosa, Turcz. in Bull. Mosc. xxvi. i. 260 (1853).
J. spinosa, (Labill.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 13 (1811).
J. stricta, Meissn. in Bot. Zeit. xiii. 27 (1855).
J. hakeoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 45 (1844).
J. furcellata, (Bonpl.) D.C. Prodr. ii. 107 (1824).
J. horrida, D.C. l. c. 107.

- J. mollissima*, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. ii. 22 (1905).
J. sericea, Benth. in Enum. pl. Hueg. 31 (1837).
J. Sternbergiana, Hueg. Bot. Arkiv. t. 3 (1837).
J. Forrestii, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S.W. ser. II. ii. 194 (1887).
J. thesioides, (A. Cunn.) Benth. in Ann. Wien. Mus. ii. 74 (1838).
J. compressa, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 260 (1853).
J. calycina, Domin, New Add. Flora W. Austr. 31 Prague (1923).
J. cupulifera, Meissn. in Bot. Zeit. 27 (1855).
J. restioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 46 (1844).
J. velutina, Benth. Fl. Austr. ii. 60 (1864).
J. Lehmanni, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 46 (1844).
J. racemosa, Meissn. in l. c. ii. 212 (1847). (*J. hemisericea*, Herbert.)
J. umbellata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 261 (1853).
J. nematoclada, F.v.M. Fragm. x. 50 (1876).
J. rhadinoclada, F.v.M. l. c. 38.
J. capitata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 45 (1844).
J. alata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 30 (1837).
J. aphylla, (Turcz.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles 1916. 629 (1917).
(*J. piptomeris*, Benth.)
J. pteroclada, F.v.M. Fragm. x. 37 (1876).
J. macrocalyx, Meissn. in Bot. Zeit. 1855. 26 (1855).
10. *SPHAEROLOBIUM*, Sm. in Koenig et Sims Ann. Bot. i. 509 (1805).
S. linophyllum, (Hueg.) Benth. Fl. Austr. ii. 64 (1864).
S. nudiflorum, (Meissn.) Benth. l. c. 64.
S. gracile, Benth. l. c. 64.
S. racemosum, Benth. l. c. 65.
S. alatum, Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
S. vimineum, Sm. in Koenig et Sims, Ann. Bot. i. 509 (1805).
S. grandiflorum, (R.Br.) Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
S. fornicatum, Benth. l. c. 32.
S. medium, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 14 (1811).
S. scabriusculum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 214 (1847).
S. macranthum, Meissn. in l. c. 213.
S. daviesioides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 266 (1853).
11. *VIMINARIA*, Smith Exotic Bot. 51. t. 27 (1804).
V. denudata, Sm. Exot. Bot. 51. t. 27 (1804).
12. *ERICHSENIA*, Hemsl. in Hook. Ic. plant. t. 2777 (1905).
E. uncinata, Hemsl. in Hook. Ic. plant. t. 2777 (1905).
13. *DAVIESIA*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 220 (1798).
Series 1. *Involucratae*, Benth.
D. cordata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 259 (1808).
D. ovata, Benth. Fl. Austr. ii. 72 (1864).
D. orenulata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 265 (1853).
D. oppositifolia, Endl. in Ann. Wien. Mus. ii. 199 (1838).
D. alternifolia, Endl. in l. c. 199.
D. elongata, Benth. Fl. Austr. ii. 74 (1864).
Series 2. *Umbellatae*, Benth.
D. pedunculata, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
D. arthropoda, F.v.M. Fragm. viii. 22 (1874).
D. mollis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 263 (1853).
Series 3. *Racemosae*, Benth.
D. costata, E. Checl. in Journ. Roy. Soc. W.A. vi. (pt. i.) 35 (1920).
D. buxifolia, Benth. Fl. Austr. ii. 75 (1864).
D. horrida, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 54 (1844).
D. reclinata, (A. Cunn.) Benth. Fl. Austr. ii. 77 (1864).
D. obtusifolia, F.v.M. Fragm. ii. 104 (1861).
D. obovata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 261 (1853).
Series 4. *Calamiformes*, Benth.
D. Croniniana, F.v.M. in Vict. Nat. x. 194 (1894).
D. longifolia, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
D. chordophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 48 (1844).
D. nematophylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 78 (1864).

Series 5. *Fasciculatae*, Benth.

- D. daphnoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 54 (1844).
- D. nudiflora, Meissn. in l. c. 53.
- D. rhombifolia, Meissn. in l. c. 56.
- D. cardiophylla, F.v.M. Fragm. ii. 105 (1861).
- D. Drummondii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 53 (1844).
- D. ulicina, Sm. in Koenig et Sims Ann. Bot. i. 506 (1805).
- D. Grahami, Ewart et Jean White, in Proc. Roy. Soc. Viet. n. s. xxii. 12 (1909).
- D. uniflora, Herbert, in Journ. Roy. Soc. W.A. viii. 37 (1922).

Series 6. *Teretifoliae*, Benth.

- D. pachyphylla, F.v.M. Fragm. iv. 15 (1864).
- D. teretifolia, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 82 (1864).
- D. hakeoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 47 (1844).
- D. colletioides, Meissn. in l. c. 48.
- D. reversifolia, F.v.M. Fragm. i. 145 (1859).
- D. incrassata, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 255 (1808).
- D. brevifolia, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austr. ii. 201 (1838).
- D. acanthoclona, F.v.M. Fragm. x. 32 (1876).
- D. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 50 (1844).
- D. spinosissima, Meissn. in l. c. 51.
- D. pachylina, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 263 (1853).

Series 7. *Verticales*, Benth.

- D. quadrilatera, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
- D. striata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 264 (1853).
- D. polyphylla, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
- D. microphylla, Benth. Fl. Austr. ii. 86 (1864).
- D. Dielsii, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 249 (1904).

Series 8. *Decurrentes*, Benth.

- D. flexuosa, Benth. in Enum. pl. Hueg. 32 (1837).
- D. pectinata, Lindl. in Mitch. Three Exped. Austr. ii. 151 (1838).
- D. trigonophylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 213 (1847).
- D. epiphylla, Meissn. in Bot. Zeit. 27 (1855).

Series 9. *Aphyllae*, Benth.

- D. euphorbioides, Benth. Fl. Austr. ii. 88 (1864).
- D. divaricata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 31 (1837).
- D. paniculata, Benth. in l. c. 31.
- D. aphylla, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 88 (1864).
- D. juncea, Sm. in Trans. Linn. Soc. ix. 260 (1808).

14. *AOTUS*, Sm. in Koenig et Sims Ann. of Bot. i. 504 (1805).

- A. villosa, Sm. in Ann. Bot. i. 504 (1805).
- A. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 214 (1847).
- A. phyllicoides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 92 (1864).
- A. genistoides, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 268 (1853).
- A. carinata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 215 (1847).
- A. passerinoides, Meissn. in l. c. i. 61 (1844).
- A. diffusa, Gardn. Ms.
- A. Tietkinsii, F.v.M. Fragm. x. 33 (1876).
- A. cordifolia, Benth. in Enum. pl. Hueg. 33 (1837).

15. *PHYLLOTA*, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 33 (1837).

- P. barbata, Benth. in Enum. pl. Hueg. 33 (1837).
- P. gracilis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxvi. i. 267 (1853).

16. *PULTENAEA*, Sm. Bot. Nov. Holl. 35 t. 12 (1793).

- P. Luehmanni, Maiden in Viet. Nat. xxii. 100.
- P. Georgei, (Hemsl.) Gardn. comb. nov. (*Phyllota Georgei*, Hemsl. *Pultenaea astipulea*, Herbert.)
- P. humilis, (S. Moore) Gardn. comb. nov. (*Phyllota humilis*, S. Moore.)
- P. capitata, (Turcz.) Gardn. comb. nov. (*Pultenaea urodon*, Benth.)
- P. arachnoidea, Gardn. Ms.
- P. lycopodioides, (S. Moore), Gardn. comb. nov. (*Phyllota lycopodioides*, S. Moore.)
- P. Skinneri, F.v.M. Fragm. viii. 166 (1874).

- P. Drummondii*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
P. barbata, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 38 (1904).
P. pinifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 220 (1847).
P. conferta, Benth. Fl. Austr. ii. 118 (1864).
P. pauciflora, Scott in Kew Bull. 1914, 378 (1914).
P. reticulata, (Sm.) Benth. Fl. Austr. ii. 119 (1864).
P. ochreatea, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75 (1844).
P. aspalathoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 73.
P. obcordata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 120 (1864).
P. arida, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 258 (1904).
P. rotundifolia, (Turez.) Benth. Fl. Austr. ii. 121 (1864).
P. calycina, (Turez.) Benth. l. c. 121.
P. spinulosa, (Turez.) Benth. l. c. 121.
P. symbifolia, J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. South Austr. xxxix. 96 (1915).
P. vestita, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 19 (1811).
P. strobilifera, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 75 (1844).
P. ericifolia, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
P. verruculosa, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 278 (1853).
P. empetrifolia, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 76 (1844).
P. radiata, H. B. Williamson, in Proc. Roy. Soc. Vict. xxxiii. (n.s.) 137 (1921).
P. adunca, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 279 (1853).
P. neurocalyx, Turez. l. c. 281.
P. tenuifolia, R.Br. in Bot. Mag. t. 2086 (1819).

17. *GASTROLOBIUM*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).

Series i. *Axillares*, Benth.

- G. pyramidale*, T. Moore, in Gard. Comp. i. 81 (1852).
G. Lehmanni, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 70 (1844).
G. pulchellum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 274 (1853).
G. stipulare, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 218 (1847).
G. Brownii, Meissn. in l. c. i. 71 (1844).
G. reticulatum, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 99 (1864).
G. truncatum, Benth. l. c. 99.
G. crispifolium, Domin, New Add. Fl. W. Austr. 35 Prague (1923).
G. spathulatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
G. Stowardi, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 169 (1920).
G. plicatum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 274 (1853).
G. tricuspidatum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 66 (1844).
G. obovatum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 14 (1839).
G. epacridioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 72 (1844).
G. trilobum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. ilicifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 67 (1844).

Series ii. *Racemosae*, Benth.

- G. villosum*, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. polystachyum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 217 (1847).
G. ovalifolium, Henfr. in Gard. Comp. i. 41 (1852).
G. grandiflorum, F.v.M. Fragm. iii. 17 (1862).
G. pycnostachyum, Benth. Fl. Austr. ii. 103 (1864).
G. spinosum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. rotundifolium, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 216 (1847).
G. densifolium, Gardn. in Journ. Roy. Soc. W.A. xii. 69 (1926).
G. floribundum, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 170 (1920).
G. microcarpum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 70 (1844).
G. oxylobioides, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. calycinum, Benth. in l. c. 13. (*G. sagittulatum*, S. Moore.)
G. Callistachys, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 216 (1847).
G. Forrestii, Ewart in Journ. Roy. Soc. N.S. Wales, (1908) xlii. 188 (1909).
G. stenophyllum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 275 (1853).
G. crassifolium, Benth. Fl. Austr. ii. 105 (1864).
G. parvifolium, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 13 (1839).
G. hamulosum, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 218 (1847).
G. velutinum, Lindl. in Paxt. Fl. Gard. iii. 76. f. 270 (1853).
G. bidens, Meissn. in Bot. Zeit. xlii. 29 (1855). (*G. Laytonii*, J. White.)
G. bilobum, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).
G. seorsifolium, F.v.M. Fragm. x. 35 (1876).

18. *EUTAXIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iii. 16 (1811).
E. cuneata, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 65 (1844).
E. obovata, (Labill.) Gardn. comb. nov. (*E. myrtilifolia*, R.Br.)
E. epacridioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 64 (1844).
E. virgata, Benth. in Enum. Pl. Hueg. 34 (1837).
E. densifolia, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 271 (1853).
E. dillwynioides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 63 (1844).
E. parvifolia, Benth. in Enum. pl. Hueg. 34 (1837).
E. microphylla, (R.Br.) Gardn. comb. nov. (*E. empetrifolia*, Schlecht.)
19. *LATROBEA*, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
L. abnormis, (F.v.M.) Druce, in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Isles, 1916, 631 (1917). (*L. pungens*, Benth.)
L. genistoides, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 219 (1847).
L. Brunonis, (Benth.) Meissn. in l. c. 219.
L. tenella, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 141 (1864).
L. hirtella, (Turcz.) Benth. l. c. 142.
L. diosmifolia, Benth. l. c. 142.
20. *DILLWYNIA*, Sm. in Koenig et Sims, Ann. of. Bot. i. 510 (1805).
D. incerta, Domin, Zvlastno Otisk Z Vestnika Kral. Ces. Spole. Nauk II. 37 (1923).
D. dillwynioides, (Meissn.) Druce in Rep. Bot. Exch. Cl. Brit. Is. 620 (1917). (*D. Preissii*, Benth.)
D. acerosa, S. Moore, in Journ. Linn. Soc. Bot. xxxiv. 187 (1898).
D. pungens, (Sweet) Mackay, in den Annal des Wien. Mus. ii. 79 (1838).
D. cinerascens, R.Br. in Bot. Mag. t. 2247 (1821).
D. divaricata, (Turcz.) Benth. Fl. Austr. ii. 151 (1864).
D. uncinata, (Turcz.) Gardn. comb. nov. (*D. patula*, F.v.M.)
21. *EUCHILOPSIS*, F.v.M. in Melb. Chemist June (1882).
E. linearis, (Benth.) F.v.M. in Melb. Chem. June (1882). (*Sphaerolobium euchilus*, Benth.)
- II. Genisteae.
22. *BOSSIAEA*, Vent. Jard. Cels. i. 7. t. 7 (1800).
Series i. *Oppositifoliae*, Benth.
B. dentata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 156 (1864).
B. aquifolium, Benth. l. c. 157.
B. Laidlawiana; Tovey et Morris in Proc. Roy. Soc. Vict. (n.s.) xxxiv. 207 (1922).
B. Webbii, F.v.M. in Melb. Chem. et Drugg. Dec. (1882).
B. strigillosa, Benth. Fl. Austr. ii. 157 (1864).
- Series ii. *Normales*, Benth.
B. biloba, Benth. in Enum. pl. Hueg. 36 (1837).
B. Preissii, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 82 (1844).
B. concinna, Benth. Fl. Austr. ii. 161 (1864).
B. linophylla, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 268 (1812).
B. disticha, Lindl. Bot. Reg. 1841, Misc. 38 (1841).
B. pulchella, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 84 (1844).
B. peduncularis, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 287 (1853).
B. rufa, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. iv. 267 (1812).
B. Walkeri, F.v.M. Fragm. ii. 120 (1861).
B. leptacantha, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 263 (1904).
B. phylloclada, F.v.M. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. 52 (1859).
- Series iii. *Eriocarpae*, Benth.
B. ornata, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. ii. 158 (1864).
B. eriocarpa, Benth. in Enum. pl. Hueg. 36 (1837).
B. divaricata, Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxvi. i. 285 (1853).
B. spinosa, (Turcz.) Domin, New Add. Fl. W. Austr. (Prague) 39 (1923). (*B. calycina*, Benth.)
23. *TEMPLETONIA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 269 (1812).
T. retusa, (Vent.) R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 269 (1812).
T. Drummondii, Benth. Fl. Austr. ii. 169 (1864).

- T. aculeata*, (F.v.M.) Benth. l. c. 170.
T. egena, (F.v.M.) Benth. l. c. 170.
T. Battii, F.v.M. in Melb. Chem. et Drugg. n.s. ii. 31 (1887).
T. sulcata, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 171 (1864).
24. *HOVEA*, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 275 (1812).
H. acanthoclada, (Turcz.) F.v.M. Fragm. iv. 15 (1864).
H. chorizemifolia, (Sweet) D.C. Prodr. ii. 116 (1825).
H. elliptica, (Sm.) D.C. Prodr. ii. 115 (1825). (*H. Celsi*, Bonpl.)
H. trisperma, Benth. in Enum. pl. Hueg. 37 (1837).
H. stricta, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 79 (1844).
H. pungens, Benth. in Enum. pl. Hueg. 37 (1837).
25. *GOODIA*, Salisb. Parad. Lond. t. 41 (1806).
G. lotifolia, Salisb. Parad. Lond. t. 41 (1806).
26. *CROTALARIA*, Dill. ex Linn. Gen. ed. I. 218 (1737).
- Sect. i. *Simplicifoliae*, Benth.
C. alata, Hamilt. in D. Don. Prodr. Fl. Nepal. 241 (1825).
C. retusa, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. Mitchellii, Benth. in Mitch. Journ. Trop. Austr. 120 (1848).
C. linifolia, Linn. fil. Suppl. 322 (1781).
C. membranacea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy Soc. W.A. iii. 150 (1918).
C. verrucosa, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. crispata, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 179 (1864).
C. juncea, Linn. Sp. Pl. 714 (1753).
- Sect. ii. *Unifoliolatae*, Benth.
C. Novae-Hollandiae, D.C. Prodr. ii. 127 (1825).
C. crassipes, Hook. Icon. plant. t. 830 (1852).
C. Cunninghamii, R.Br. in Sturt's Exped. ii. App. 71 (1849).
- Sect. iii. *Trifoliolatae*, Bak.
C. trifoliastrum, Willd. Sp. Pl. iii. 983 (1753).
C. laburnifolia, Linn. Sp. Pl. 715 (1753).
C. incana, Linn. Sp. Pl. 716 (1753).
C. dissitiflora, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 386 (1848).
C. Benthamiana, E. Pritzl, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 267 (1904).
- **LUPINUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **L. pilosus*, Murr. (Europ. austr.)
 **L. hirsutus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
 **L. angustifolius*, Linn. (Reg. Mediterr.)
 **L. luteus*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **ULEX*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **U. europaeus*, Linn. (Europ. occ.)
- **CYTISUS*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
 **C. prolifer*, Linn. f. (Ins. Canar.)
- III. Trifolieae.
27. *TRIGONELLA*, Linn. Gen. ed. i. 351 (1737).
T. suavissima, Lindl. in Mitch. Three Exped. i. 255 (1838).
- **MEDICAGO*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. i. 225 (1737).
 **M. lupulina*, Linn. (Geront. bor. temp.)
 **M. orbicularis*, All. (Reg. Mediterr.; Abyss.)
 **M. scutellata*, All. (Reg. Mediterr.)
 **M. denticulata*, Willd. (Geront. bor. temp.)
 **M. apiculata*, Willd. (Geront. bor. temp.)
 **M. iaciniata*, All. (Reg. Mediterr.)
 **M. echinus*, D.C. (Reg. Mediterr.)
 **M. arabica*, (Linn.) All. (Europ.) (*M. maculata*, Willd.)
 **M. minima*, (Linn.) Grufb. (Europ.)
- **MELILOTUS*, (Tourn.) Hall. Enum. Stirp. Helv. ii. 587 (1742).
 **M. indica*, All. (Europ.; Asia.)
 **M. alba*, Desr. (Europ.; Asia.)

**TRIFOLIUM*, (Tourn.) Linn. Gen. ed. i. 229 (1737).

Subg. I. *Trifolium*, Gren. et Godr.

Sect. i. *Chronosemium*, Ser.

- **T. agrarium*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
- **T. procumbens*, Linn. (Europ.; Afr. et Asia bor.)
- **T. dubium*, Sibth. (Europ.)
- **T. filiforme*, Linn. (Europ. Reg. Cauc.)

Sect. ii. *Euamoria*, Gib. et Belli.

- **T. hybridum*, Linn. (Europ. austr. Asia Min.)
- **T. repens*, Linn. (Geront. bor. temp.)
- **T. cernuum*, Brot. (Lusitan.)
- **T. glomeratum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. suffocatum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr. et Cauc.)

Sect. iii. *Galcaria*, Presl.

- **T. resupinatum*, Linn. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.)
- **T. tomentosum*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **T. fragiferum*, Linn. (Europ.; Oriens.; Reg. Himal.)

Subg. II. *Lagopus*, Lojac.

Sect. i. *Eulagopus*, Lojac.

- **T. striatum*, Linn. (Europ. austr.; Asia Min.)
- **T. arvense*, Linn. (Europ.; As. et Afr. bor.; Oriens.)
- **T. scabrum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. Alexandrinum*, Linn. (Aegypt.; Asia Min.)
- **T. incarnatum*, Linn. (Europ. austr.)
- **T. stellatum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. pratense*, Linn. (Europ.; Asia temp.)
- **T. lappaceum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. Cherleri*, Linn. (Reg. Mediterr.)
- **T. angustifolium*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. maritimum*, Huds. (Europ. oec.; Reg. Mediterr.)

Sect. ii. *Calycomorphum*, Presl.

- **T. subterraneum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
- **T. globosum*, Linn. (Byzant.; Asia Min.)

IV. Loteae.

28. *LOTUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).

- **L. uliginosus*, (Linn.) Schkuhr. (Europ. Reg. Mediterr.) (*L. major*, Sm.)
- **L. hispidus*, Desf. (Europ. et Afr. bor. oec.)
- **L. angustissimus*, Linn. (Europ.; Oriens.; As. bor.)
- L. australis*, Andr. Bot. Rep. t. 624 (1810).

V. Galegeae.

29. *INDIGOFERA*, Linn. Hort. Cliff. 187 (1737).

- I. linifolia*, Retz. Obs. iv. 29 (1786).
- I. enneaphylla*, Linn. Mant. ii. 272 (1771).
- I. trifoliata*, Linn. Cent. Pl. ii. 29 (1759).
- I. trita*, Linn. fil. Suppl. 335 (1781).
- I. parviflora*, Heyne in Wall. Cat. 5457 (1828).
- I. viscosa*, Lam. in Encycl. Meth. iii. 247 (1789).
- I. hirsuta*, Linn. Sp. Pl. 751 (1753).
- I. monophylla*, D.C. Prodr. ii. 222 (1825).
- I. rugosa*, Benth. Fl. Austr. ii. 199 (1864).
- I. australis*, Willd. Sp. Pl. iii. 1235 (1800).
- I. Georgei*, E. Pritzel, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 261 (1904).
- I. boviparda*, A. Morrison, in Journ. Bot. 1. 166 (1912).
- I. brevidens*, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 385 (1848).

30. *PSORALEA*, Linn. Gen. ed. ii. 358 (1742).

- P. badocana*, (Blanco) Benth. Fl. Austr. ii. 190 (1864).
- P. Martini*, F.v.M. Fragm. v. 11 (1865).
- P. Archeri*, F.v.M. Fragm. iv. 21 p.p. (1864).
- P. cuneata*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 151 (1918).
- P. balsamica*, F.v.M. in Trans. Vict. Inst. iii. 55 (1858).

- P. virens*, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 151 (1918).
P. plumosa, F.v.M. Fragm. iv. 22 (1864).
P. pustulata, F.v.M. in Trans. Viet. Inst. iii. 54 (1858).
P. lachnostachys, F.v.M. Fragm. iii. 105 (1863).
P. eriantha, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 131 (1848).
P. patens, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 9 (1838).
P. cinerea, Lindl. in l. c. ii. 65.
P. leucantha, F.v.M. in Trans. Viet. Inst. iii. 54 (1858).
P. Testariae, F.v.M. Fragm. v. 45 (1865).
31. *PTYCHOSEMA*, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 16 (1839).
P. pusillum, Benth. in Lindl. Swan Riv. App. 16 (1839).
P. trifoliatum, F.v.M. in Wing's South Sci. Rec. ii. 72 (1882).
32. *TEPHROSIA*, Pers. Syn. pl. ii. 328 (1807).
T. coriacea, Benth. Fl. Austr. ii. 204 (1864).
T. Forrestiana, F.v.M. Fragm. xi. 98 (1880).
T. uniovulata, F.v.M. l. c. 70.
T. flammea, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 204 (1864).
T. conspicua, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 152 (1918).
T. leptoclada, Benth. Fl. Austr. ii. 207 (1864).
T. Stuartii, Benth. l. c. 207.
T. eriocarpa, Benth. l. c. 207.
T. phacosperma, (F.v.M.) Benth. l. c. 208.
T. filipes, Benth. l. c. 208.
T. remotiflora, (F.v.M.) Benth. l. c. 209.
T. stipuligera, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 154 (1918).
T. macrocarpa, Benth. Fl. Austr. ii. 209 (1864).
T. purpurea, Pers. Syn. pl. ii. 330 (1807).
T. Bidwilli, Benth. Fl. Austr. ii. 210 (1864).
T. rosea, (F.v.M.) Benth. l. c. 211.
33. *SESBANIA*, Scop. Introd. 308 (1777).
S. grandiflora, Pers. Synops. pl. ii. 316 (1807).
S. aculeata, Pers. l. c. 316.
S. Ægyptiaca, Pers. l. c. 316.
34. *CLIANTHUS*, Banks et Soland. in G. Don. Syst. ii. 468 (1832).
C. speciosus, (G. Don.) Aschers et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. vi. 725 (1909).
 (*C. Dampieri*, A. Cunn.) (*Donia speciosa*).
35. *SWAINSONA*, Salisb. Parad. Lond. i. 28 (1806).
S. phacoides, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 363 (1848).
S. Burkei, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 218 (1864).
S. oligophylla, (F.v.M.) Benth. l. c. 219.
S. occidentalis, F.v.M. Fragm. iii. 46 (1862).
S. paradoxa, W. V. Fitzg. in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 5 (1904).
S. stenodonta, F.v.M. Fragm. xi. 70 (1879).
S. gracilis, Benth. Fl. Austr. ii. 220 (1864).
S. Drummondii, Benth. l. c. 220.
S. Oliveri, F.v.M. in Wing's South. Sci. Rec. ii. 152 (1882).
S. canescens, (Benth.) F.v.M. Fragm. iii. 46 (1862).
S. Beasleyana, F.v.M. in Chem. et Drugg. Austral. 84 (1887).
S. stipularis, F.v.M. in Linnæa xxv. 393 (1852). (*S. phacifolia*, F.v.M.)
S. tenuis, E. Pritzel in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 270 (1904).
S. Kingii, F.v.M. in Trans. Proc. Roy. Soc. Viet. xxii. 53 (1887).
S. oroboides, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 222 (1864).
S. unifoliolata, F.v.M. Fragm. viii. 226 (1874).
S. microphylla, A. Gray in Bot. Amer. Expl. Exped. i. 410 (1854).
S. colutioides, F.v.M. Fragm. x. 6 (1876).
S. Macullochiana, F.v.M. Fragm. vii. 25 (1869).
36. *GLYCYRRHIZA*, (Tourn.) Linn. Corr. Gen. 13 (1737).
G. acanthocarpa, (Lindl.) J. M. Black, in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xliii.
 351 (1919).

VI. Hedysareae.

37. *ÆSCHYNOME*, Linn. Gen. ed. i. 350 (1737).
Æ. indica, Linn. Sp. Pl. 713 (1753).
38. *ZORNIA*, Gmel. Syst. 1076, 1096 (1791).
Z. diphylla, Pers. Syn. ii. 218 (1807).
39. *DESMODIUM*, Desv. Journ. Bot. i. 122. t. 5 (1813).
D. biarticulatum, (D.C.) F.v.M. Fragm. ii. 121 (1861).
D. campylocaulon, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 233 (1864).
D. neurocarpum, Benth. l. c. 234.
D. trichostachyum, Benth. l. c. 234.
D. parvifolium, D.C. Prodr. ii. 334 (1825).
40. *ALYSICARPUS*, Neck. elem. Bot. iii. 15 (1790).
A. rugosus, (Willd.) D.C. Prodr. ii. 353 (1825).
A. Cheelii, Gardn. in Bull. For. Dep. xxxii. 57 (1923).
41. *URARIA*, Desv. Journ. Bot. i. 122. t. 5. f. 19 (1813).
U. cylindracea, Benth. Fl. Austr. ii. 237 (1864).

VII. Viciae.

- **VICIA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **V. sativa*, Linn. (Europ.; Afr. bor.; Oriens.)
 **V. hirsuta*, (Linn.) S. F. Gray. (Europ.; Asia et Afr. bor.)
 **V. tetrasperma*, (Linn.) Moench. (Europ.; Oriens.)
 **LATHYRUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
 **L. latifolius*, Linn. (Europ.)
 **L. odoratus*, Linn. (Italia.)
42. *ABRUS* Linn. Hort. Cliff. 488 (1737).
A. preceptorius, Linn. Syst. ed. xii. 533 (1767).

VIII. Phaseoleae.

43. *GLYCINE*, Linn. Gen. ed. i. 349 (1737).
G. falcata, Benth. Fl. Austr. ii. 243 (1864).
G. clandestina, Wendl. Bot. Beob. 54 (1798).
G. tabacina, (Labill.) Benth. Fl. Austr. ii. 245 (1864).
G. sericea, (F.v.M.) Benth. l. c. 245.
44. *KENNEDYA*, Vent. Jard. Malm. 104. t. 104 (1804).
K. nigricans, Lindl. Bot. Reg. t. 1715 (1835).
K. Beckxiana, F.v.M. Fragm. xi. 98 (1198) (1880).
K. prorepens, F.v.M. l. c. viii. 225 (1874).
K. prostrata, R.Br. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 299 (1812).
K. eximia, Lindl. in Paxt. Mag. xvi. 35 (1849).
K. microphylla, Meissn. in Lehm. Pl. Preiss. i. 91 (1844).
K. carinata, (Benth.) Domin, New Add. Fl. West. Austr. (Prague) 41 (1923). (*K. parviflora*, Meissn.)
K. Stirlingii, Lindl. Bot. Reg. t. 1845 (1837).
K. glabrata, (Benth.) Lindl. l. c. t. 1838 (1837).
K. macrophylla, (Meissn.) Benth. Fl. Austr. ii. 252 (1864).
K. coccinea, Vent. Jard. Malm. 104. t. 105 (1804).
45. *HARDENBERGIA*, Benth. in Enum. pl. Hueg. 40 (1837).
H. Comptoniana, (Andr.) Benth. in Enum. pl. Hueg. 41 (1837).
46. *ERYTHINA*, Linn. Gen. ed. i. 216 (1737).
E. vespertilio, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 218 (1848).
47. *CANAVALIA*, D.C. Mem. Leg. ix. 375 (1825).
C. ensiformis, D.C. Prodr. ii. 404 (1825).
C. obtusifolia, D.C. l. c. 404.
48. *ATYLOSIA*, Wight et Arnott, Prodr. 257 (1834).
A. marmorata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. ii. 263 (1864).
A. lanceolata, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 156 (1918).
A. grandifolia, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 264 (1864).
A. cinerea, (F.v.M.) Benth. l. c. 264.

49. *RHYNCHOSIA*, Lour. Fl. Cochinch. 460 (1790).
R. rhomboidea, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. ii. 265 (1864).
R. acutifolia, (F.v.M.) Benth. l. c. 266.
R. rostrata, Benth. l. c. 266.
R. minima, D.C. Prodr. ii. 385 (1825).
R. australis, Benth. Fl. Austr. ii. 267 (1864).
50. *FLEMINGIA*, Roxb. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 349 (1812).
F. lineata, Roxb. in Ait. Hort. Kew ed. 2. iv. 350 (1812).
F. pauciflora, Benth, Fl. Austr. ii. 269 (1864).
51. *PHASEOLUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. i. (1735).
P. vulgaris, Linn. Sp. Pl. 723 (1735). (? indigenous.)
52. *VIGNA*, Savi. Dissert. 6 (1824).
V. lanceolata, Benth. in Mitch. Trop. Austr. 350 (1848).
-

ENUMERATIO PLANTARUM AUSTRALIAE
OCCIDENTALIS.

Auctore

CHARLES A. GARDNER.

PART III.

(GERANIACEAE—COMPOSITAE)

Fasciculus III. editus Majo 1931.

PERTH:
WESTERN AUSTRALIA.

GERANIALES.

Geraniaceae.

1. *GERANIUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
G. pilosum, Forst. ~~Fl. Bor. Austr. 91 (1787)~~ (*G. dissectum*, Linn. var. *australe*, Benth.)
**G. molle*, Linn. (Europ.; Asia bor.; Oriens.)
2. *ERODIUM*, L'Her. Geran. t.l. ad 6 (1787).
E. cygnorum, Nees in Lehm. Pl. Preiss. i. 162 (1844).
**E. botrys*, (Cav.) Bertol. (Reg. Mediterr.)
**E. moschatum*, (Linn.) L'Her. (Reg. Mediterr.; Oriens.)
**E. cicutarium*, (Linn.) L'Her. (Reg. Mediterr.; As. med.).
3. *PELARGONIUM*, (Burm.) L'Her. Geran. tt. 7-35, 43, 44 (1787).
P. australe, Willd. Sp. Pl. iii. 675 (1800).
P. Rodneyanum, Lindl. in Mitch. Three Exped. ii. 144 (1838).
P. Havlasae, Domin, Zvlastni Otisk Z Vestnika Kral. Ces. Spolec. Nauk tr. II. (1923).
P. inodorum, Willd. Hort. Berol. 1. t. 34 (1806).

Oxalidaceae.

1. *OXALIS*, Linn. Gen. ed. I. 134 (1737).
O. corniculata, Linn. Sp. Pl. 435 (1753).
**O. cernua*, Thunb. (Afr. austr.)
**O. variabilis*, Jacq. (Afr. austr.)
**O. polyphylla*, Jacq. (Afr. austr.)

Linaceae.

1. *LINUM*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
L. marginale, A. Cunn. ex Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. vii. 169 (1848).
**L. flavum*, Linn. (Europ. austr.; Reg. Caucas.)
**L. gallicum*, Linn. (Reg. Mediterr.; Abyssin.)

Zygophyllaceae.

1. *ZYGOPHYLLUM*, Linn. Syst. ed. I. (1735).
Z. apiculatum, F.v.M. in Linnaea xxv. 373 (1852).
Z. Billardieri, D. C. Prodr. i. 705 (1824).
Z. glaucescens, F.v.M. Pl. Viet. i. 228 (1862).
Z. ovatum, A. J. Ewart, in Proc. Roy. Soc., N.S.W. xlii. 197 (1908).
Z. idiocarpum, F.v.M. in Linnaea xxv. 372 (1852).
Z. fruticosum, D. C. Prodr. i. 705 (1824).
2. *TRIBULUS*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
T. terrestris, Linn. Sp. Pl. 387 (1735).
T. occidentalis, R.Br. in Sturt's Exped. Central Austr. ii. App. 69 (1849).
T. macrocarpus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 289 (1863).
T. Forrestii, F.v.M. in Wing's South, Sci. Rec. Nov. (1885).
T. platypterus, Benth. Fl. Austr. i. 289 (1863).
T. hirsutus, Benth. l. c. 289.
T. affinis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 157 (1918).
T. pentandrus, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 290 (1863).
T. curvicaarpus, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 158 (1918).
T. Solandri, (R.Br.) F.v.M. Pl. Viet. i. 99 (1860).
T. angustifolius, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 290 (1863).
T. astrocarpus, F.v.M. Fragm. xii. 4 (1882).
3. *NITRARIA*, Linn. Syst. ed. x. 1044 (1759).
N. Schoberi, Linn. Syst. ed. x. 1044 (1759).

Rutaceae.

1. *GEIJERA*, Schott, Rutae. 7 t. 4 (1834).
G. linearifolia (D.C.), Black, Fl. South Austr. 346 (1924) (*G. parviflora*, Lindl.),
var. *crassifolia*, Benth.)

2. *BORONIA*, Smith, Tracts, 285 (1798).Series i. *Valvatae*, Benth.

- B. pauciflora, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 158 (1918).
- B. artemisiaefolia, F.v.M. Fragm. i. 66 (1858).
- B. filicifolia, (A. Cunn.) Benth. Fl. Austr. i. 311 (1863).
- B. alata, Smith in Trans. Linn. Soc. viii. 283 (1807).
- B. ternata, Endl. Nov. Stirp. Dec. 6 (1839).
- B. Adamsiana, F.v.M. in Proc. Linn. Soc. N.S.W., ser. 2, v. 15 (1890).
- B. ericifolia, Benth. Fl. Austr. i. 313 (1863).
- B. inconspicua, Benth. l.c. 313.

Series ii. *Heterandrae*, Benth.

- B. megastigma, Nees in Lehm. Pl. Preiss. ii. 227 (1847).
- B. heterophylla, F.v.M. Fragm. ii. 98 (1861).
- B. elatior, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 170 (1844).
- B. Purdieana, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 318 (1904).
- B. tetrandra, Labill. Pl. Nov. Holl. i. 98, t. 125 (1804).
- B. crassifolia, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 169 (1844).

Series iii. *Pinnatae*, Benth.

- B. albiflora, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 317 (1863).
- B. lanuginosa, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 16 (1837).
- B. pulchella, Turez. in Bull. Nat. Soc. Mose. xxv. ii. 162 (1852).
- B. gracilipes, F.v.M. Fragm. ii. (1861).
- B. Vilhelmii, Domin, Zvestnika Kral. Ces Spolec. Nauk II. 51 (1923).
- B. pteropoda, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxxvi. i. 595 (1863).

Series iv. *Cyanae*, Benth.

- B. spinescens, Benth. Fl. Austr. i. 319 (1863).
- B. baeckeacea, F.v.M. Fragm. iv. 28 (1863).
- B. caerulescens, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. 11 (1855).
- B. defoliata, F.v.M. Fragm. ix. 113 (1875).
- B. Busselliana, F.v.M. l.c. 113.
- B. ramosa, (Lindl.) Benth. Fl. Austr. i. 320 (1863).

Series v. *Variables*, Benth.

- B. xerophila, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 319 (1904).
- B. anemonifolia, A. Cunn. in Field, N.S. Wales, 330 (1825).
- B. penicillata, Benth. Fl. Austr. i. 322 (1863).
- B. foliosa, S. Moore in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 165 (1920).
- B. crassipes, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 168 (1844).
- B. subsessilis, Benth. Fl. Austr. i. 322 (1863).

Series vi. *Terminales*, Benth.

- B. capitata, Benth. Fl. Austr. i. 323 (1863).
- B. nematophylla, F.v.M. Fragm. ii. 100 (1861).
- B. crenulata, Sm. in Trans. Linn. Soc. viii. 284 (1807).
- B. viminea, Lindl. Swan Riv. App. 17 (1839).
- B. inornata, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxv. ii. 164 (1852).
- B. oxyantha, Turez. in l.c. 165.

Series vii. *Pedunculatae*, Benth.

- B. scabra, Lindl. Swan Riv. App. 17 (1839).
- B. thymifolia, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mose. xxv. ii. 165 (1852).
- B. ovata, Lindl. Bot. Reg. 1841, n. 47 (1841).
- B. fastigiata, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 167 (1844), (*B. tenuior*, Domin).
- B. denticulata, Sm. in Trans. Linn. Soc. viii. 284 (1807). (*B. integrifolia*, Domin).
- B. Marchardiana, F.v.M. Fragm. ix. 115. (1875).
- B. spathulata, Lindl. Swan Riv. App. 17 (1839).
- B. juncea, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 166 (1844).
- B. cymosa, Endl. in Enum. pl. Hueg. 16 (1837).

3. *ERIOSTEMON*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 221 (1798).

- E. Brucei, F.v.M. Fragm. vii. 38 (1869).
- E. Fitzgeraldi, C. Andrews, in Journ. W.A. Nat. Hist. Soc. i. 37 (1904).
- E. apicatus, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 321 (1904). (*E. gibbosus*, (Luchm.) Ewart).
- E. fabianoides, Diels, l.c. 322.
- E. thryptomenoides, S. Moore in Journ. Linn. Soc. Bot. xlv. 166 (1920).

- E. tomentellus, Diels, in Engler's Botan, Jahrb. xxxv. 320 (1904.) (*E. Stowardi*, S. Moore.)
 E. difformis, A. Cunn. in Enum. pl. Hueg. 15 (1837).
 E. nodiflorus, Lindl. Swan Riv. App. 17 (1839).
 E. spicatus, A. Rich. Sert. Astrol. 76 t. 27 (1833).
4. *CROWEA*, Sm. in Trans. Linn. Soc. iv. 222 (1798).
 C. angustifolia, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. ii. 13 (1849).
 C. dentata, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 330 (1863).
5. *PHEBALIUM*, Vent. Jard. Malm. 102 (1804).
 P. deserti, (E. Pritzel) Ewart & Rees in Proc. Roy. Soc. Vict. (n.s.) xxv. 111 (1912).
 (*Eriostemon deserti*, E. Pritzel.)
 P. tuberosum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 343 (1863). (*Eriostemon canaliculatus*, F.M. & Tate.)
 P. microphyllum, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 159 (1852). (*P. capitatum*, S. Moore.)
 P. Drummondii, Benth. Fl. Austr. i. 343 (1863).
 P. filifolium, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 159 (1852).
 P. argenteum, Sm. in Rees Cyclop. xxvii. n. 3.
 P. rude, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 172 (1844).
 P. amblycarpum, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. i. 345 (1863).
 P. Euphemiae, (F.v.M.) Gardn. comb. nov. (*P. Baxteri*, Benth.)
6. *MICROCYBE*, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 166 (1852).
 M. pauciflora, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 167 (1852).
 M. multiflora, Turez. l.c. 166.
 M. albiflora, Turez. l.c. 167.
7. *GELEZNOWIA*, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. ii. 12 (1849).
 G. verrucosa, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxii. ii. 13 (1849).
 G. macrocarpa, Benth. Fl. Austr. i. 347 (1863).
 G. calycina, (Drumm.) Benth. l.c. 348.
8. *PLEUKANDROPSIS*, Baill. Adansonia, x. 305 (1872).
 P. phebalioides, (Drumm.) Baill. Adansonia x. 306 (1872). (*Asterolasia phebalioides*, Benth.)
9. *ASTEROLASIA*, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 9 (1855).
 A. squamuligera, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 352 (1863).
 A. pallida, Benth. l.c. 352.
 A. Dielsii, Gardn. MS.
 A. grandiflora, (Hook.) Benth. Fl. Austr. i. 352 (1863).
10. *MUIRIA*, Gardn. MS.
 M. montana, Gardn. MS.
11. *PHILOTHECA*, Rudge in Trans. Linn. Soc. xi. 298. t. 21 (1815).
 P. ericoides, (Harv.) F.v.M. Fragm. vii. 21 (1870).
 P. miniata, Gardn. in Journ. Roy. Soc. W.A. xiv. 79 (1928).
 P. Hasselli, F.v.M. in Wing's South Sci. Rec. iii. 3 (1883).
12. *CORREA*, Andr. Bot. Rep. t. 18 (1798).
 C. rubra, Sm. Exot. Bot. ii. 26 (1805). (*C. speciosa*, Andr.)
13. *NEMATOLEPIS*, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 158 (1852).
 N. phebalioides, Turez. in Bull. Soc. Nat. Mosc. xxv. ii. 158 (1852).
14. *CHORILAENA*, Endl. in Enum. pl. Hueg. 17 (1837).
 C. quercifolia, Endl. in Enum. pl. Hueg. 17 (1837).
 C. Hasselli, F.v.M. in Viet. Nat. vi. 87 (1889).
 C. hirsuta, Benth. Fl. Austr. i. 357 (1863).
15. *DIPLOLAENA*, R.Br. in Flind. Voy. ii. 546 (1814).
 D. angustifolia, Hook. Bot. Mag. Suppl. t. 4059 (1844).
 D. grandiflora, Desf. in Mem. Mus. Par. iii. 451. t. 19 (1817).
 D. microcephala, Bartl. in Lehm. Pl. Preiss. i. 173 (1844).
 D. Dampieri, Desf. in Mem. Mus. Par. iii. 452. t. 20 (1817).
 D. Drummondii, (Benth.) Ostf. in Dansk. Vidensk. Selsk. iii. 2. 80 (1921).
 D. Andrewsii, Ostf. in l.c. 81.
16. *ATALANTIA*, Corr. in Ann. Mus. Par. vi. 383 (1805).
 A. recurva, Benth. Fl. Austr. i. 370 (1863).

Burseraeae.

1. *CANARIUM*, (Rumph.) Linn. Herb. Amboin. 9 (1754).
C. australasicum, F.v.M. Fragm. iii. 15 (1860).
2. *GARUGA*, Roxb. Hort. Beng. 33 (1814).
G. floribunda, Dene. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. 477 (1834).

Meliaceae.

1. *CARAPA*, Aubl. Pl. Gui. ii. Suppl. 32. t. 387 (1775).
C. obovata, Blume, Bijdr. i. 179 (1825).
2. *MELIA*, Linn. Gen. ed. i. 127 (1737).
M. Azedarach, Linn. Sp. Pl. 384 (1753).
3. *OWENIA*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 303 (1857).
O. vernicosa, F.v.M. Fragm. iii. 15 (1862).
O. reticulata, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 305 (1857).

Tremandraceae.

1. *TREMANDREA*, R.Br. in Flind. Voy. App. ii. 544 (1814).
T. stelligera, R.Br. in D. C. Prodr. i. 344 (1824).
T. diffusa, R.Br. in l.c. 344.
2. *PLATYTHECA*, Steetz in Lehm. Pl. Preiss. i. 220 (1845).
P. verticillata, (Hueg.) Baill. Hist. Pl. v. 67 (1874). (*P. galioides*, Steetz.)
(*P. juniperina*, Domin.)
3. *TETRATHECA*, Sm. Bot. Nov. Holl. i. t. 2 (1793).
T. Harperi, F.v.M. Fragm. v. 49. t. 38 (1865).
T. efoliata, F.v.M. l.c. x. 3. (1876).
T. aphylla, F.v.M. in Wing's S. Sci. Rec. ii. 97 (1882).
T. affinis, Endl. in Enum. pl. Hueg. 7 (1837). (*T. platycaula*, (Benth.) Ostf.)
T. nuda, Lindl. Swan Riv. App. 38 (1839).
T. virgata, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. i. 212 (1845).
T. confertifolia, Steetz. in l.c. i. 214.
T. setigera, Endl. in Enum. Pl. Hueg. 8 (1837).
T. hispidissima, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. i. 217 (1845).
T. hirsuta, Lindl. Swan Riv. App. 38 (1839).
T. viminea, Lindl. l.c. 38. (*T. pubescens*, Turcz.)
T. pilifera, Lindl. l.c. 38.
T. filiformis, Benth. Fl. Austr. i. 135 (1863).

Polygalaceae.

1. *POLYGALA*, (Tourn.) Linn. Syst. ed. I. (1735).
P. leptalea, D. C. Prodr. i. 325 (1824).
P. chinensis, Linn. Sp. Pl. 704 (1753). (*P. Tepperi*, F.v.M.)
P. stenoelada, Benth. Fl. Austr. i. 141 (1863).
2. *COMESPERMA*, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 21. t. 159 (1806).
Sect. i. *Prostemosperma*, (F.v.M.) Benth.
C. scoparium, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 209 (1847).
C. spinosum, F.v.M. Fragm. i. 144 (1859).
C. volubile, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 24. t. 163 (1806).
C. ciliatum, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 304 (1847).
C. integerrimum, Endl. in Enum. pl. Hueg. 7 (1837).
C. Drummondii, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 301 (1847).
C. sylvestre, Lindl. in Mitch. Trop. Austr. 342 (1848).
C. viscidulum, F.v.M. Fragm. x. 4 (1876).
C. acaerosum, Steetz. in Lehm. Pl. Preiss. ii. 299 (1847).
C. confertum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 23. t. 161 (1806).
C. flavum, D. C. Prodr. i. 334 (1824).
- Sect. ii. *Isocalyx*, (Steetz.) Benth.
C. calymega, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 23. t. 162 (1806).
C. rhadinocarpum, F.v.M. Fragm. xi. 1 (1878).
C. lanceolatum, (R.Br.) Benth. Fl. Austr. i. 148 (1863).
C. nudiusculum, D. C. Prodr. i. 334 (1824).
C. virgatum, Labill. Nov. Holl. Pl. ii. 21. t. 159 (1806).
C. polygaloides, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Vict. i. 7 (1854).

Euphorbiaceae.

A. PLATYLOBEAE

I. Phyllanthoideae.

a. *Phyllantheae*.

1. *ANDRACHNE*, Linn. Syst. Pl. ed. i. (1735).
A. Decaisnei, Benth. Fl. Austr. vi. 88 (1873).
2. *FLUGGEA*, Willd. Sp. Pl. iv. 757 (1805).
F. microcarpa, Blume, Bijdr. 580 (1825). (*Securinea obovata*, Muell. Arg.)
3. *PHYLLANTHUS*, Linn. Gen. Pl. ed. i. 282 (1737).
P. Ferdinandi, Muell. Arg. in Flora xlviii. 379 (1865).
P. Adami, Muell. Arg. in D. C. Prodr. xv. ii. 329 (1866).
P. rhytidospermus, (F.v.M.) Muell. Arg. in Linnaea xxiv. 70 (1865).
P. crassifolius, Muell. Arg. in Flora 1864. 513 (1864).
P. reticulatus, Poir in Encycl. meth. v. 298 (1804).
P. baccatus, (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 102 (1873).
P. maderaspatanus, Linn. Sp. Pl. 982 (1753).
P. polyeladus, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W.A. iii. 164 (1918).
P. eulycinus, Labill. Nov. Holl. pl. ii. 75. t. 225 (1806).
P. Fuernrohrii, F.v.M. in Trans. Phil. Soc. Viet. i. 15 (1854).
P. scaber, Klotzsch in Lehm. Pl. Preiss. i. 179 (1844).
P. Maitlandianus, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 338 (1904).
P. indigoferoides, Benth. Fl. Austr. vi. 110 (1873).
P. aridus, Benth. l.c. 110.
P. minutiflorus, (F.v.M.) Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 75 (1865).
4. *BREYNIA*, Forst. Char. Gen. 145. t. 73 (1776).
B. cernua, (Dene.) Muell. Arg. in D. C. Prodr. xv. ii. 439 (1866).
B. rhynchocharpa, Benth. Fl. Austr. vi. 114 (1873).
5. *PETALOSTIGMA*, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 16 (1857). (*Hylococcus*, R.Br., ined.)
P. quadriloculare, F.v.M. in Hook. Kew Journ. ix. 17 (1857).
P. humilis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 163 (1918).
6. *ANTIDESMA* (Burm), Linn. Diss De Andr. 6 (1745).
A. Ghaesembilla, Gaertn. in Fruct. i. 189, t. 39 (1788).

b. *Brideliaceae*.

7. *BRIDELIA*, Willd. Sp. Pl. iv. 978 (1805).
B. tomentosa, Blume, Bijdr. 597 (1825).

II. Crotonoideae.

a. *Crotoneae*.

8. *CROTON*, Linn. Gen. ed. i. 288 (1737).
C. tomentellus, F.v.M. Fragm. iv. 141 (1864).
**EREMOCARPUS*, Benth. Bot. Voy. Sulph. 53 t. 26 (1844).
**E. setigerus*, Benth. (Calif.).
9. *MALLOTUS*, Lour. Fl. Cochinch. 635 (1790).
M. nesophilus, (F.v.M.) Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 196 (1865).
M. Derbyensis, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 165 (1918).

b. *Manihoteae*.

10. *ADRIANA*, Gaud. in Ann. Sc. Nat. ser. I. v. 223 (1825).
A. tomentosa, Gaud. in Ann. Sc. Nat. ser. I. v. 223 (1825).
A. quadripartita, (Labill.) Gaud. in Freye. Voy. Bot. 489 (1826).

c. *Hippomaneae*.

11. *SEBASTIANIA*, Spreng. Neue Entd. ii. 118 (1821).
S. chamelaea, (Linn.) Muell. Arg. in D. C. Prodr. xv. ii. 1175 (1866).
12. *EXCAECARIA*, Linn. Syst. ed. x. 1288 (1759).
E. Agallocha, Linn. Syst. ed. x. 1288 (1759).
E. parvifolia, Muell. Arg. in Flora xlvii. 433 (1864).

d. *Euphorbieae*.

13. *EUPHORBIA*, Linn. Gen. pl. ed. i. 152 (1737).

Sect. i. *Anisophyllum*, Haw.

- E. Atoto, Forst. fil. Prodr. 36 (1786).
 E. Mitchelliana, Boiss. in D. C. Prodr. xv. ii. 25 (1866).
 E. schizolepis, F.v.M. ex Boiss. in D. C. Prodr. xv. ii. 20 (1862).
 E. Schultzi, Benth. Fl. Austr. vi. 47 (1873).
 E. comans, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 161 (1918).
 E. Armstrongiana, Boiss ex D. C. Prodr. xv. ii. 47 (1873).
 E. distans, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 160 (1918).
 E. australis, Boiss Cent. Euph. 15 (1860).
 E. Muelleri, Boiss in D. C. Prodr. xv. ii. 27 (1866).
 E. Drummondii, Boiss Cent. Euph. 84 (1860).
 E. cinerea, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 161 (1918).
 E. alsinaeflora, Baill. Adans. vi. 288 (1866).
 E. Wheeleri, Baill, l.c. 286.
 E. myrtoides, Boiss in D. C. Prodr. xv. ii. 15 (1866).
 E. Careyi, F.v.M. Fragm. xi. 64 (1879).
 E. chrysochaeta, W. V. Fitzg. in Journ. Roy. Soc. W. Austr. iii. 162 (1918).
 E. pilulifera, Linn. Sp. Pl. 454 (1735).

Sect. ii. *Eremophyton*, Benth.

- E. eremophila, A. Cunn. ex Hook. in Mitch. Trop. Austr. 348 (1848).

Sect. iii. *Tithymalus*, Scop.

- **E. Peplus*, Linn. (Europ.; Asia bor.).
 **E. segetalis*, Linn. (Europ.).
 **E. terracina*, Linn. (Reg. Mediterr.).

14. *CALYCOPEPLUS*, Planch. in Bull. Soc. Bot. France viii. 30 (1861).
 C. ephedroides, Planch in Bull. Soc. Bot. France viii. 31 (1861).
 C. marginatus, Benth Fl. Austr. vi. 53 (1873).
 C. Helmsii, F.v.M. & Tate in Trans. Roy. Soc. S. Austr. xvi. 341 (1896).

B. STENOLOBEAE.

I. Porantheroideae.

15. *PORANTHERA*, Rudge in Trans. Linn. Soc. x. 302. t. 22 (1811).
 P. microphylla, Brongn. in Duperr. Voy. Coq. Bot. 221. t. 50, f. B (1829).
 P. Drummondii, Klotzsch in Lehm. Pl. Preiss. 231 (1847).
 P. Huegeli, Klotzsch in l.c. 231.
 P. ericoides, Klotzsch in l.c. 232.
16. *PSEUDANTHUS*, Sieb. in Spreng. Syst. Veg. iv. 2, 25 (1827).
 P. virgatus, (Klotzsch) Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 56 (1866).
 P. nematophorus, F.v.M. Fragm. ii. 14 (1860).
17. *STACHYSTEMON*, Planch in Hook. Lond. Journ. of Bot. iv. 471. t. 15 (1845).
 S. polyandrus (F.v.M.) Benth. Fl. Austr. vi. 62 (1873).
 S. brachyphyllus, Muell. Arg. in Linnaea xxii. 76 (1863).
 S. vermicularis, Planch. in Hook. Lond. Journ. Bot. iv. 472 (1845).

II. Ricinocarpoideae, Pax.

18. *RICINOCARPUS*, Desf. in Mem. Mus. Par. iii. 459. t. 22 (1817).

Sect. i. *Euricinocarpus*, Muell. Arg.

- R. marginatus, (A. Cunn.) Benth. Fl. Austr. vi. 73 (1873).
 R. rosmarinifolius, (A. Cunn.) Benth. l.c. 72.
 R. glaucus, Endl. in Enum. pl. Hueg. 18 (1837).
 R. tuberculatus, Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 60 (1865).
 R. cyanescens, Muell. Arg. in l.c. 60.
 R. psilocladus, (Muell. Arg.) Benth. Fl. Austr. vi. 71 (1873).
 R. velutinus, F.v.M. Fragm. ix. 2 (1875).
 R. trichophorus, Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 60 (1865).

Sect. ii. *Polystaphylos*, Gruning.

- R. muricatus, Muell. Arg. in Linnaea xxxiv. 61 (1865).

Sect. iii. *Scissostylus*, Gruning.

- R. stylosus, Diels, in Engler's Botan. Jahrb. xxxv. 335 t. 40 (1904).